



CAROLI A LINNÉ
ORD. STELLAE POLARIS EQUITIS
**GENERA
PLANTARUM**

EORUMQUE
CHARACTERES NATURALES
SECUNDUM
NUMERUM, FIGURAM, SITUM
ET
PROPORTIONEM OMNIUM FRUCTIFICATIONIS
PARTIUM.

JUXTA THUNBERGII EMENDATIONES DIGESTA.

EDITIO OCTAVA.

PRÆCEDENTE LONGE AUCTIONE
CURANTE
THADDÆO HAENKE

SOCIETATIS SCIENTIARUM PRAGENSIS SODALI.

VOLUMEN I.

VINDOBONÆ.
EX OFFICINA WAPPLERIANA.

1791.

72101

.G4

1791

vol

Id

~~1791~~

Classis I.

M O N A N D R I A

I. MONOGYNIA.

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. <i>Chara.</i> | 15. <i>Maranta.</i> |
| 2. <i>Hipparis.</i> | 16. <i>Myrosma.</i> |
| 3. <i>Pollichia.</i> | 17. <i>Kæmpferia.</i> |
| 4. <i>Salicornia.</i> | 18. <i>Canna.</i> |
| 5. <i>Bærhaavia.</i> | 19. <i>Alpinia.</i> |
| 6. <i>Cynomorium.</i> | 20. <i>Costus.</i> |
| 7. <i>Brosimum.</i> | 21. <i>Phyllachne.</i> |
| 8. <i>Casuarina.</i> | 22. <i>Elaterium.</i> |
| 9. <i>Renealmia.</i> | 23. <i>Phelypæa.</i> |
| 10. <i>Amomum.</i> | 24. <i>Balanophora.</i> |
| 11. <i>Curcuma.</i> | 25. <i>Najas.</i> |
| 12. <i>Thalia.</i> | 26. <i>Ascarina.</i> |
| 13. <i>Cucullaria.</i> | 27. <i>Nipa.</i> |
| 14. <i>Qualea.</i> | |

II. DIGYNIA.

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 28. <i>Pondanus.</i> | 32. <i>Ceratocarpus.</i> |
| 29. <i>Blitum.</i> | 33. <i>Corispermum.</i> |
| 30. <i>Mniarum.</i> | 34. <i>Callitriche.</i> |
| 31. <i>Lacistema.</i> | |

III. TRIGYNIA.

35. *Ægopricon.*

IV. TETRAGYNIA.

36. *Zannichellia.*

MONANDRIA

I. MONOGYNIA.

1. CHARA. * *Vaill. A. G. 1719. t. 3. Hippuris. Dill. gen. 2. Pont. anth.*

* *Femineus flos.*

CAL. *Perianthium* tetraphyllum : *foliis* subulatis, erectis, persistentibus : oppositis 2. exterioribus longioribus.

COR. nulla.

PIST. *Germen* turbinatum. *Stylus* nullus. *Stigma* quinquefidum, oblongum, deciduum.

PER. *Crusta* ovata, unilocularis, adhærens.

SEM. unicum, ovatum, spiraliter striatum.

* *Masculus flos* ad basin germinis, extra calycem.

CAL. nullus.

COR. nulla.

STAM. *Filamentum* nullum. *Anthera* globosa, antice germini, extra calycem, subjecta.

OBS. *C. vulgaris* baccas oblongas, polyspermas. *Weir.*

2. HIPPVIRIS. * *Limnopeuce Vaill. A. G. 1719. Pinastella Dill. p. 168.*

CAL. nullus.

COR. nulla.

STAM. *Filamentum* unicum, receptaculo floris insidens. *Anthera* semibifida.

PIST. *Germen* oblongum, superum, *Stylus* unicus, subulatus, erectus inter stamen & caulem, stamine longior. *Stigma* acutum.

PER. nullum.

SEM. unicum, subrotundum, nudum.

3. POLLICHIA. *Ait. Kew.*

CAL. monophyllus, subcampanulatus, quinque dentatus.

COR. nulla.

STAM. *Filamentum* unicum, filiforme, longitudine calycis. *Anthera* subrotunda, didyma.

PIST. *Germen superum, fundo calycis immersum, ovatum, Stylus filiformis, longitudine staminis. Stigma bifidum.*

PER. nullum, vel membrana tenuis.

SEM. unicum, fundo calycis incrassati inclusum, medio squamæ receptaculi affixum.

REC. squamæ sub antheris subrotundæ, succulentæ, singula in medio proprium florem sustentans; dein carnosæ, subpellucidæ, ovato-oblongæ, erecto-conniventes, baccam lobatam superne apertam simulant.

4. SALICORNIA. * *Tournef.* 485.

CAL. tetragonus, truncatus, ventricosus, persistens.

COR. nulla.

STAM. *Filamentum unicum, simplex, calyce longius.*

Anthera unica, oblonga, didyma, erecta.

PIST. *Germen ovato-oblongum. Stylus simplex, sub stamine. Stigma bifidum.*

PER. nullum. *Calyx ventricosus, inflatus.*

SEM. unicum.

OBS. *Stamen unicum vidi olim in planta annua culta, aliâ deinde Filamenta duo observarunt. In specie quadam virginiana, quam nuper ante oculos habui vivam, erat Calyx squama ovata cochlearis instar concava, erecta. Stamina certe duo. Pistillum superum.*

5. BOERHAAVIA. * *Vaill. serm.* Antaniso- phyllum. *Vaill. A. G.* 1722.

CAL. nullus.

COR. monopetala, campanulata, erecta, quinquangularis, plicata, integra

STAM. *Filamentum unum, f. duo, brevia. Anthera didyma, globosa.*

PIST. *Germen inferum, angulatum, oblongum. Stylus filiformis, brevis. Stigma reniforme.*

PER. nullum.

SEM. unicum, oblongum, obtusum, inferne angustius, sexangulare.

OBS. *Valeriana valde affinis est.*

B. erectæ, B. scandenti & B. hirsutæ flores diandri.

Summa Boerhaavie cum Valerianis adfinitas, plures

MONANDRIA MONOGYNIA.

que Valerianæ species, præprimis monandras, rectius Bœrhaaviæ adsociandas suadet Illustr. Dahl in observationibus Botanicis circa Systematis vegetabilium 14 editionem.

61. CYNOMORIUM. Mich. 12. Amœn. acad.

7. p. 357.

* *Masculi Flores* in amentum imbricatim cum femineis digesti.

CAL. *Amentum* erectum, clavatum, undique tectum flosculis.

Perianthium proprium tetraphyllum : *foliolis* tribus clavatis, quarto inferiori majori, obtusissimo, canaliculato.

COR. nulla.

STAM. *Filamentum* unicum, firmum, rectum, squama calycina longius. *Anthera* didyma.

* *Feminei Flores* masculis mixti, in eadem planta, vixque ab iis remoti.

CAL. *Amentum* commune cum masculis.

Perianthium proprium superum : *foliolis* quatuor, clavatis, tuberculatis, æqualibus, persistentibus.

COR. nulla.

PIST. *Germen* ovatum, inferum. *Stylus* unicus, erectus, firmus, patens, longitudine squamæ calycinæ. *Stigma* obtusum.

PER. nullum.

SEM. unicum, subrotundum.

OBS. *Vidi etiam Flosculos hermaphroditos, monandros, reliquis immixtos. Tota planta est unicum Amentum.*

7. BROSIMUM. Swartz.

* *Mar.*

CAL. nullus, sed *Amentum* globosum undique tectum squamis orbiculatis peltatis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* solitaria inter squamas erumpentia.

* *Femina.*

CAL. *Amentum* Maris.

COR. nulla.

PIST. *Stylus* unicus, bifidus.

PER. *Bacca* monosperma.

8. CASUARINA. *Thunb. diff. nov. gen. p. 53., Suppl. p. 62., Forst. charact. gen. p. 104. tab. 52.*

* *Mas.*

CAL. nullus, sed *Amentum* filiforme, imbricatum: *squamis* minutis, ovatis, acutis, ciliatis, unifloris, circiter octo, verticillatis.

COR. nulla.

STAM. *Filamentum* unicum intra singulum foliolum inferum, capillare, foliole paullo longius.

* *Femina.*

Strobilus ovatus: *squamis* ovatis, acutis, carinatis, ciliatis.

COR. nulla.

PIST. *Germen* minutum. *Stylus* filiformis, bifidus, exsertus, strobilo longior. *Stigmata* bifida.

PER. *Strobilus* oblongus. *Capsula* conica, bivalves, *valvulis* perpendiculariter debiscentibus.

SEM. solitarium, conicum, margine apiceque membranaceum.

OBS. *Stamina* octo sunt ad singulum articulum: sed unicum tantum intra singuli folioli amenti apicem. *Thunb. l. c.*

9. RENEALMIA. *Suppl. p. 7.*

CAL. *Perianthium* superum, tubulosum, monophyllum apice rumpitur in duos vel tres dentes irregulares.

COR. monopetala. *Tubus* rectus, cylindricus. *Limbus* trifidus: *laciniae* duae superiores oblongae, rotundatae, aequales: *lacinia* inferior superioribus vix longior, canaliculata, oblonga.

Nectarium tubo corollae adnatum, sub laciniis superioribus adscendens, rectum, longitudine corollae, oblongum, basi utrinque unidentatum, postea sinu excavato, apice dilatatur & obtuse trilobatur.

STAM. *Filamentum* nullum. *Anthera* unica, fauci tubi inserta, in sinu laciniae inferioris corollae, nectario opposita, libera, recta, linearis, emarginata, interiorius sulco exarata, longitudine & latitudine laciniae corollinae.

PIST. *Germen* inferum, oblongum, obsolete triquetum,

glabrum. *Stylus* filiformis, glaberrimus, erectus, longitudine corollæ. *Stigma* peltatum.

Capitulum planum, latere nectario vergente truncato, perforato. *Foramen* in stylum currens.

PER. *Bacca* oblonga, trifurcata, teres, glabra, umbilico terminata, carnosa, in medio trilocularis. *Loculamenta* mollia, membranacea.

SEM. plurima, oblonga, truncata, tetragona, glaberrima.

10. AMOMUM. *Mus. Cliff. §. II. 5.*

CAL. *Perianthium* tridentatum, obsoletum, superum.

COR. monopetala. *Tubus* brevis. *Limbus* tripartitus (in aliis trifidus:) lacinias oblongis, media majori, sinui huic opposito patentiore.

Nectarium (nisi corollæ segmentis adnumeretur) monophyllum, tripartitum s. trilobum, lacinias petali vix superans, ejusdem sinui majori insertum.

STAM. *Filamentum* unicum, oblongum, petali lacinia simile. *Anthera* adnata.

PIST. *Germen* subrotundum, inferum. *Stylus* filiformis, longitudine staminis. *Stigma* obtusum.

PER. coriaceum, subovatum, trigonum, triloculare, trivalve.

SEM. plura.

OBS. In A. Zingibere & A. Zerumbet limbus corollæ trifidus s. bilabiatus est, labio superiori integro, inferiori diviso, intra quem nectarium trilobum.

11. CURCUMA. † *Mus. Cliff. §. II. 4.*

CAL. *Perianthium* superum, obsoletum.

COR. Petali tubus angustus. *Limbus* tripartitus: lacinias lanceolatis, patentibus, sinu altero magis dehiscens. *tibus*.

Nectarium monophyllum, ovato-acuminatum, lacinias petali majus, ejusdem sinui patentiori insertum.

STAM. *Filamenta* quinque, quorum quatuor erecta, linearia, castrata: unicum (quintum) intra Nectarium, lineare, petaliforme, apice bifido: *Anthera* adnata.

PIST. *Germen* subrotundum, inferum. *Stylus* longitudine staminum. *Stigma* simplex, uncinatum.

PER. *Capsula* subrotunda, trilocularis, trivalvis.

SEM. plurima.

Obs. Excluso nectario corollæ limbus erit quadripartitus.

12. THALIA. † Cortusa. Plum. 8.

CAL. Perianthium - - - -

COR. Petala quinque, ovato-oblonga, undulata, concava: quorum duo spatia proxima minora, involuta; reliqua fere æqualia, recta, concava,

STAM. Filamentum unicum. Anthera.

PIST. Germen ovatum.

PER. Drupa ovata, unilocularis.

SEM. Nux ossea, bilocularis.

13. CUCULLARIA. Schreber Vochy Aublet guian. t. 6.

CAL. Perianthium monophyllum, profunde quadripartitum: laciniis subrotundis, inæqualibus: duabus superioribus minoribus, dehiscentibus.

COR. Petala quatuor, inæqualia, calyci inserta: superius adscendens, cuneiforme, excavatum, emarginatum, desinens basi in Nectarium corniculatum, longum, incurvum, obtusum, inter lacinias calycis superiores distantes prominens; inferius majus, obovatum, rotundatum, concavum; duo lateralia minora, verticalia, oblonga, latere inferiori a petalo majori tecta: unguibus latis, brevibus.

STAM. Filamentum unicum, petaliforme, oblongum, antrorsum latescens, apice cucullatum, calycis fundo infra germen insertum, petalo inferiori incumbens eoque longius. Antheræ loculi duo discreti, lineares, filamento intra cucullum adnati.

14. QUALEA. Aublet guian. t. 1.

CAL. Perianthium monophyllum, profunde quadripartitum: laciniis ovatis, coriaceis, concavis, inæqualibus: duabus inferioribus majoribus dehiscentibus.

COR. Petala duo, inæqualia, calyci inserta: superius erectum, subrotundum, emarginatum, desinens basi in Nectarium corniculatum, breve, obtusum, inter lacinias calycis superiores prominens; inferius majus, declive.

STAM. Filamentum unicum, breve, adscendens, inter

petalum inferius & germen insertum. *Anthera* oblonga, sulcata, recurva.

PIST. *Germen* globosum. *Stylus* filiformis, adscendens, longitudine staminis. *Stigma* obtusum.

PER. *Barca*? unilocularis.

SEM. plurima, in pulpa nidulantia.

15. MARANTA. *Plum.* 36.

CAL. *Perianthium* triphyllum, lanceolatum, parvum, superum.

COR. monopetala, ringens. *Tubulus* oblongus, compressus, obliquus, inflexus. *Limbus* sexfidus: *laciniis* exterioribus alternis ovatis, æqualibus, minoribus: quarum unica infima; binæ supremæ; alternis duabus lateralibus maximis, subrotundis, labium inferius representantibus: summa parva, bipartita.

STAM. *Filamentum* membranaceum, lacinia corollæ simile. *Anthera* linearis, adnata margini alteri filamenti.

PIST. *Germen* subrotundum, inferum. *Stylus* simplex, longitudine corollæ. *Stigma* obsolete trigonum, inflexum.

PER. *Capula* subrotunda, obsolete trigona, trivalvis. *Plum.*

SEM. unicum, ovatum, rugosum, durum. *Plum.*

OBS. Ob corollæ labium monophyllum, sed bipartitum, corollæ nunc quinquepartita dicitur.

16. MYROSMA *Suppl.* p. 8.

CAL. *Perianthium* superum, duplex:

exteriorius triphyllum: foliolis æqualibus, membranaceis, oblongis canaliculatis, integerrimis,

interius (vix triphyllum): *Laciniis* æqualibus, oblongis, integerrimis, apice macula fusca notatis.

COR. monopetala, inæqualis. *Tubus* brevissimus. *Limbus* quinquepartitus. *Laciniæ* duæ superiores breviores, oblongæ, inæqualiter emarginatæ. *Laciniæ* tres inferiores longiores, apice trifidæ, incisæ: intermedio breviori.

STAM. *Filamentum* unicum, liberum, s. margini lacinia intermediæ inferioris adnatum, basi membranaceum, subulatum. *Anthera* ovata, compressa.

PIST. *Germen* triquetrum, inferum. *Stylus* crassus, deflexus, brevis, trigonus, longitudinaliter fissus, parte priore hirsuta. *Stigma* valviforme, apertum, labio dilatato.

PER. Capsula trilocularis, trivalvis, trigona.

SEM. plura, angulata.

17. KÆMPFERIA. *

CAL. *Perianthium* superum, obsoletum.

COR. monopetala. *Tubus* longus, tenuis. *Limbus* planus, sexpartitus: *lacinii* tribus alternis lanceolatis, æqualibus: *reliquis* duabus *lacinii* ovatis: *suprema* bipartita, *lacinulis* obcordatis: *omnibus* longitudine æqualibus.

STAM. *Filamentum* unicum, membranaceum, subovatum, emarginatum. *Anthera* linearis, geminata, tota adnata, vix e tubo corollæ emergens.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* longitudine tubi. *Stigma* bilamellatum, subrotundum.

PER. Capsula subrotunda, trigona, trilocularis, trivalvis.

SEM. plura.

OBS. *Raro fructum fert. Germen juxta radicem locum habet.*

18. CANNA. * *Cannacorus Tournef. 192.*

CIL. *Perianthium* triphyllum: *foliolis* lanceolatis, erectis, parvis, coloratis, persistentibus.

COR. monopetala, sexpartita: *labii superioris lacinia* lanceolata, basi coalita, quarum tres exteriores erectæ, calyce majores: tres interiores exterioribus majores, duæ erectæ, unica reflexa. *Labium inferius* bipartitum, longitudine & figura petalorum: *lacinia superiore* adscendente: *inferiore* revoluta.

STAM. *Filamentum* nullum. *Anthera* linearis, adnata margini nectariferæ laciniae superiori.

PIST. *Germen* subrotundum, scabrum, inferum. *Stylus* unicus, ensiformis, labio inferiori adnatus, lanceolatus, longitudine & figura petali. *Stigma* lineare, margini styli adnatum.

PER. Capsula subrotunda, scabra, coronata, trifurca, trilocularis, trivalvis.

SEM. nonnulla, globosa.

19. ALPINIA. † *Alpina Plum. 11.*

CIL. *Perianthium* trifidum, parvum, superum.

COR. monopetala, inæqualis, & quasi duplicata: Exterior trifida: *lacinia superiori* concava, *lateralibus* planis; tubo instructa. Interior brevior: limbo trifido, *lacinia infima* propendente extra divisuram *lateralium* exterioris corollæ: *reliquis* emarginatis. *Basis ventricosa*,

10 MONANDRIA MONOGYNIA

STAM. *Filamentum* lacinia interioris corollae simile. *Anthera* linearis, adnata margini filamenti.

PIST. *Germen* subrotundum, inferum. *Stylus* simplex. *Stigma* obtuso-trigonum.

PER. *Capsula* carnosa, ovata, trilocularis, trivalvis.

SEM. plurima, ovata, apice prominula, truncata, basi caudata. *Receptaculum* pulposum, maximum.

20. COSTUS. *Jacq. collect. v. 1. p. 143. Musc. Cliff. §. II. 3.*

CAL. *Perianthium* superum, monophyllum, tubulosum, erectum, semitrifidum, persistens: tubo compresso, trigono: lacinia ovatis, acutiusculis.

COR. *Petala* tria, supera, lanceolata, obtusa, concava, basi angustata, erecta, fere aequalia, calyce multo longiora, lateribus parumper sibi mutuo incumbentia. *Nectarium* monophyllum, basi tubulosum, dein bilabiatum, germi insidens intra corollam. *Lobum superius* lanceolatum, acutum, brevius inferiori, eidemque incumbens: *inferius* latissimum, rotundatum, rugosum, margine crispatum, pro-pendulum.

STAM. *Filamenta* nulla, (nisi tale unicum dicas labium nectarii superius). *Anthera* geminae, longitudinaliter adnae parti interiori & superiori labii superioris nectarii, lineares, obtusae.

PIST. *Germen* compressae trigonum, inferum. *Stylus* filiformis, altitudine antherarum, quas inter transit. *Stigma* bilobum.

PER. *Capsula* ovata, triangularis, coriacea, coronata calyce, trilocularis, trivalvis, in angulis dehiscens.

SEM. plurima, angulata, nitida, subduplici serie longitudinali locata.

21. PHYLLACHNE. *Suppl. p. 62. Forst. character. gen. n. 53.*

* *Flores masculi.*

CAL. *Perianthium* superum, triphyllum. *Foliola* subulata, erecta.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* sursum amplius, patulus. *Limbus* quinquepartitus, patens, longitudine tubi.

STAM. *Filamentum* unicum, basi tubi insertum, glandula utrinque notatum, limbo vix longius, filiforme, erectum. *Anthera* globosa, sulcata.

PIST. *Germen* sine stylo.

* *Flores* feminei in diversa planta teste *Forskero*.

CAL. ut in priori.

COR. ut in priori.

PIST. *Germen* turbinatum, inferum. *Stylus* filiformis, longitudine staminis in flore masculo, superius incrassatus. *Stigma* capitatum, tetragonum, e tuberculis quatuor.

PER. *Bacca* s. *Capsula* unilocularis, polysperma.

22. ELATERIUM. *Jacq.* 241. t. 154.

* *Masculi* flores.

CAL. nullus.

COR. monopetala, hypocrateriformis. *Tubus* cylindricus. *Limbus* quinquefidus: *laciniis* lanceolatis, dorso canaliculatis, incisuris denticulo instructis.

STAM. *Filamentum* unicum, columnare. *Anthera* linearis, quinques plicata.

* *Feminei* flores.

CAL. ut in masculo,

COR. ut in masculo.

PIST. *Germen* inferum, echinatum. *Stylus* columnaris, crassescens. *Stigma* capitatum.

PER. *Capsula* infera, echinata, coriacea, pulpa repleta, uniformis, unilocularis, bivalvis, elastica.

SEM. plura.

23. PHELYPÆA. *Thunb. diff. nov. gen. p. 91.*

* *Flores* Masculi.

CAL. nullus, nisi bractæ foliaceæ, oppositæ.

COR. sexpartita, connivens. *Lacinia* subrotunda, obtusissima, concava: extus dorso subpilosa, intus glabra, basi barbata, margine ciliato-crenulata, tenues, tres exteriores, tres interiores, unguiculares.

STIM. *Filamentum* unicum, erectum, crassissimum, corolla brevius, stylo simile, medio receptaculo insertum. *Anthera* ovata, clavata, stigmati similis, pollinifera. *Pollen* pallidum.

Receptaculum barbatum, poris sex a corollæ laciniis decurrentibus nectareis pertusum, sterile.

Corolla & Bractea interdum ciliato ferratæ : *Corollæ* lacinia quandoque inæquales.

* *Flores Feminei.*

CAL. nullus.

COR. monopetala, capsulam vestiens, sexpartita. *Tubus* brevissimus. *Limbi* lacinia supra germen parum connatæ, oblongæ, obtusæ, concavæ, erectæ, unguiculares, intus basi fovea nectarea decurrente pertusæ, barbata.

PIST. *Germen* superum seu corollæ fundo inclusum, barbatum. *Stylus* crassissimus, purpureus, glaber, lineam longus. *Stigma* capitatum, subumbilicatum, striatum, parum oblique truncatum.

PER. *Capsula* columnaris, crassa, subcompressa, obtusa, sulcata, glabra, fere pollicaris, septemvalvis, septemlocularis.

Columna crassa medio stellula oblonga.

SEM. plurima.

24. BALANOPHORA. Fost. charact. gen. 50.

* *Flores Masculi* ad basin capituli, duplici ordine, magni, pauci.

CAL. nullus.

COR. *Petala* quatuor, lanceolata, crassiuscula, patentia.

STAM. *Filamentum* unicum, cylindricum, erectum, longitudine petalorum. *Anthera* oblongo-ovata, erecta, canaliculata.

* *Flores Feminei* innumeri, minutissimi fere totum capitulum occupantes: insidentes receptaculis minimis confertissimis, pluribus flosculis in singulo receptaculo.

CAL. nullus.

COR. nulla.

PIST. *Germen*? minutissimum, subglobosum, monospermum? *Stylus* capillaris minutus. *Stigma* simplex.

PER. —

SEM. —

25. NAJAS. † *Fluvialis* Vaill. A. G. 1719. t. 1. f. 2. Mich. 8.

* *Mas.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, basi truncatum, cylindricum, superius attenuatum: ore lacinis duabus, oppositis, reflexis.

COR. monopetala, æqualis. *Tubus* longitudine calycis.
Limbus quinquepartitus: *laciniis* oblongis, revolutis.
 STAM. *Filamentum* nullum. *Anthera* oblonga, erecta.

* *Femina.*

CAL. nullus.

COR. nulla.

PIST. *Germen* ovatum, in *Stylum* attenuatum desinens.
Stigmata simplicia, persistentia.

PER. *Capsula* ovata, unilocularis.

SEM. ovato-oblonga.

OBS. Corollam maris quadrifidam esse syst. veget. p.
 878.

26. ASCARINA. *Forst. charact. gen.* 59.

* *Flores Masculi.*

CAL. *Amentum* filiforme, flosculis, sessilibus.

Perianthium Squamula brevissima.

COR. nulla.

STAM. *Filamentum* unicum, brevissimum. *Anthera* ob-
 longa, patentirecurva quadrifidula, magna.

* *Flores Feminei* in diversa stirpe.

CAL. }
 COR. } omnino ut in Masc.

PIST. *Germen* globosum. *Stylus* nullus. *Stigma* planum,
 subtrilobum, germi adnatum.

PER. immaturam, monospermum, an Drupa?

SEM. unicum.

27. NIPA. *Thunb. diff. nov. gen.* p. 90. *Act.*
Stockholm. 1782. p. 231.

* *Flores Masculi laterales inferiores.*

CAL. *Spathæ* oblongæ, concavæ, acuminatæ, conacæ:
 exteriores majores, interiores sensim includentes.

Perianthium proprium nullum.

COR. hexapetala. *Petala* linearis, æqualia, patenti re-
 flexa, lineam longa.

STAM. *Filamentum* unicum, filiforme, erectum, longi-
 tudine petalorum. *Anthera* apice filamenti perfora-
 ta, 12-fidula, oblonga, flava.

* *Flores Feminei terminales.*

CAL. *Spathæ* uti in mare.

COR. nulla.

PIST. *Germen* angulatum, saepe quinquangulare, oblique truncatum; glabrum. *Stylus* & *Stigma* nullum: sed eorum loco fulcus in alterutro latere.

PER. *Drupæ* plurimæ, aggregatæ in capitulum magnitudinis capitis, angulatæ, angulis inæqualibus acutis vel obtusis, inferne attenuatæ superne obtusatæ, glabræ, magnitudine nucis castaneæ.

II. DIGYNIA.

28. **PANDANUS.** *Suppl. p. 64. Rumph. amb. Athrodactylis Forst. charact. gen. n. 75.*

* *Mas*: *Spatha* nulla. *Thyrus* compositus ex axillis foliorum, nudus.

CAL. nullus.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* nulla, sed thyrsi ramificationes ultimæ terminantur anthera.

Anthera sessilis, oblonga, acuta, erecta, longitudinaliter fissa.

* *Femina*.

CAL. nullus.

COR. nulla.

PIST. *Germina* numerosa, aggregata, sessilia, introsum attenuata, quinquangulata, apice convexa, glabra. *Stylus* nullus. *Stigmata* duo cordata, marginata.

PER. *Fructus* globosus, magnus, compositus ex.

Drupis cuneatis, angulatis, aggregatis, farinaceis, monospermis.

SEM. Solitarium, ovale, læve.

29. **BLITUM.** * *Chenopodio - Morus. Boerh. Morocarpus Rupp.*

CAL. *Pesanthium* tripartitum, patens, persistens: *laciniis* ovatis, æqualibus, duabus magis dehiscentibus.

COR. nulla.

STAM. *Filamentum* setaceum, calyce longius; intra laciniam intermediam, erectum. *Anthera* didyma.

PIST. *Germen* ovatum, acuminatum. *Stili* duo, erecti, dehiscentes, longitudine staminis. *Stigmata* simplicia.

PER. *Capsula* tenuissima (crusta fere feminis), ovata, parum compressa, calyce baccato facto recepta.

SEM. unicum, globosum, compressum, magnitudine capsulæ.

30. *Mniarum*. *Suppl. p. 8. Forst. charact. gen.*
n. I.

CAL. *Perianthium* superum, parvum quadripartitum.
Laciniae æquales, erectæ, subulatæ, obtusæ rigida.

COR. nulla.

STAM. *Filamentum* unicum, capillare, erectum, calyce vix longius, basi calycis insertum. *Anthera* ovata, sulcata.

PIST. *Germen* inferum, ovale, vix angulatum durum calyce longius. *Styli* duo, filiformes, sensim divaricati, longitudine calycis. *Stigmata* simplicia.

PER. *germen* immutatum, calyce vestitum.

SEM. (Cotyledones rectius) unicum, oblongum, minimum.

31. *LACISTEMA*. Swartz.

CAL. *Amenti* squama.

COR. quadripartita.

STAM. *Filamentum* bifidum.

PER. *Bacca* pedicellata, monosperma.

32. *CERATOCARPUS*. * *Buxb. Gmelin.*

* *Masculi* flores.

CAL. monophyllus, bipartitus, erectus, obtusus, æqualis.

COR. nulla, nisi calicem velis.

STAM. *Filamentum* unum, corolla longius. *Anthera* ovalis, didyma.

* *Feminei* flores in eadem planta.

CAL. *Foliola* duo, germini secundum totam longitudinem adnata.

COR. nulla.

PIST. *Germen* ovatum, compressum. *Styli* duo, capillares. *Stigmata* simplicia: altero recto, altero horizontali.

PER. *Capsula* bivalvis, inferne angustior, compressa, semini adnata, ex calycinis foliolis germini longitudinaliter a mutuo accretis, bicornis.

SEM. oblongum, compressum, capsula tectum, sutura utrinque longitudinali, bicornis: corniculis rectis, subulatis.

OBS. *Genericum Ceratocarpi characterem ex vivis plantis, in solo natali sedulo examinatis, sequenti modo describit Cl. Gueldenstaedt in Nov. Act. Petropol. Vol. XVI. p. 553. t. 17. f. 7. ad 12.*

* *Masculi flores solitarii, sparsi.*

CAL. *Perianthium monophyllum, cordato-tubulosum: limbo postice acuminato, antice semilunato, integerrimo.*

COR. nulla.

STAM. *Filamentum unicum, capillare, vix tubo perianthii longius, thalamo insertum & fundo calycis adglutinatum. Anthera didyma, erecta, ultra calycis limbum prominens.*

* *Feminei flores in eadem cum masculis planta.*

CAL. *Perianthium monophyllum, cordato-compressum, nervo utrinque eminenti carinatum, subbifidum: laciniis subulatis, divergentibus; fauce inter laciniarum sinum angustissima, rimam referente.*

COR. nulla.

PIST. *Germen oblongum, superum. Styli & Stigmata duo, capillaria, per faucem calycis transeuntia, patentia.*

PER. *Calyx major, figura immutata, semen in sinu fouens, & undique tegens.*

SEM. *oblongo-compressum, inferne angustius, fundo calycis adhærens, alias liberum, arillo laxiusculo vestitum: quo detracto extremitates duæ deorsum flexæ & approximatae secedunt, una acuminata & integra, altera obtusa in duo labia dehiscente.*

23. CORISPERMUM. * *Juss. A. G. 1712.*

CAL. nullus.

COR. *Petala duo, compressa, incurva, acuminata, opposita, æqualia.*

STAM. *Filamentum unicum, filiforme, petalis brevius. Anthera simplex.*

PIST. *Germen acutum, compressum. Styli duo, capillares. Stigmata acuta.*

PER. nullum.

SEM. *unicum, ovale, compressum, latere altero gibbum, margine acuto.*

OBS. *In infimis Floribus Stamina sæpe 2, 3, 4, aut 5: in reliquis unum.*

34. CALLITRICHE. * *Stellaria*. *Dill. gen.* 6.

CAL. nullus.

COR. *Petala* duo, incurva, acuminata, canaliculata, opposita.

STAM. *Filamentum* unicum, longum, recurvum. *Anthera* simplex.

PIST. *Germen* subrotundum. *Styli* duo, capillares, recurvi. *Stigmata* acuta.

PER. *Capsula* subrotunda, quadrangularis, compressa, bilocularis.

SEM. solitaria, oblonga.

OBS. C. verna monoica est.

III. TRIGYNIA.

35. ÆGOPRICON. *Suppl. p.* 63.

* *Masculi flores* in Amento ovato, parvi.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulosum, trifidum.

COR. nulla.

STAM. *Filamentum* unum, calyce longius, erectum. *Anthera* ovata.

* *Feminei Flores* in eadem planta, solitarii.

CAL. ut in masculo.

COR. nulla.

PIST. *Germen* ovatum. *Styli* tres divaricati. *Stigmata* simplicia, persistentia.

PER. *Bacca* globosa, intus tricocca, trilocularis, mucrone bifido.

SEM. Solitaria, inde angulata.

IV. TETRAGYNIA.

36. ZANNICHELIA. * *Mich.* 34. *Algoides*
Vaill. A. G. 1719. t. 1. f. 1. *Aponogeton*
Ponth. anth. Graminifolia *Dill. gen.* 169.

* *Masculus Flor.*

CAL. nullus.

COR. nulla.

STAM. *Filamentum* unicum, simplex, longum erectum.

Anthera ovata, erecta.

* *Femineus* iuxta masculum florem.

CAL. *Perianthium* monophyllum, ventricosum, bidentatum, vix manifestum.

COR. nulla.

PIST. *Germina* circiter quatuor, corniculata, conniventia. *Styli* totidem, simplices, patentiusculi. *Stigmata* ovata, plana, patentia extrorsum.

PER. nullum.

SEM. totidem, oblonga, utrinque acuminata: hinc gibba, cortice tecta, curva, reflexa.

Classis II.

DIANDRIA

I. MONOGYNIA.

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 37. <i>Olea.</i> | 63. <i>Cunila.</i> |
| 38. <i>Chionanthus.</i> | 64. <i>Collinsonia.</i> |
| 39. <i>Phillyrea.</i> | 65. <i>Thouinia.</i> |
| 40. <i>Ligustrum.</i> | 66. <i>Dialium.</i> |
| 41. <i>Ceranthus.</i> | 67. <i>Fraxinus.</i> |
| 42. <i>Syringa.</i> | 68. <i>Cecropia.</i> |
| 43. <i>Eranthemum.</i> | 69. <i>Salix.</i> |
| 44. <i>Jasminum.</i> | 70. <i>Lemna.</i> |
| 45. <i>Nyctanthus.</i> | 71. <i>Morina.</i> |
| 46. <i>Peperomia.</i> | 72. <i>Sciuris.</i> |
| 47. <i>Veronica.</i> | 73. <i>Globba.</i> |
| 48. <i>Gratiola.</i> | 74. <i>Ancistrum.</i> |
| 49. <i>Schwenkia.</i> | 75. <i>Arouna.</i> |
| 50. <i>Justicia.</i> | 76. <i>Circea.</i> |
| 51. <i>Calceolaria.</i> | 77. <i>Vallisneria.</i> |
| 52. <i>Pinguicula.</i> | 78. <i>Anguria.</i> |
| 53. <i>Utricularia.</i> | 79. <i>Forstera.</i> |
| 54. <i>Wulfenia.</i> | 80. <i>Disa.</i> |
| 55. <i>Ghinia.</i> | 81. <i>Orchis.</i> |
| 56. <i>Verbena.</i> | 82. <i>Satyrion.</i> |
| 57. <i>Lycopus.</i> | 83. <i>Ophrys.</i> |
| 58. <i>Amethystea.</i> | 84. <i>Serapias.</i> |
| 59. <i>Ziziphora.</i> | 85. <i>Limodorum.</i> |
| 60. <i>Monarda.</i> | 86. <i>Cypripedium.</i> |
| 61. <i>Rosmarinus.</i> | 87. <i>Epidendrum.</i> |
| 62. <i>Salvia.</i> | 88. <i>Arethusa.</i> |

II. DIGYNIA.

89. *Gunnera.*
 90. *Anthoxanthum.*
 91. *Crypsis.*

III. TRIGYNIA.

92. *Piper.*

DIANDRIA

I. MONOGYNIA.

37. OLEA. * *Tournef.* 370. *Vaill. A. G.* 1722.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, parvum: ore quadridentato, erecto, deciduum.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* cylindraceus, longitudine calycis. *Limbus* quadripartitus, planus: laciniis subovatis.

STAM. *Filamenta* duo, opposita, subulata, brevia. *Antheræ* erectæ.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* simplex, brevissimus. *Stigma* bifidum, crassiusculum, laciniis emarginatis.

PER? *Drupa* subovata, glabra, unilocularis.

SEM. *Nux* ovato-oblonga, rugosa.

OBS. *O. americana* Flores masculos & femineos cum hermaphroditis in eadem planta habet.

OBS. *Insufficiens* notas esse characteristicas, quæ *Phillyreæ* atque *Chionanthum* ab *Olea* separant, in unum idemque tria genera commodè conjungi posse, censet *Illust. Dahl* in cit. diff.

38. CHIONANTHUS * *Royen.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, quadripartitum, erectum, acuminatum, persistens.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* brevissimus, longitudine calycis, patulus. *Limbus* laciniis quatuor, linearibus, erectis, acutis, obliquis, omnium longissimis.

STAM. *Filamenta* duo, brevissima, subulata, tubo inserta. *Antheræ* cordatæ, erectæ.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* simplex, longitudine calycis. *Stigma* obtusum, trifidum.

PER. *Drupa* rotunda, unilocularis.

SEM. *Nux* striata.

OBS. *Staminum* numerus, sæpe etiam ternus est.

39. PHILLYREA. * *Tournef.* 367. *Vaill. A. G.* 1722.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulosum, quadridentatum, minimum, persistens.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* vix ullus.
Limbus quadripartitus, revolutus, acutus; *laciniis* ovatis.
STAM. *Filamenta* duo, opposita, brevia. *Antheræ* simplices, erectæ.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* simplex, longitudine staminum. *Stigma* crassiusculum.

PER. *Bacca* globosa; unilocularis.

SEM. unicum, globosum, magnum.

40. **LIGUSTRUM** * *Tournef.* 367.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, minimum: ore quadridentato erecto, obtuso.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* cylindraceus, longior calyce. *Limbus* quadripartitus; patens: *laciniis* ovatis.

STAM. *Filamenta* duo, opposita, simplicia. *Antheræ* erectæ, longitudine fere corollæ.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* brevissimus. *Stigma* bifidum, obtusum, crassiusculum.

PER. *Bacca* globosa, glabra, unilocularis.

SEM. quatuor, hinc conuexa, inde angulata.

41. **CÉRANTHUS.** *Shreb.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, quadripartitum: *laciniis* triangularibus, acutis, erectis: duabus oppositis duplo latioribus; persistens.

COR. monopetala, quadripartita: *laciniis* ovatis, concavis, erectis: terminatis *corniculo* longissimo, recto, acuto.

STAM. *Filamenta* duo, basi corollæ inserta, brevissima. *Antheræ* cordatæ, lanceolatæ, acuminatæ, hinc convexæ inde planiusculæ, erectæ, calyce altiores.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* staminibus brevior, compressus. *Stigma* oblique emarginatum, obtusum.

PER. *Bacca* oblonga, hinc planiuscula inde convexa, apice compresso, unilocularis.

SEM. unicum, magnum, læve, figura baccae, eique latere planiori longitudinaliter utrinque adnatum pellicula tenui oblonga.

42. **SYRINGA.** * *Lilac. Tournef.* 372.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, parvum, ore quadridentato, erecto, persistens.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* cylindraceus, longissimus. *Limbus* quadripartitus, patentirevolutus: *laciniis* linearibus, obtusis.

STAM. *Filamenta* duo, brevissima. *Anthera* parva, intra tubum corollæ.

PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* bifidum, crassiusculum.

PER. *Capsula* oblonga, compressa, acuminata, bilocularis, bivalvis, valvulis dissepimento contrariis.

SEM. solitaria, oblonga, compressa, utrinque acuminata, margine membranacea.

43. ERANTHEMUM. *

CAL. *Perianthium* quinquesidum, tubulosum, angustissimum, erectum, breve, acuminatum, persistens.

COR. monopetala, infundibuliformis; *Tubus* filiformis, longissimus. *Limbus* quinquepartitus (quadri-partitus interdum), planus: *laciniis* obovatis.

STAM. *Filamenta* duo, brevissima, in fauce corollæ. *Anthera* subovata, compressa, extra tubum.

PIST. *Germen* ovatum, minimum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* simplex.

PER.

SEM.

OBS. unicum vidi specimen, aliis itaque attente examinandum committo.

44. JASMINUM. * *Tournef.* 368.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, oblongum: ore quinquedentato, erecto; persistens.

COR. monopetala, hypocrateriformis. *Tubus* cylindraceus, longus. *Limbus* quinquepartitus, planus.

STAM. *Filamenta* duo, brevissima. *Anthera* parva, intra tubum corollæ.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* bifidum.

PER. *Bacca* ovalis, glabra, bilocularis s. bicapsularis.

SEM. duo, magna, ovato-oblonga, arillata, hinc connexa, inde plana.

OBS. *Figura floris acuminata* & obtusa variat. *Bacca* in aliis simplex, in aliis dicocca.

45. NYCTANTHES. *

CAL. *Perianthium* monophyllum, semioctosidum, cylindricum, minimum, denticulis subulatis, persistens.

COR. monopetala, hypocrateriformis. *Tubus* cylindraceus, calyce longior. *Limbus* planus, octopartitus, patens: *laciniis* oblongis.

STAM. *Filamenta* duo, subulata, minima, receptaculo inserta. *Antheræ* erectæ, acutiusculæ.

PIST. *Germen* subrotundum, depressum. *Stylus* simplex, longitudine tubi. *Stigmata* duo, erecta.

PER. *Bacca* subrotunda, dicocca, bilocularis.

SEM. solitaria, magna, subrotunda.

OBS. *Tanquam novum & superfluum genus Nyctanthes excludit Illustr. Dahl l. c., rectiusque cum Jasmino in unum genus uniri posse contendit.*

46. PÆDEROTA. † Bonarota Mich. 15.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum: foliolis linearibus, æqualibus, patentibus, persistentibus.

COR. monopetala, subrotata, quadrifida, obtusa: lobo superiore latiore sæpius emarginato.

STAM. *Filamenta* duo, filiformia, adscendentia, corolla breviora. *Antheræ* conniventes, ovatae, acutæ, bivalves.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* subulatus, deflexus, longitudine staminum, persistens.

PER. *Capsula* ovata, calyce longior, bilocularis, apice dehiscens.

SEM. plurima, subrotunda.

OBS. *Veronicæ affinis, calyce quinquepartita diversa.*

47. VERONICA. * Tournef. 60.

CAL. *Perianthium*, quadripartitum (in aliis quinquefidum,) persistens: laciniis lanceolatis, acutis, æqualibus aut inæqualibus.

COR. monopetala, rotata. *Tubus* longitudine fere calycis. *Limbus* quadripartitus, planus, laciniis ovatis: infima angustiore, huic opposita latiore.

STAM. *Filamenta* duo, inferne angustiora, adscendentia. *Anthera* oblonga.

PIST. *Germen* compressum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum, declinatus. *Stigma* simplex.

PER. *Capsula* obcordata, apice compressa, bilocularis, quadrivalvis.

SEM. plurima.

OBS. *Tubus corollæ is diversis diversus: in plerisque brevissimus, in spicatis longus est.*

48 GRATIOLOA. *

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, erectum: *laciniis* subulatis, persistentibus.

COR. monopetala, inæqualis. *Tubus* calyce longior, angulatus. *Limbus* quadripartitus, parvus: *lacinia* superiore latiore, emarginata, reflexa; *reliquis* rectis, æqualibus.

STAM. *Filamenta* quatuor, subulata, corolla breviora, quorum duo inferiora breviora, sterilia: *superiora* duo tubo petali adnata. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* conicum. *Stylus* rectus, subulatus. *Stigma* bilabiatum, post fecundationem connivens.

PER. *Capsula* ovata, acuminata, bilocularis, bivalvis.

SEM. plurima, parva.

OBS. *Essentia* characteris in duobus flaminibus castratis.

G. *Monnieria* *Filamenta* 4, *antherifera*; *Stigma* capitatum. R

G rotundifoliæ. *Calyx* 5-partitus; *Caps.* compressa, subrotunda; *Stamina* duo.

49. SCHWENKIA. *Dau. van Royen.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulosum, striatum, rectum, quinque-dentatum, persistens.

COR. monopetala: *Tubus* cylindricus, longitudine calycis. *Limbus* subregularis, longitudine calycis, fauce inflatus, quinqueplicatus: plicis orificium stellatum claudentibus; corpore glanduloso plicarum angulis exterioribus innato: superioribus duabus glandulis longioribus.

STAM. *Filamenta* quinque: tria breviora setacea, castrata, duo superiora, longiora, fertilia: *Antheræ* (duæ) ovata, acuta, biloculares.

PIST. *Germen* globosum. *Stylus* simplex, longitudine staminum. *Stigma* obtusum.

PER. *Caps.* compresso-lenticularis, glabra, calyce ampliato longior, bilocularis, bivalvis.

SEM. plurima, minima, subangulata. *Receptaculum* subglobosum.

OBS. In ordine naturali *Browallii* proxima.

50. JUSTICIA. *Adhatoda Tournef. Dianthera, gen. 29.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum: *laciniis* lanceolatis, æqualibus, persistentibus.

COR. monopetala, ringens. *Tube* brevis, sæpe longissimus, æqualis aut rugosus. *Labium superius* suberectum, obtusum aut acutum, integerrimum, alias bifidum aut emarginatum: *labium inferius* ejusdem longitudinis, subreflexum, trifidum.

STAM. *Filamenta* duo, subulata, longitudine labii superioris: *Anthera* in singulo filamentum unica, aut binæ; erectæ, oblongæ.

PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis, longitudine & situ staminum. *Stigma* simplex, obtusum.

PER. *Capsula* bivalvis, bilocularis, superne & inferne compressa, dissepimento valvulis contrario, ungue elastico dehiscens.

SEM. solitaria, subrotunda.

Obs. *Habitu & caractere* adeo duo genera congruunt, ut non possint separari.

I. pulcherrima Jacq. floribus tetrandris gaudet.

I. malabarica calyce duplici.

51. CALCEOLARIA. Feuill. peruu. tom. 3.

p. 13.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quadripartitum, patens, æquale: laciniis ovatis; persistens.

COR. monopetala, bilabiata: Labio inferiore resupinato. *Lab. superius* minimum, coarctato-globosum, antice bifidum. *Lab. inferius* maximum, calceiforme, inflatum, antice hians.

STAM. *Filamenta* duo, brevissima, intra labium superius. *Antheræ* incumbentes, clavatæ manubrio per rimam prominulo

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* brevissimus. *Stigma* obtusiusculum.

PER. *Capsula* subconica, acuminata, bisulca, bilocularis, quadrivalvis.

SEM. numerosa, ovata.

52. PINGUICULA. * Tournef. 74.

CAL. *Perianthium* ringens, parvum, acutum, persistens. *Labium superius* erectum, trifidum; *L. inferius* reflexum, bifidum.

COR. monopetala, ringens. *Labium longius* rectum, obtusum, trifidum, lupinum; *L. brevius* bifidum, obtusius, patentius.

Nectarium corniculatum, e basi petali postice productum.

STAM. *Filamenta* duo, cylindrica, curva, adscendentia, calyce breviora. *Anthera* subrotunda.

PIST. *Germen* globosum. *Stylus* brevissimus. *Stigma* bilabiatum: *Lobio* superiore majore, plano, reflexo, antheras tegente; *L. inferiore* angustissimo, erecto, bifido, brevior.

PER. *Capsula* ovata, apice compressa, apice dehiscent, unilocularis.

SEM. plurima, cylindracea. *Receptaculum* liberum.

53. UTRICULARIA. * *Lentibularia Vail.*

A. G. 1719. *Dill. gen.* 6.

CAL. *Perianthium* diphyllum: *foliis* ovatis, concavis, minimis, æqualibus, deciduis.

COR. monopetala, ringens. *Labium* superius planum, obtusum, erectum; *L. inferius* majus, planum, integrum. *Palatum* cordatum, inter labia prominulum.

Nectarium corniculatum, e basi petali productum.

STAM. *Filamenta* duo, brevissima, incurva. *Anthera* parva, coherentes.

PIST. *Germen* globosum. *Stylus* filiformis, longitudine calycis. *Stigma* conicum.

PER. *Capsula* globosa, magna, unilocularis.

SEM. plurima.

OBS. U. stellaris *nectario destituitur.*

54. WULFENIA. *Jacq. misc. vol. II. pag. 62.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum: *foliis* linearibus, æqualibus, erectis, persistentibus.

COR. monopetala, ringens, ecalcarata. *Tubus* basi subgloboso-gibbus. *Limbus* bilabiatus: *labium* superius brevius, integrum, subfornicatum, antheras occultans, faucemque semiclaudens: *labium inferius* duplo longius, supinum, trilobum, ad faucem barbatur.

STAM. *Filamenta* duo, brevia, arcuatim conniventia, sub labio superiori recondita. *Anthera* subovata, integræ, ab apice usque ad basin in duo hemisphæria concava, patentissima dehiscences.

PIST. *Germen* oblongo-ovatum, apice compressum. *Stylus* filiformis, longissimus. *Stigma* capitatum, umbilicatum, papillosum.

PER. *Capsula* ovalis, obtusa, apice compressa, utrinque sulco impresso bilocularis, apice dehiscens, quadrivalvis dissepimento nullo: *receptaculo* intra loculamenta subpyramidali.

SEM. complura, rotunda.

55. **GHINIA.** *Schreber.* *Tamonea Aublet. guian.* 268.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, persistens; ore expanso, quinquedentato, acuminato.

COR. monopetala, irregularis. *Tubus* longus, angustus. *Limbus* bilabiatus. *Labium superius* majus, subrotundum, concavum, adscendens; inferius tripartitum: laciniis subrotundis: media majore, deflexa, emarginata.

STAM. *Filamenta* quatuor, tubo supra basin inserta; quorum duo longiora. *Anthera* loculis oblongis: altero terminali, in filamentis longioribus fertili, in brevioribus sterili; altero versus medium filamenti inserto, squamæformi.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* longitudine tubi. *Stigma* quadrilobum.

PER. *Drupa* turbinata, angulata, calyce persistente longior.

SEM. *Nux* angulata, quadri-f. quinque locularis: loculis monospermis.

56. **VERBENA.** * *Tournef.* 94. *Vaill.* *Sherardia Vaill.* *Blairia Houst.* A. A. *Kämpfer Houst.* A. A.

CAL. *Perianthium* monophyllum, angulatum, tubulatum, lineare, quinquedentatum, *denticulo* quinto truncato, persistens.

COR. monopetala, inæqualis. *Tubus* cylindraceus, rectus longitudine calycis, mox dilatatus, incurvatus. *Limbus* patens, semiquinquefidus: laciniis rotundatis, subæqualibus.

STAM. *Filamenta* duo, vel quatuor, setacea: brevissima, intra tubum corollæ latitantia, quorum duo breviora reliquis. *Anthera* incurvæ, totidem quot filamenta.

PIST. *Germen* tetragonum. *Stylus* simplex, filiformis, longitudine tubi. *Sigma* obtusum.

PER. tenuissimum, vixque manifestum, vel fere nullum.
Calyx continens semina.

SEM. duo, vel quatuor, oblonga.

OBS. *Sherardia V. Semina* & *Antheras* duas intra calycem angustum fovet.

Iappulacea Semina echinata & *Antheras* duas intra calycem inflatum gerit.

Verbenæ V. Semina obtusa & *Antheras* quatuor proferunt.

curassavica Calyx quatuor setis acutis prominet, & *stamina* duo habet.

OBS. *V. Aubletia* nonnihil a generis charactere recedit.

57. LYCOPUS. * *Tournef.* 89.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, semi-quinquesidum: *laciniis* angustis, acutis.

COR. monopetala inæqualis. *Tubus* cylindraceus, longitudine calycis. *Limbus* quadrifidus, obtusus, patulus: *laciniis* subæqualibus; superiore latiore, emarginata; inferiore minore.

STAM. *Filamenta* duo, corolla fere longiora, ad cujus laciniam superiorem inclinata. *Anthere* parvæ.

PIST. *Germen* quadrifidum. *Stylus* filiformis, rectus, longitudine staminum. *Stigma* bifidum, reflexum.

PER. nullum. *Calyx* in fundo semina continens.

SEM. quatuor, subrotunda, retusa.

58. AMETHYSTEA. * *Amethystina. Amman. Hall.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubuloso-campanulatum, angulatum, semi-quinquesidum, subæquale, acuminatum, persistens.

COR monopetala, ringens, calyce paulo longior: *Limbus* quinquepartitus, subæqualis: *Labium* superius erectum, rotundatum, concavum, bipartitum, dehiscens, *Lab. inferius* tripartitum; *Lateralibus* rotundatis, erectis, brevioribus; *Intermedia* integerrima, concava, longitudine labii superioris.

STAM. *Filamenta* duo, filiformia, approximata, sub labio superiore, eoque longiora. *Anthere* simplices, subrotundæ.

PIST. *Germen* quadrifidum. *Stylus* magnitudine staminum, *Stigmata* duo, acuta.

PER. nullum. *Calyx* magis campanulatus, patens.

SEM. quatuor, calyce breviora, obtusa, gibba, introrsum angulata.

59. ZIZIPHORA. *

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulosum, cylindricum, longissimum, striatum, hispidum: ore quinque-dentato, minimo; fauce barbata.

COR. monopetala, ringens. *Tubus* cylindricus, longitudine calycis. *Limbus* minimus: *Lab. superius* ovatum, reflexum, integrum. *Lab. inferius* patens, latius, trifidum; *laciniis* rotundatis, æqualibus.

STAM. *Filamenta* duo, simplicia, patentia, longitudine fere corollæ. *Antheræ* oblongæ, distantes.

PIST. *Germen* quadrifidum. *Stylus* setaceus, longitudine corollæ. *Stigma* acuminatum, inflexum.

PER. nullum. *Calyx* immutatus.

SEM. quatuor, calyce longe breviora, oblonga, obtusa, hinc gibba, inde angulata.

60. MONARDA. *

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, cylindricum, striatum: ore quinquedentato, æquali præstans.

COR. inæqualis. *Tubus* cylindricus, calyce longior. *Limbus* ringens. *Labium superius* rectum, angustum, lineare, integrum. *L. inferius* reflexum, latius, trifidum: *lacinia media* longiore, angustiore, emarginata; lateralibus obtusis.

STAM. *Filamenta* duo, setacea, longitudine labii superioris, a quo involuta. *Antheræ* compressæ, superne truncatæ, inferne connexæ, erectæ.

PIST. *Germen* quadrifidum. *Stylus* filiformis, cum staminibus involutus. *Stigma* bifidum, acutum.

PER. nullum. *Calyx* in fundo semina continens.

SEM. quatuor, subrotunda.

Obs. *M. dydima* stamina 4. profert, quorum duo castrata.

61. ROSMARINUS *. Tournef. 92.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, superne compressum: ore erecto, bilabiato: superiore integro; inferiore bifido.

COR. inæqualis. *Tubus* calyce longior. *Limbus* ringens: *Labium superius* bipartitum, erectum, brevius, acu-

tum, marginibus reflexis. *L. inferius* reflexum, trifidum; *lacinia media* maxima, concava, basi angusta; *lateralibus* angustis, acutis.

STAM. *Filamenta* duo, subulata, simplicia cum dente, versus labium superius inclinata, eoque longiora. *Anthera* simplices.

PIST. *Germen* quadrifidum. *Stylus* figura, situ & longitudine staminum. *Stigma* simplex, acutum.

PER. nullum. *Calyx* semina in fundo continens.

SEM. quatuor, ovata.

OBS. Ad SALVIAS proxime accedit, distinguendus flaminibus minime bifurcatis.

62. SALVIA. * 83. Touref 83. Horminum
Tournesf. 32. Sclarea Tournesf 82.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, striatum, superne sensim ampliatus & compressus: ore erecto, bilabiato; *inferiori* bidentato.

COR. monopetala, inæqualis. *Tubus* superne ampliatus, compressus. *Limbus* ringens. *Labium* superius concavum, compressum, incurvum, emarginatum; *L. inferius* latum, trifidum: *lacinia media* majori, subrotunda, emarginata.

STAM. *Filamenta* duo, brevissima; his duo alia transversim in medio fere affixa, quorum extremitati inferiori *Glandula*, superiori *Anthera* insidet.

PIST. *Germen* quadrifidum. *Stylus* filiformis, longissimus, situ staminum. *Stigma* bifidum.

PER. nullum. *Calyx* levissime connivens, in fundo semina gerens.

SEM. quatuor, subrotunda.

OBS. *Filamentorum bifurcatio singularis constituit essentialem characterem.*

Rudimenta staminum duorum, sed sterilium, in fauce corollæ. Glandula in plerisque callosa est; in paucis vero antheræ quasi rudimentum & parum fariniferum occurrit in quibusdam.

OBS. *Calyx & corolla in quibusdam a data descriptione paulum recedunt.*

63. CUNILA. * Hedyosmos D. Royen. Mitch;
act. N. C. 1748. app. 211.

CAL. *Perianthium* monophyllum, cylindricum, persistens,

decem-striatum; ore sublabiato, quinquedentato, persistens.

COR. monopetala, ringens. *Labium superius erectum, planum, emarginatum. Labium inferius tripartitum; laciniis rotundatis: media emarginata.*

STAM. *Filamenta* duo, filiformia, & duo rudimenta filamentorum. *Antheræ* subrotundæ, didymæ.

PIST. *Germen* quadripartitum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* bifidum, acutum.

PER. nullum. *Calyx* fauce villis clausa.

SEM. quatuor, ovalia, minuta.

64. COLLINSONIA. *

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, bilabiatum; *labio superiore trifido, reflexo, latiore; inferiore bipartito, erectiore, subulato; persistens.*

COR. monopetala, inæqualis. *Tubus* infundibuliformis, calyce multoties longior. *Limbus* quinquesfidus: *Laciniis* superioribus obtusis, brevissimis: duabus summis reflexis. *Labium inferius* longius, multifido-capillare.

STAM. *Filamenta* duo, setacea, erecta, longissima. *Antheræ* simplices, incumbentes, compressæ, obtusæ.

PIST. *Germen* quadrifidum, obtusum, cum *Glandula* majore germinibus subjecta. *Stylus* setaceus, longitudine staminum, ad latus inclinatus. *Stigma* bifidum, acutum.

PER. nullum. *Calyx* in fundo semen fovet, ore irregulari ringens.

SEM. unicum, globosum.

OBS. Numerus feminum quaternarius videtur naturalis ex germinibus, quamvis unicum modo adolescat.

65. THOUINIA. Thunberg. Suppl. p. 2. Swartz prodr.

CAL. *Perianthium* inferum, minimum, quadridentatum.

COR. *Petala* quatuor, æqualia, linearia, canaliculata, erecta, apice patula, calyce quadruplo longiora.

STAM. *Antheræ* sessiles in fundo floris, oppositæ: singula petala duo opposita basi connectens, oblonga, sulco longitudinali, apice bifida.

PIST. *Germen* superum, oblongum, glabrum, subcom-

pressum. *Stylus* brevis, longitudine antherarum, glaber. *Stigma* ovato-oblongum, subemarginatum.

PER. *Bacca* bilocularis. Loc. bispermibus.

SEM. quatuor.

66. DIALIUM.

CAL. nullus.

COR. *Petala* quinque, æqualia, sessilia, elliptica, obtusa, decidua.

STAM. *Filamenta* duo, conica, brevissima, sita ad receptaculi latus superius. *Antheræ* oblongæ, obtusæ, quasi ex duabus coalitæ.

PIST. *Germen* superum, ovatum. *Stylus* subulatus, declinatus, longitudine staminum. *Stigma* simplex, ascendens versus apicem antherarum.

PER. *Legumen*?

SEM. - - -

67. FRAXINUS. * *Tournef.* 343. *Mich.* 107. Ornus *Mich.* 103.

* *Hermaphroditus.*

CAL. nullus, at *Perianthium* monophyllum, quadripartitum, erectum, acutum, parvum.

COR. nulla, at *Petala* quatuor, linearia, longa, acuta, erecta.

STAM. *Filamenta* duo, erecta, corolla longe breviora. *Antheræ* erectæ, oblongæ, quadrifulcæ.

PIST. *Germen* ovatum, compressum. *Stylus* cylindraceus, erectus. *Stigma* crassiusculum, bifidum.

PER. nullum præter crustam seminis.

SEM. lanceolatum, compresso-membranaceum, uniloculare.

* *Femina.*

CAE. ut in hermaphrodito.

COR. ut in hermaphrodito.

PIST. ut in hermaphrodito.

PER. ut in hermaphrodito.

SEM. ut in hermaphrodito.

OBS. F. Ornus P. corolla & calyce gaudens, semper hermaphrodita pura est absque mare.

F. excellior femina, sæpe inter sparsos flores perens hermaphroditos, & hermaphroditos femineos. Hæc corolla & calyce destituitur.

68. CECROPIA. † *Læst.* 272. *Coilotopalus* Brown.* *Mas.*

CAL. *Spatha* ovata, rumpens, caduca, continens
Amenta plurima, fasciculata, teretia, imbricata squamis:
Squamæ (Receptacula) copiosæ, turbinatæ, compres-
 so-tetragonæ, obtusæ, duplici foramine fætæ.

COR. nulla, nisi squamas dicas *Nectararia*.

STAM. *Filamenta* duo, capillaria, brevissima e forami-
 nibus squamarum. *Anthera* oblongæ, tetragonæ.

* *Femina.*

CAL. *Spatha*. - - -
Amenta quatuor, teretia, imbricata germinibus.

COR. nulla.

PIST. *Germina* plura, imbricata, compresso-tetragona,
 obtusa. *Styli* solitarii, brevissimi. *Stigmata* subcapi-
 tata, lacera.

PER. *Bacca* forma germinis, unilocularis, monosperma.

SEM. oblongum, compressum.

69. SALIX. * *Tournef.* 464.* *Mas.*

CAL. *Amentum Commune* oblongum, undique imbricatum
 (involucro e gemma constructum), constans
Squamis unifloris, oblongis, patentibus.

COR. *Petala* nulla.

Nectarium Glandula cylindræa, minima, truncata,
 mellifera, in centro floris.

STAM. *Filamenta* duo, recta, filiformia, calyce longiora.
Anthera dydimæ, quadriloculares.

* *Femina.*

CAL. *Amentum* ut in mare.

Squamæ ut in mare.

COR. nulla.

PIST. *Germe* ovatum, attenuatum in *Stylum* vix distin-
 ctum, squamis calycinis paulo longiorem. *Stigmata*
 duo, bifida, erecta.

PER. *Capsula* ovato-fusulata, unilocularis, bivalvis:
valvulis revolutis.

SEM. numerosa, ovata, minima, coronata *Pappo* sim-
 plici, hirsuto.

OBS. *Species* dantur, *cujus* *mores* *staminibus* *tribus* *s.* *quin-*
que, *inaequalis* *longitudinis*, *instruuntur*.

S. hermaphroditica sola nobis nota floribus hermaphroditis diandris.

Salicis individua mutare sexum, alteroque anno masculos, alteroque femineos flores producere, signum est.

S. purpurea monandros gerit flores.

70. LEMNA. * *Lenticula Mich. 11. Dill. gen.*

6. *Hydrophace Buxb. cent. 11. t. 37.*

f. 2.

* *Masculus flor.*

CAL. monophyllus, subrotundus, latere dehiscens, oblique extrorsum dilatatus, obtusus, patens, depressus, magnus, integer.

COR. nulla.

STAM. Filamenta duo, subulata, incurva, longitudine calycis. Anthera didyma, globosa.

PIST. Germen ovatum. Stylus brevis, persistens. Stigma obsoletum.

PER. abortiens.

* *Femineus flos in eadem planta cum masculo.*

CAL. ut in masculo.

COR. nulla.

PIST. Germen subovatum. Stylus brevis, persistens. Stigma simplex.

PER. Capsula globosa cum acumine, unilocularis.

SEM. nonnulla, oblonga, utrinque acuta, longitudine fere capsulae, hinc striata.

71. MORINA. * *Tournef. 480. Diotrothea Taill. A. G. 1722.*

CAL. duplex. Perianthium fructus inferum, monophyllum, cylindricum, tubulosum, persistens: ore dentato: denticulis duobus oppositis longioribus; omnibus subulatis, acutis.

Perianthium floris superum monophyllum, tubulatum, bifidum: laciniis emarginatis, obtusis, persistentibus, erectis, magnitudine exterioris.

COR. monopetala, bilabiata. Tubus longissimus, superne ampliatus, parum incurvatus, inferne filiformis. Limbus planus, obtusus: Labio superiore semibifido minore; L. inferiore trifido: Laciniis omnibus obtusis, uniformibus: media productiore.

STAM. Filamenta duo, setacea, stylo approximata, pa-

parallelæ, limbo breviora. *Antheræ* erectæ, cordatæ, distantes.

PIST. *Germen* globosum, sub receptaculo floris. *Stylus* staminibus longior, filiformis. *Stigma* capitato-peltatum, inflexum.

PER. nullum.

SEM. unicum, subrotundum, calyce floris coronatum.

72. SCIURIS Schreber. *Raputia* Aubl. 242.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquedentatum, breve, acutum.

COR. monopetala, tubulosa, incurva, bilabiata. *Lobum superius* trifidum: lacinia media paullo longiore; *inferius* paullo brevius, bitidum.

STAM. *Filamenta* duo, brevîa, labio superiori inserta, basi squamulis duabus munita, antherifera: tria longiora, labio inferiori inserta, basi pilosa, sterilia. *Antheræ* oblongæ, basi bifidæ.

PIST. *Germen* pentagonum, glandula cinctum. *Stylus* longitudine corollæ incurvus. *Stigma* planiusculum, trilobum.

PER. *Capsula* quinque, coalitæ, extrorsum rotundæ, depressæ, uniloculares, bivalves, introrsum dehiscentes.

SEM. solitaria, oblonga.

73. GLOBBA.

CAL. *Perianthium* superum, monophyllum, cylindricum ore trifido, persistens.

COR. monopetala, cylindrica ore trifido, æquali.

STAM. *Filamenta* duo, filiformia, mediocria. *Antheræ* adnatæ longitudinaliter filamentis.

PIST. *Germen* inferum. *Stylus* setaceus, mediocris. *Stigma* acutum.

PER. *Capsula* subrotunda, trilocularis, trivalvis.

SEM. plurima.

74. ANCISTRUM. *Forst. charact. gen. n. 2.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, turbinatum, truncatum, quadridentatum. *Dentes* cylindrico-aristati, erecti, terminati hamis quatuor, revertis.

COR. supera, monopetala. *Tubus* brevissimus. *Limbus* patulus, quadrididus. *Lacinie* subæquales, obtusæ.

STAM. *Filamenta* duo, basi tubi adnata, corolla longiora, filiformia. *Antheræ* ovatæ.

PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis. *Stigma* penicilliforme.

PER. nullum, nisi calyx.

SEM. unicum, oblongum, in fundo calycis.

REC. commune, nudum.

75. AROUNA. *Aubl. guian.* 16.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum, reflexum, acutum, deciduum.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* duo, erecta, receptaculo inserta. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* conicum, receptaculo carnosio insidens. *Stylus* fetaceus, incurvus. *Stigma* obtusum.

PER. *Bacca* ovata, subcompressa, altero latere sulcata, unilocularis.

SEM. duo vel unum, pulpa obvoluta.

76. CIRCÆA. * *Tournef.* 155.

CAL. *Perianthium* diphyllum: *foliis* ovatis, concavis, deflexis, deciduis.

COR. *Petala* duo, obcordata, calyce fere breviora, patentia, æqualia.

STAM. *Filamenta* duo, capillaria, erecta, longitudine calycis. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* turbinatum, inferum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum: *Stigma* obtusum, emarginatum.

PER. *Capjsula* turbinato-ovata, hispida, bilocularis, bivalvis, a basi versus apicem dehiscens.

SEM. solitaria, oblonga, interne angustiora.

77. VALLISNERIA. † *Mich.* 10. Vallisneroides *Mich.* 10.

* *Mar.*

CAL. *Spatha* communis bipartita: *laciniis* oblongis, bifidis, reflexis.

Spadix communis compressus, undique floribus in spicam digestis tectus.

COR. monopetala, tripartita. *Tubus* nullus; *lacinia* obovatæ, patentissima ac reflexa.

STAM. *Filamenta* duo, erecta, longitudine corollæ. *Antheræ* simplices.

* *Femina.*

CAL. *Spatha* uniflora, cylindracea, longa: ore bifido erecto.

Perianthium tripartitum, patens, superum: laciniis ovatis.

COR. *Petala* tria linearia, angustissima, truncata, calyce fere breviora.

Nectarium Cuspis patens, singulis stigmatibus superpositus.

PIST. *Germen* cylindricum, inferum, longum *Stylus* vix ullus. *Stigma* tripartitum: laciniis semibifidis, ovalibus, convexis, calyce longioribus, patentibus, supra pubescentibus.

PER. *Capsula* cylindracea, longa, unicapularis, unilocularis.

SEM. numerosa, ovata, lateri capsulae affixa.

OR. Mas. (*Vallisneroides* M.) scapo brevissimo, sub aqua, spicam floralem aperit: mox sejunguntur flosculi a planta, vagantur, aperiantur, vagantur, per aquae superficiem florentes a planta remoti.

Femina (*Vallisneria* M.) scapo spiraliter contorto brevi, sub aqua condit fructificationem: relaxata spirae aquae superficiem petit flos.

78. ANGURIA. Jacq. amer. 242.

* *Masculi* flores.

CAL. monophyllus, quinquesfidus, basi ventricosus: laciniis lanceolatis, brevibus.

COR. pentapetala, patens, calycis limbo adnata.

STAM. *Filamenta* duo, opposita, calyci inserta. *Anthera* sursum deorsumque repens.

* *Feminei* flores in eadem planta.

CAL. ut in Masculo.

COR. ut in Masculo.

STAM. *Filamenta* ut in Masculis. *Anthera* nulla.

PIST. *Germen* inferum, oblongum. *Stylus* semibifidus, *Stigmata* bifida, acuta.

PER. *Pomum* oblongum, quadrangulare, biloculare.

SEM. plurima, ovalia, compressa, nidulantia.

89. FORSTERA. Suppl. p. 59. Forst. act. ups. v. 3. p. 184.

CAL. *Perianthium* duplex.

exteriorius inferum, triphyllum, laterale: foliola oblonga, acuta.

interius superum, sexfidum: foliola erecta, oblonga, concava.

COR. *monopetala, tubuloso-campanulata. Tubus longitudine calycis. Limbus sexpartitus.*

Laciniae oblongae, obtusae, patulae, apice reflexae, aequales.

Nectarium. Squamulae duae, obovatae, petaliformes, stylo utrinque sub stigmate affixae.

STAM. *Filamenta duo brevissima, singulum inter stigma & nectarium squamulam stylo sub stigmate affixum. Antherae obovatae.*

PIST. *Germen inferum, ovale. Stylus cylindricus, erectus, longitudine tubi corollae. Stigmata duo, lata, patentia, subharbata.*

PER. *Capsula ovalis, unilocularis.*

SEM. *numerosa, scobiformia, receptaculo columnari affixa.*

80. DISA. *Suppl. p. 59.*

CAL. *Spatha univalvis, acuminata, oblonga, hinc longitudinaliter dehiscens.*

COR. *Petala tria, ovata, patentia, magna, subaequalia: superius impar, postice basi obtuse subcornuta.*

STAM. *Filamentum subulatum. Antherae duae, connatae in formam lanceolatam, corolla paulo breviorum, basi subulata, dehiscences, equitantes, supra stylum.*

Petalum dorsale staminum bipartitum, stamine brevius, laciniae oblongae, obtusae, conniventes.

PIST. *Germen inferum, longitudine spathae. Stylus lingulatus, brevis, basi excavatus, retrorsum bicornis.*

PER. *Capsula oblonga, trivalvis.*

SEM. *numerosa, minuta.*

81. ORCHIS. * *Tournef. 247. Limodorum Tournef. 250.*

CAL. *Spathae vagae. Spadix simplex. Perianthium nullum.*

COR. *Petala quinque: tria exteriora, duo interiora sursum conniventia in galeam.*

7 *Nectarium* monophyllum, a latere inferiore inter divisuram petalorum receptaculo affixum: *Labio* superiore erecto, brevissimo: *L. inferiore* magno, patente, glato. *Tubo* postice corniformi, nutante.

STAM. *Filamenta* duo, tenuissima, brevissima, pistillo infidentia. *Antheræ* obovatæ, erectæ, testæ duplicatura biloculari labii superioris nectarii.

PIST. *Germen* oblongum, contortum, inferum. *Stylus* adnatus labio superiori nectarii, brevissimus. *Stigma* compressum, obtusum.

PER. *Capula* oblonga, unilocularis, tricarinata, trivalvis, sub carinis trifariam dehiscens, apice & basi cohærens.

SEM. numerosa, minima, scobiformia.

82. SATYRIUM. *

CAL. *Spatha* vagæ. *Spadix* simplex.

Perianthium nullum.

COR. *Petala* quinque, ovato-oblonga: *tria* exteriora; *duo* interiora sursum conniventia in galeam.

Nectarium monophyllum, a latere inferiore inter divisuram petalorum receptaculo adnexum. *Labio* superiore erecto, brevissimo; *L. inferiore* plano pendulo, basi bursa scrotiformi postice prominente.

STAM. *Filamenta* duo, tenuissima, brevissima, pistillo infidentia. *Antheræ* obovatæ, testæ duplicatura biloculari labii superioris nectarii.

PIST. *Germen* oblongum, contortum, inferum. *Stylus* labio superiori nectarii adnatus, brevissimus. *Stigma* compressum, obtusum.

PER. *Capula* oblonga, unilocularis, tricarinata, trivalvis, sub earinis trifariam dehiscens, apice & basi cohærens.

SEM. numerosa, minima, scobiformia.

83. OPHRYS. * *Ophrys Tournef.* 250.

CAL. *Spatha* vagæ. *Spadix* simplex.

Perianthium nullum.

COR. *Petala* quinque oblonga, sursum conniventia, æqualia: *duo* horum exteriora.

DIANDRIA MONOGYNIA.

Nectarium petalis longius, dependens, postice tantum subcarinatum.

STAM. *Filamenta* duo, brevissima, pistillo insidentia.

Antheræ erectæ, testæ margine interiore nectarii.

PIST. *Germen* oblongum, contortum, inferum. *Stylus* margini interiori nectarii adnatus. *Stigma* obsoletum.

PER. *Capula* subovata, trigona, obtusa, striata, trivalvis, unilocularis, angulis carinatis dehiscens.

SEM. numerosa, scobiformia. *Receptaculum* lineare, adnatum singulæ valvulæ pericarpii.

OBS. O. Corallorrhiza *flamina* 4. *f. in singulis loculis duo habet.* Hall.

84. SERAPIAS. * Helleborine Tournef. 249.

CAL. *Spathæ* vagæ. *Spadix* simplex.

Perianthium nullum.

COR. *Petala* quinque, ovato-oblonga, erecto-patula, sursum conniventia.

Nectarium longitudine petalorum, basi excavatum, melliferum, ovatum, inferne, gibbum, trifidum, acutum: intermedia cordata, obtusa, basi cicatrice bifida tridentata.

STAM. *Filamenta* duo, brevissima, pistillo insidentia.

Antheræ erectæ, sub labio superiore nectarii collocatæ.

PIST. *Germen* oblongum, contortum, inferum. *Stylus* labio superiori nectarii adnatus. *Stigma* obsoletum.

PER. *Capula* obovata, obtuse trigona, tribus carinis adnatis, trivalvis, sub carinis dehiscens, unilocularis.

SEM. numerosa, scobiformia. *Receptaculum* lineare, singulæ valvulæ pericarpii adnatum.

85. LIMODORUM. † Gronou. virg. 110. Roy. lugdb. 16.

CAL. *Spathæ* vagæ. *Spadix* simplex.

Perianthium nullum.

COR. *Petala* quinque, ovato-oblonga, subæqualia, patentia: superioribus conniventibus.

Nectarium monophyllum, concavum, pedicellatum, intra petalum infimum, longitudine petalorum.

STAM. duo: *Filamentum* corpus oblongum, ascendens, longitudine corollæ. *Antheræ* binæ, ovatæ, antrosum spectantes.

PIST. *Germen* columnare, longitudine corollæ; inferum. *Stylus* filiformis, adnatus filamentorum corpori. *Stigma* infundibuliforme.

PER. *Capſula* columnaris, trivalvis, unilocularis, angulis dehiscens.

SEM. numerosa, scobiformia.

86. CYPRIPEDIUM. * *Calceolus Tourneſ.* 249.

CAL. *Spathæ* vagæ. *Spadix* simplex.

Perianthium nullum.

COR. *Petala* quatuor vel quinque, lanceolato-linearia, longissima, patentia, erecta.

Nectarium intra petalum inferum, calceiforme, inflatum, obtusum, cavum, petalis brevius, latius: *labio* superiore ovato, plano, inflexo, parvo.

STAM. *Filamenta* duo, brevissima, pistillo infidentia.

Antheræ erectæ, testæ labio superiori nectarii.

PIST. *Germen* longum, contortum, inferum. *Stylus* brevissimus, labio superiori nectarii adnatus. *Stigma* obsoletum.

PER. *Capſula* obtuse trigona: tribus futuris, sub quibus dehiscens angulis, trivalvis, unilocularis.

SEM. numerosa, minima. *Receptaculum* lineare, singulæ valvulæ pericarpium longitudinaliter adnatum.

87. EPIDENDRUM. * *H. P. B.* 127. *Vanilla Plum* 28.

CAL. *Spathæ* vagæ. *Spadix* simplex.

Perianthium nullum.

COR. *Petala* quinque, oblonga, longissima, patentissima.

Nectarium basi tubulatum, turbinatum, intra petala deorsum positum, ore obliquo, bifido: *superiori labio* brevissimo, trifido; *inferiori* in acumen producto.

STAM. *Filamenta* duo, brevissima, pistillo infidentia. *Antheræ* testæ labio superiore nectarii.

PIST. *Germen* tenue, longum, contortum, inferum. *Stylus* brevissimus, adnatus labio superiori nectarii. *Stigma* obsoletum.

PER. *Siliqua* longissima, teres, carnosæ.

SEM. numerosa, minutissima.

OBS. Species pleraque parasiticae arborum sunt.

OBS. Discrepant quoad floris structuram vehementer ab invicem, & profecto magis, quam quidem inter se Satyria, Ochides Ophresque. Unde qui multiplicationi generum favet, facile poterit hasce plantas in plura dispecere Jacq. amer. pag. 231.

Dantur species filamentis quatuor: alia est corolla tetrapetala, ut de aliis differentiis essentialibus taceam.

88. ARETHUSA. † Gron. Orchidion Mitch.

19.

CAL. Spatha foliacea.

Perianthium nullum.

COR. ringens. Petala quinque, oblonga, subæqualia, duo exteriora, omnia conniventia in galeam.

Nectarium monophyllum, basi tubulosum intra corollæ fundum, bipartitum: Labio inferiore reflexo, lato, rugoso, longitudine petalorum, propendente; L. superiore lineari, tenerrimo, stylo adnato, apice lobato.

STAM. Filamenta duo, brevissima, pistilli apici insidentia, Anthera ovata, compressa, testæ duplicatura labii interioris nectarii.

PIST. Germen oblongum, inferum. Stylus oblongus, incurvus, labio interiore nectarii vestitus. Stigma infundibuliforme.

PER. Capsula oblongo-ovata, unilocularis, trivalvis, angulis dehiscens.

SEM. numerosa, acerosa.

OBS. Nectarii labium inferius stylo adnatum esse. Veg. p. 816.

II. DIGYNIA.

89. GUNNERA.

CAL. Amentum verticillatum: squamis monophyllis, unifloris, fetaceis, longitudine floris, persistens.

Perianthium nullum, nisi crusta feminis bident.

COR. nulla.

STAM. Filamenta duo, brevissima, opposita, insidentia germinis lateribus extra dentes. Anthera oblonga.

PIST. Germen ovatum, apice bidentatum. Styli duo, breves, subulati, inter dentes germinis, Stigmata simplicia.

PER. nullum.

SEM. unicum, ovatum, crusta perianthina corticatum.

90. ANTHOXANTUM. *

CAL. Gluma uniflora, bivalvis: *valvulis* ovatis, acuminatis, concavis: interiore majore.

COR. Gluma uniflora, bivalvis, longitudine valvulae majoris calycinæ: valvula utraque aristam e dorso inferiore emittente: altera geniculata.

Nectarium diphyllum, tenuissimum, cylindricum: foliolis subovatis, amplexantibus.

STAM. Filamenta duo, capillaria, longissima. Anthera oblonga, utrinque bifurcata.

PIST. Germen oblongum. Styli duo, filiformes. Stigmata simplicia.

PER. Gluma corollæ adnascitur semini.

SEM. unicum, utrinque acuminatum, teretiusculum.

91. CRYPSIS. Aiton. Kew.

CAL. Gluma uniflora, bivalvis: *valvula* oblongo-lanceolata, carinata, mutica: exterior minor.

COR. Gluma bivalvis: *valvula* lanceolato-oblonga, mutica: interior calyce longior; exterior calyce brevior.

STAM. Filamenta duo, capillaria, corolla longiora. Anthera oblonga, cordata, incumbentes.

PIST. Germen superum, oblongum. Styli duo, capillares, staminibus breviores. Stigmata pilora.

PER. nullum. Corollæ semen includens.

SEM. unicum, teretiusculum.

III. TRIGYNIA.

92. PIPER. Saururus. * Plum. 12.

CAL. Spatha nulla perfecta.

Spalix filiformis, simplicissimus, flosculis tectus.

Perianthium nullum.

COR. nulla.

STAM. Filamenta nulla. Anthera duæ, oppositæ, ad radicem germinis, subrotundæ.

PIST. Germen majus, ovatum. Stylus nullus. Stigma triplex hispidum.

PER. Bacca subrotunda, unilocularis.

SEM. unicum, globosum.

Classis III.

TRIANDRIA.

I. MONOGYNIA.

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 93. <i>Phoenix.</i> | 125. <i>Macrolobium.</i> |
| 94. <i>Elate.</i> | 126. <i>Rohria.</i> |
| 95. <i>Osyris.</i> | 127. <i>Tapuca.</i> |
| 96. <i>Valeriana.</i> | 128. <i>Stilago.</i> |
| 97. <i>Melothria.</i> | 129. <i>Rotala.</i> |
| 98. <i>Crocus.</i> | 130. <i>Tragia.</i> |
| 99. <i>Iris.</i> | 131. <i>Omphalea.</i> |
| 100. <i>Marica.</i> | 132. <i>Ortega.</i> |
| 101. <i>Moraea.</i> | 133. <i>Polygonemum.</i> |
| 102. <i>Antholyza.</i> | 134. <i>Maba.</i> |
| 103. <i>Aristea.</i> | 135. <i>Ficus.</i> |
| 104. <i>Gladiolus.</i> | 136. <i>Scleria.</i> |
| 105. <i>Witsenia.</i> | 137. <i>Schænus.</i> |
| 106. <i>Xiphidium.</i> | 138. <i>Resio.</i> |
| 107. <i>Ixia.</i> | 139. <i>Cyperus.</i> |
| 108. <i>Dilatris.</i> | 140. <i>Scirpus.</i> |
| 109. <i>Wachendorfia.</i> | 141. <i>Eriophorum.</i> |
| 110. <i>Commelina.</i> | 142. <i>Apluda.</i> |
| 111. <i>Hernandia.</i> | 143. <i>Nardus.</i> |
| 112. <i>Hippocratea.</i> | 144. <i>Spartina.</i> |
| 113. <i>Tonfella.</i> | 145. <i>Lygeum.</i> |
| 114. <i>Salacia.</i> | 146. <i>Kyllinga.</i> |
| 115. <i>Læflingia.</i> | 147. <i>Fuirena.</i> |
| 116. <i>Willichia.</i> | 148. <i>Typha.</i> |
| 117. <i>Tamarindus.</i> | 149. <i>Sparganium.</i> |
| 118. <i>Callisia.</i> | 150. <i>Carex.</i> |
| 119. <i>Syena.</i> | 151. <i>Pommereulla.</i> |
| 120. <i>Rumphia.</i> | 152. <i>Olyra.</i> |
| 121. <i>Cncorum.</i> | 153. <i>Coix.</i> |
| 122. <i>Xyris.</i> | 154. <i>Zea.</i> |
| 123. <i>Comocladia.</i> | 155. <i>Cenchrus.</i> |
| 124. <i>Ola.</i> | |

II. DIGYNIA.

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 156. <i>Axyris.</i> | 177. <i>Ischæmum.</i> |
| 157. <i>Bobartia.</i> | 178. <i>Uniola.</i> |
| 158. <i>Panicum.</i> | 179. <i>Briza.</i> |
| 159. <i>Cornucopiæ.</i> | 180. <i>Poa.</i> |
| 160. <i>Aristida.</i> | 181. <i>Festuca.</i> |
| 161. <i>Alopecurus.</i> | 182. <i>Bromus.</i> |
| 162. <i>Muhlenbergia.</i> | 183. <i>Avena.</i> |
| 163. <i>Phleum.</i> | 184. <i>Arundo.</i> |
| 164. <i>Phalaris.</i> | 185. <i>Anthistiria.</i> |
| 165. <i>Paspalum.</i> | 186. <i>Secale.</i> |
| 166. <i>Milium.</i> | 187. <i>Triticum.</i> |
| 167. <i>Agrostis.</i> | 188. <i>Lappago.</i> |
| 168. <i>Dactylis.</i> | 189. <i>Hordeum.</i> |
| 169. <i>Stipa.</i> | 190. <i>Elymus.</i> |
| 170. <i>Lagurus.</i> | 191. <i>Spinifex.</i> |
| 171. <i>Andropogon.</i> | 192. <i>Lolium.</i> |
| 172. <i>Sacharum.</i> | 193. <i>Cynosurus.</i> |
| 173. <i>Perotis.</i> | 194. <i>Ægilops.</i> |
| 174. <i>Holcus.</i> | 195. <i>Rotthoella.</i> |
| 175. <i>Aira.</i> | 196. <i>Manisuris.</i> |
| 176. <i>Melica.</i> | 197. <i>Tripsacum.</i> |

III. TRIGYNIA.

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 198. <i>Holosteum.</i> | 206. <i>Minuartia.</i> |
| 199. <i>Polycarpon.</i> | 207. <i>Queria.</i> |
| 200. <i>Lechea.</i> | 208. <i>Amaranthus.</i> |
| 201. <i>Eriocaulon.</i> | 209. <i>Kænigia.</i> |
| 202. <i>Caturus.</i> | 210. <i>Triplaris.</i> |
| 203. <i>Montia.</i> | 211. <i>Excæcaria.</i> |
| 204. <i>Phyllanthus.</i> | 212. <i>Proserpinaca.</i> |
| 205. <i>Mollugo.</i> | 213. <i>Mehorea.</i> |

IV. POLYGYNIA.

214. *Empetrum.*

TRIANDRIA.

I. MONOGYNIA.

93. PHOENIX. † *Kæmpf.* 2. *Elate Mus. Cliff.*
12. *Katovindel H. M. III.* 23.

* *Masculi Flores.*

CAL. *Spatha* universalis univalvis. *Spadix* ramosus.

Perianthium tripartitum, minimum, persistens.

COR. *Petala* tria, concava, ovata, oblongiuscula.

STAM. *Filamenta* tria, brevissima. *Anthera* lineares, tetragonæ, longitudine corollæ.

* *Feminei Flores* in diversa planta aut eodem spadice.

CAL. ut in mare.

COR. (tripetala *Syst. Veg.*) tripartita, laciniis totidem exterioribus, & alternis minimis.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* subulatus, brevis. *Stigma* acutum.

PER. *Bacca* (*Drupa*) ovata, unilocularis.

SEM. unicum, osseum, subovatum, sulco longitudinali exaratum.

94. ELATE.

* *Masculi Flores.*

CAL. *Spatha* bivalvis. *Spadix* ramosus.

COR. *Petala* tria, subrotunda

STAM. *Filamenta* tria, simplicia. *Anthera* adnata.

* *Feminei Flores* in eodem spadice cum masculis.

CAL. *Spatha* communis cum masculis.

COR. *Petala* tria, subrotunda, persistentia.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* subulatus. *Stigma* acutum.

PER. *Drupa* ovata, acuminata.

SEM. *Nux* ovata, sulco exarata.

95. OSYRIS. *Casia Tournef.* 488.

* *Mas.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, trifidum, turbinatum, laciniis æqualibus, ovatis, acutis.

COR. nulla, nisi margo nectariferus triplex.

STAM. *Filamenta tria, brevissima. Anthera subrotunda, parva.*

* *Femina.*

CAL. *Perianthium ut in mare, superum, persistens, minimum.*

COR. *nulla ut in mare.*

PIST. *Germen turbinatum, inferum. Stylus longitudine staminum. Stigma globosum, tripartitum, patens.*

PER. *Bacca globosa, unilocularis, umbilicata.*

SEM. *Officulum globosum, pericarpium replens.*

96. VALERIANA. * *Tournef 52. Vaill. A. G. 1722. Valerianella Tournef. Vaill.*

CAL. *vix ullus. Margo superus.*

COR. *Tubus a latere inferiori nectariferus, gibbus; Limbus quinquefidus, laciniis obtusis.*

STAM. *tria vel pauciora, subulata, erecta, longitudine corollæ. Anthera subrotunda.*

PIST. *Germen inferum. Stylus filiformis, longitudine staminum. Stigma crassiusculum.*

PER. *crusta non dehiscens, decidua, coronata.*

SEM. *solitaria, oblonga.*

OBS. *Mira in hocce genere partium fructificationis diversitas quoad numerum & figuram in diversis speciebus observatur.*

eo. gr.

Calycis margo in quibusdam vix notabilis; in aliis quinquefidus.

Corollæ tubus in aliis oblongus; in aliis r. calcar mellifero instructus; in aliis brevissimus. Limbus in aliis æqualis; in aliis bilabiatus, labio superiori bifido.

Stamina in plerisque tria; in aliis duo, in aliis unicum; in sibirica quatuor; in aliis sexu distincta.

Pistilli Stigma in aliis trifidum; in aliis emarginatum. in aliis globosum.

Pericarpium in aliis fere nullum; in aliis Capsula crassa; in aliis biloculare.

Semina in quibusdam pappo coronata; in aliis nulla; figura varia.

97. MELOTHRIA. *

CAL. *Perianthium monophyllum, campanulatum, trilocosum, quinquecostatum, superum, deciduum.*

COR. monopetala; rotata. *Tubus* longitudine calycis; calyci undique adnatus. *Limbus* quinquepartitus, planus: laciniis extrorsum latioribus, obtusissimis.

STAM. *Filamenta* tria, conica, tubo corollæ inserta, ejusdemque longitudine. *Antheræ* didymæ, subrotundæ, compressæ.

PIST. *Germen* ovato-oblongum, acuminatum, subinferum. *Stylus* cylindricus, longitudine staminum. *Stigmata* tria, crassiuscula, oblonga.

PER. *Bacca* ovato-oblonga, interne absque dissepimentis tripartita.

SEM. plura, oblonga, compressa.

OBS. *Flores* masculos duos, præter hermaphroditos, semel vidi.

98. CROCUS. * *Tournef.* 183. 184.

CAL. *Spatha* monophylla.

COR. *Tubus* simplex, longus. *Limbus* sexpartitus, erectus: laciniis ovato-oblongis, æqualibus.

STAM. *Filamenta* tria, subulata, corolla breviora. *Antheræ* sagittatæ.

PIST. *Germen* inferum, subrotundum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigmata* tria, convoluta, serrata.

PER. *Capsula* subrotunda, triloba, trilocularis, trivalvis.

SEM. plura, rotunda.

99. IRIS. * *Tournef.* 186. 187. 188. Xiphion. T. 198. Sisyrrinchium. T. Hermodactylus. T.

CAL. *Spathæ* flores distinguentes persistentes.

COR. monopetala, inæqualis, sexpartita supera. *Filamenta* tria majora, geniculata: *Ungues* lineares, intus concavi, extus convexi, parum superne dilatati erecti: *Laminæ* oblongæ, patentes.

Genu barbatum vel imberbe. *Petala* tria alterna minora, erecto-patula.

Nectar. Linea longitudinalis in unguibus & genu petalorum majorum sæpe villosa.

STAM. *Filamenta* tria, germini inserta, lineari-subulata, corolla breviora, *Antheræ* oblongæ, stigmatibus tectæ.

PIST.

PIST. *Germen inferum, glabrum. Stylus brevissimus Stigmata tria, petaliformia, lineari-oblonga, intus carinata, extus sulcata, erecta, staminibus incumbentia, bilabiata. Labium exterius minus, emarginatum: interius majus, bifidum, subinflexum.*

PER. *Capsula infera, oblonga, angulata, glabra, trivalvis, trilocularis.*

SEM. *plurima, ovata, glabra.*

Xiphium T. *Radice bulbosa, foliis subulatis.*

Sisyrinchium T. *Radice bulbosa, duplici, altera alteri imposita.*

Hermodystylus T. *Radice tuberosa: Foliis tetragonis.*

Iris T. *Radice carnosâ, oblonga, repente: Foliis ensiformibus.*

100. MARICA. *Schreb. Cipura Aubl. guian.*
38. t. 13.

CAL. *Spathæ bivalves.*

COR. *sempartita. Petala tria exteriora ovata; tria interiora minora; omnia unguibus connata.*

STAM. *Filamenta tria, brevissima, tubo corollæ inserta. Antheræ oblongæ, erectæ.*

PIST. *Germen inferum, angulatum. Stylus trigonus. Stigmata tria petaliformia, simplicia, acuta.*

PER. *Capsula oblonga, angulata, trilocularis.*

SEM. *plura, angulata.*

101. MORÆA. *Mill. dict. Thunb. diff. propr.*
p. 3.

CAL. *Spatha duplex, exterior major: utraque convoluta, lanceolata, glabra erecta.*

COR. *submonopetala, campanulata, inæqualis, (post florescentiam spiraliter contorta). Lacinie tres majores obovatæ, obtusæ, tres minores breviores vel angustiores, oblongæ, obtusæ.*

STAM. *Filamenta tria, sæpe libera, rarius in cylindrum connata. Antheræ lineares vel ovaræ.*

PIST. *Germen inferum. Stylus filiformis erectus, corolla brevior. Stigma varium, simplex, bipartitum, trifidum sæpius, sexfidum, tripartito-multifidum, rarius trifido-cucullatum.*

PER. *Capsula* oblonga, glabra, trigona, trivalvis, trilocularis.

SEM. plurima, glabra.

102. ANTHOLYZA.

CAL. *Spathæ* bivalves, alternatæ, imbricatæ, flores distinguentes, persistentes.

COR. *Petalum* unicum e *Tubo* sensim dilatatum in faucem compressam, ringentem. *Labium* superius rectum, tenue, longissimum: *laciniis* duabus brevibus ad basin instructum; *labium* inferius brevius, trifidum.

STAM. *Filamenta* tria, longa, tenuia, sub labio superiori. *Anthere* acutæ.

PIST. *Germen* inferum. *Stylus* filiformis, situ & longitudine flaminum superiorum. *Stigma* trifidum, capillare, reflexum.

PER. *Capsula* subrotunda, trigona, trilocularis, trivalvis.

SEM. plura, triangularia.

OBS. *Gladiolis* nimis affine genus corollis differens: aliis faux inflata, compressa; aliis infundibuliformis corolla; aliis labium inferius brevissimum; aliis laciniis alternis abbreviatis; aliis hypocrateriformis corolla: limbo sexpartito, æquali.

103. ARISTEA. Aiton. Kew.

CAL. *Spathæ* bivalves.

COR. *Petala* sex, oblonga, subæqualia, patentia.

STAM. *Filamenta* tria, filiformia, petalis breviora. *Anthere* oblongæ, erecto-incumbentes.

PIST. *Germen* inferum, trigonum. *Stylus* filiformis, filamentis longior, declinatus. *Stigma* infundibuliforme, hians, margine fimbriatum, subtrigonum.

PER. *Capsula* oblonga, trigona, trilocularis, trivalvis.

SEM. plurima.

104. GLADIOLUS. * Tournef. 190. Thunb. diff. de Gladiolo pag. 5.

CAL. *Spatha* bivalvis, infera, corolla brevior. *Valvula* oblongæ, persistentes, exterior major interiorem includens.

COR. monopetala, tubulosa, supera. *Tubus* cylindricus, interdum basi filiformis, curvatus. *Limbus* sexpartitus, subcampanulatus: *lacina* suprema & infima extra vel intra laterales, oblongæ, erecto-patulae.

STAM. *Filamenta* tria, ori tubi inserta, filiformia, corolla breviora. *Antheræ* incumbentes, ovatae.

PIST. *Germen* inferum, triangulare, glabrum. *Stylus* filiformis, longitudine filamentorum. *Stigmata* tria; revoluta - patentia, obtusa, villosa.

PER. *Capsula* ovata, trigona, obtusa, striata, trivalvis; trilocularis.

SEM. plurima, glabra.

OBS. *Differt ab Antholyza: laciniis limbi subæqualibus: ab Ixia: tubo curvato & situ laciniarum limbi.*

105. WITSENIA. *Thunb. diff. nov. gen. p. 33.*

CAL. præter bracteas; nullus.

COR. monopetala, tubulosa, erecta, bracteis longior. *Tubus* cylindricus, sensim ampliatus, basi luteus, apice nigro - cæruleus. *Limbus* sexpartitus, erecto patens: *laciniæ* oblongæ, obtusæ; tomentosæ, luteæ, unguiculares.

STAM. *Filamenta* tria, tubo superne inserta; lineam longa. *Antheræ* oblongæ, erectæ, flavæ.

PIST. *Germen* superum. *Stylus* unicus, filiformis, erectus, apice cernuus, corolla paullo longior.

OBS. *Differt ab Ixia: Corolla cylindrica & stigmate emarginato; ab Antholyza: corolla regulari, æquali.*

106. XIPHIDIUM. *Læfling. Aubl. guian. 33:*

t. 11. Swartz.

CAL. nullus.

COR. sexpetala; æqualis, infera.

STAM. *Filamenta* tria, petalis interioribus opposita. *Antheræ* ovatae.

PIST. *Germen* superum. *Stylus* filiformis. *Stigma* simplex.

PER. *Capsula* subrotunda, trisulcata, trilocularis.

SEM. plurima, subrotunda, receptaculo globoso inserta.

107. IXIA. * *Thunb. diff. de Ixia p. 2.*

CAL. *Spatha* trivalvis, infera, corolla brevior: *valvulae* oblongæ, persistentes: exterior latior interiorem vaginans.

COR. monopetala, tubulosa, regularis, supera. *Tubus* filiformis, sensim ampliatus, rectus. *Limbus* campanulatus, regularis, sexpartitus: *laciniæ* oblongæ obtusæ, æquales, patentes.

STAM. *Filamenta* tria, filiformi-fubulata, tubo prope os inserta, corolla breviora. *Anthera* oblonga, fubulcata.

PIST. *Germen* inferum, triangulare, glabrum. *Stylus* simplex, filiformis, erectus. *Stigmata* tria, filiformia.

PER. *Capsula* ovata, trigona, striata, obtusa, glabra, trivalvis, trilocularis.

SEM. plura, rotundata, glabra.

OBS. Corolla lxiæ nunquam hexapetala.

108. DILATRIS. *Thunberg. Supp. p. 10.*

CAL. nullus.

COR. hexapetala, supera. *Petala* ovato-lanceolata, concava, erecto-patentia, æqualia, extus hirsuta, persistens.

STAM. *Filamenta* tria fubulata, corolla breviora: *tertium* reliquis minus. *Anthera* ovata, lanceolata, bifurcata: *tertia* in filamento minore major.

PIST. *Germen* inferum. *Stylus* filiformis. *Stigma* simplex, obtusum.

PER. *Capsula* globosa, hirsutissima, trivalvis, trilocularis.

SEM. in singulo loculamento solitaria, orbiculata, compressa, glabra, perpendicularia.

109. WACHENDORFIA. † *Burmam.*

CAL. *Spatha* bivalves.

COR. hexapetala, inæqualis: *Petala* oblonga: tribus superis erectioribus; tribus inferioribus patulis.

Nectarium setis duabus ad latera petali superioris interna.

STAM. *Filamenta* tria, filiformia, declinata, corolla breviora. *Anthera* incumbentes.

PIST. *Germen* superum, subrotundum, trigonum. *Stylus* filiformis, declinatus. *Stigma* simplex.

PER. *Capsula* subovata, triquetra, obtusa, 3-locularis, 3-valvis.

SEM. solitaria, hirta.

110. COMMELINA. * *Flum. 38. Zanonía Plum.*

38.

CAL. *Spatha* cordata, connivens, compressa, maxima, persistens.

COR. *Petala sex*, quorum *tria exteriora* parva, ovata, concava, perianthium mentientia; *tria vero interiora* alterna, maxima, subrotunda, colorata.

Nectaria tria, stamina mentientia, filamentis propriis insidentia; cruciformia, horizontalia. |

STAM. *Filamenta tria*, subulata, reclinata, figura & ambitu cum filamentis nectararii congruentia, iis tamen inferiora. *Antheræ* ovatæ.

PIST. *Germen superum*, subrotundum. *Stylus* subulatus, revolutus, longitudine staminum. *Stigma* simplex.

PER. *Capsula nuda*, subglobosa, trifurca, trilocularis, trivalvis.

SEM. bina, angulata.

OBS. Numerus differens est, hinc si *Petala* quatuor parva æqualia sint, tum e numero reliquarum partium unicam tertiam partem excludas, nectarariis autem unitatem addas & habebis numerum questum.

Zanonie Petala tria exteriora parva, perianthii formæ persistant; *tria vero interiora æqualia* sunt.

OBS. C. nudifloræ flores diandi.

III. HERNANDIA. † Plum. 40. Jacq. amer. 245.

* *Masculus Flor.*

CAL. *Involucrum* parziale, tetraphyllum, triflorum: foliolis ovatis, obtusis, patentissimis.

Perianthium nullum.

COR. *Petala sex*, subovata, patentia: quorum *tria interiora* angustiora.

Nectarium: Glandulæ sex, teretes, capitatæ.

STAM. *Filamenta tria*, brevia, receptaculo inserta. *Antheræ* erectæ, oblongæ, magnæ.

* *Femineus Flor.*

CAL. *Involucrum* commune cum masculis.

Perianthium inferum, monophyllum, campanulatum, integrum, persistens.

COR. *Petala octo*: quorum quatuor interiora angustiora, omnia germini insidentia.

Nectararii Glandulæ quatuor, obovatæ.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis. *Stigma* obliquum, subinfundibuliforme, magnum.

PER. *Perianthium* maximum, inflatum, subrotundum; ore integro; intra quod Drupa;

Drupa sicca, ovata, octo-fulcata, unilocularis.

SEM. *Nux* globosa, leviter depressa.

OBS. In *Syll. Vep* p. 707. *character generis*, a dato nonnihil discrepans ita breviter delineatur.

MISC. *Cal.* 3 partitus. *Corolla* tripetala.

FEM. *Cal.* truncatus, integerrimus. *Cor.* 6-petal. *Drupa* cava, ore aperta: nucleo mobili.

112. HIPPOCRATEA. *Jacq.* 9. *Coa Plum.* 35.

CAL. *Perianthium* monophyllum, patens, quinquepartitum, minimum, coloratum, deciduum: foliolis subrotundis, patentissimis, laciniis obtusis, corolla majoribus.

COR. *Petala* quinque, ovata, apicibus subbilocularia.

STAM. *Filamenta* tria, subulata, erecta, longitudine corollæ. *Antheræ* latae, sulco transversali.

PIST. *Germen* ovale. *Stylus* longitudine flaminum. *Stigma* obtusum

PER. *Capsulae* tres, obcordatae, compressae, magnae, loculis bivalvibus: valvulis carinato-compressis.

SEM. quina, oblonga, ala membranacea.

113. TONSELLA. *Schreb.* *Tontelea Aubl.* *guian.* 31. t. 10.

CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum, persistens, quinquepartitum: laciniis ovatis, acutis.

COR. *Petala* quinque, ovata, rudia, persistens, receptaculo inserta, calyce longiora.

Nectarium urceolatum, integerrimum, germen cingens.

STAM. *Filamenta* tria, nectarii parieti interno inserta, post anthesin patentia. *Antheræ* subrotundae.

PIST. *Germen* subrotundum, nectario cinctum. *Stylus* brevis. *Stigma* simplex.

PER. *Bacca* sphaerica, unilocularis, calyce & corolla excepta.

SEM. quatuor.

114. SALACIA. †

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum, brevissimum, patens: laciniis ovatis, acutis, persistentibus.

COR. *Petala* quinque, subrotunda, sessilia.

STAM. *Filamenta nulla. Antheræ tres, didymæ, basi divaricatæ, infidentes germinis apici.*

PIST. *Germen subrotundum, calyce maius. Stylus brevissimus, inter antheras. Stigma simplex.*

PER.

SEM.

Obs. *Stilagini ex caractere proximum genus, habitu diversum. Fructum non vidi, forte tricoccus.*

115. LOEFLINGIA. *

CAL. *Perianthium pentaphyllum, erectum: Foliolis lanceolatis, basi utrinque denticulo notatis, acuminatis, persistentibus.*

COR. *Petala quinque, minima, oblongo-ovata, in globum conniventia, rotunda.*

STAM. *Filamenta tria, longitudine corollæ. Antheræ subrotundæ, didymæ.*

PIST. *Germen ovatum, trigonum. Stylus filiformis, superne paullo latior. Stigma obtusiusculum.*

PER. *Capsula ovata, subtrigona, unilocularis, trivalvis.*

SEM. *plurima, ovato-oblonga.*

116. WILCHIA. *Auth. D. Mutis.*

CAL. *Perianthium monophyllum, quadrifidum, persistens: laciniis ovatis, acutis, patentibus.*

COR. *monopetala, rotata, calyce duplo longior. Tubus subnullus. Limbus quadrifidus, planus: laciniis subrotundis, convexis.*

STAM. *Filamenta tria, limbi divisuris (excepta infima) inserta, eoque breviora. Antheræ subrotundæ, erectæ, biloculares.*

PIST. *Germen superum, subrotundum, compressum. Stylus filiformis, longitudine staminum, declinatus ad divisuram limbi infimam. Stigma obtusum.*

PER. *Capsula subrotunda, compressa, apice acuta, bilocularis, bivalvis dissepimento opposito.*

SEM. *plura, subrotunda, minutata. Receptaculum globosum ex hemisphæriis duobus.*

117. TAMARINDUS. † *Tournef. 445. Jacq. amer. 10.*

CAL. *Perianthium quadripartitum, planum: laciniis ovatis, acutis, coloratis, deciduis.*

COR. *Petala* tria, ovata, plicata, æqualia, adscendentia, patentia, calycis longitudine, spatium pro quarto & infimo vacuum relinquentia.

Nectarium setis duabus sub filamentis sitis.

STAM. *Filamenta* tria, in sinu calycis vacuo simul posita, subulata, inferne connata, adscendentia, arcuata versus corollam. *Antheræ* ovatæ, incumbentes.

PIST. *Germen* oblongum, pedicellatum. *Stylus* subulatus, adscendens. *Stigma* crassiusculum.

PER. *Legumen* longum, compressum, vestitum duplici cortice, inter utrumque pulpa, uniloculare.

SEM. tria sapius, angulata, compressa.

118. *CALISIA* Læfing. *Hapalanthus* Jacq. -
amer. Ir.

CAL. *Perianthium* triphyllum: *foliis* lineari-lanceolatis, carinatis, erectis, persistentibus.

COR. *Petala* tria, lanceolata, acuminata, erecta, apice patula, calycis longitudine.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria, corolla longiora, apice dilatata lamina subrotunda.

Antheræ geminæ, globosæ, laminis lateri interiori affixæ.

PIST. *Germen* superum, oblongum, compressum. *Stylus* capillaris, longitudine staminum. *Stigmata* tria, patentia, penicilliformia.

PER. *Capsula* ovata, compressa, acuta, bilocularis, bivalvis, valvulis contrariis.

SEM. duo, subrotunda.

OBS. *Affinis* Commelinæ.

119. *SYENA* Schreb. *Mayaca* Aubl. *guian.* 15.

CAL. *Perianthium* triphyllum: *foliis* lineari-lanceolatis, acutis, patentibus, persistentibus.

COR. *Petala* tria, subrotunda, concava, patentia, longitudine calycis.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria. *Antheræ* oblongæ.

PIST. *Germen* superum, subrotundum. *Stylus* filiformis. *Stigma* trifidum.

PER. *Capsula* globosa, stylo coronata, unilocularis, tri-valvis.

SEM. sex, globosa, striata: duo singulæ valvulæ, unum supra alterum, affixa.

OBS. *Affinis* Commelinæ.

120. RUMPHIA.

CAL. *Perianthium* monophyllum, trifidum, erectum, planum.

COR. *Petala* tria, oblonga, obtusa, æqualia.

STAM. *Filamenta* tria, subulata, longitudine corollæ. *Antheræ* parvæ.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* subulatus, longitudine staminum. *Stigma* trigonum.

PER. *Drupa* coriacea, turbinata, trifurcata.

SEM. *Nux* ovata, integra, trilocularis.

121. CNEORUM. † *Chamælea* Tournef. 421.

CAL. *Perianthium* minimum, tridentatum, persistens.

COR. *Petala* tria, oblonga, lanceolato-linearia, concava, erecta, æqualia, decidua.

STAM. *Filamenta* tria, subulata, corolla breviora. *Antheræ* parvæ.

PIST. *Germen* obtusum, trigonum. *Stylus* erectus, firmus, longitudine staminum. *Stigma* trifidum, patens.

PER. *Bacca* sicca, globoso-triloba, trilocularis.

SEM. solitaria, rotunda.

122. XYRIS, † *Gronou.*

CAL. *Spica* subrotunda: *squamis* subrotundis, concavis, imbricatis, flores distinguuntibus.

Gluma bivalvis, parva: *valvulis* navicularibus, compressis, arcuatis, acutis, conniventibus.

COR. *Petala* tria, plana, patentia, magna, crenata: *unguibus* angustis, longitudine calycis.

STAM. *Filamenta* tria, filiformia, corolla breviora. *Antheræ* erectæ, oblongæ.

PIST. *Germen* superum, subrotundum. *Stylus* filiformis. *Stigma* triplex.

PER. *Capsula* subrotunda, trilocularis, trivalvis.

SEM. plurima, minutissima.

123. COMOCLADIA. *Brown. Jacq. amer.* 12.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tripartitum, patens, coloratum; *laciniis* subrotundis.

COR. *Petala* tria, ovata, acuta, plana, patentissima.

STAM. *Filamenta* tria, subulata, corolla breviora. *Antheræ* subrotundæ, incumbentes.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* nullus. *Stigma* obtusum. simplex.

PER. *Drupa* oblonga, curva, superne notata punctis tribus.

SEM. *Nux* membranacea, figura drupæ.

124. OLAX. †

CAL. *Perianthium* monophyllum, concavum, brevissimum, integerrimum.

COR. monopetala infundibuliformis: *Limbus* trifidus, obtusus: lacinia tertia profundiore.

Nectaria quatuor, rotunda, petiolata, corolla breviora, erecto-conniventia, in fauce corollæ.

STAM. *Filamenta* tria, subulata, nectariis alterna, iisque breviora. *Antheræ* simplices.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis, staminibus longior. *Stigma* capitatum.

PER. - - - - -

SEM. - - - - -

125. MACROLOBIUM Schreber. *Outea Aublet. guian. t. 9. Vouapa ejusd. t. 7.*

CAL. *Perianthium* duplex.

P. exterius diphyllum: *foliolis* oppositis, ovato-oblongis, interioris basi adnatis.

P. interius monophyllum, turbinatum, breve: ore obliquo, quinquedentato.

COR. pentapetala, inæqualis.

Petalum superius maximum, erectum, unguiculatum, oblongum, obtusum, concavum, undulatum, perianthio interiori insertum.

Petala inferiora quatuor, parva, ovata, patentia, perianthio interiori superius adnata.

STAM. *Filamenta* quatuor, perianthio interiori inserta; unum breve, sterile, sub petalo maximo; tria longissima, filiformia, antherifera, sub petalis minoribus adnata. *Antheræ* tetragonæ.

PIST. *Germen* pedicellatum, ovatum. *Stylus* filiformis, *Stigma* obtusum.

PER. *Legumen* ovatum, compressum, coriaceum, uniloculare.

SEM. unicum, subrotundum, compressum.

OBS. *Outea* & *Vouapa* Aubl. non distinguenda esse videntur, quum in utraque corolla, stamina fertilia & pistillum

convenient numero, figura & situ partium; quamquam in illa fructum maturum non invenit, in hac vero petala minora a calyce non distinxit inventor.

136. ROHRIA. Schreb.

CAL. Perianthium monophyllum, campanulatum, quinquepartitum: laciniis ovatis, concavis, obtusis, ciliatis, coriaceis: duabus interioribus, paullo longioribus.

COR. Petala quinque, erecta, calyce longiora, quorum duo superiora paullo majora, tria inferiora minora. Lingues angusti, basi latiores, interne lanati, sub laninis paullulum extrorsum flexi. Lamina ovata, erecta; petalorum majorum introrsum inflexo-cucullata; minorum expansa, obtusiuscula.

STAM. Filamenta tria, unum inter petala duo majora, duoque ad horum latera, cum eorum unguibus inferne connata, filiformia, corolla longiora, interne lanata. Anthera subrotunda, erecta, introrsum spectantes.

PIST. Germen turbinatum, tomentosum. Stylus filiformis, longitudine staminum, villosus. Stigmata tria, revoluta.

PER. —

SEM. —

127. TAPURA Aubl. guian. 48.

CAL. Perianthium exterius parvum, trifidum. Interius monophyllum, sexpartitum: laciniis ovatis, concavis, obtusis, inaequalibus.

COR. monopetala. Tubus brevis. Limbus bilabiatus: labio superiore oblongo, concavo, erecto, tridentato; inferiore bifido, laciniis brevibus, obtusis.

STAM. Filamenta tria, filiformia, longa, duoque breviora. Anthera tres oblongae in filamentis longioribus; in brevibus parvae.

PIST. Germen subrotundum, trifidum. Stylus longus, pubescens, ad labium superius inclinatus. Stigma trifidum, obtusum.

SER. Capsula? - -

SEM. - - -

128. STILAGO.

CAL. Perianthium monophyllum, hemisphaericum, subintegerrimo-trilobum,

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* tria, germini infidentia, patentia, calyce longiora.

PIST. *Germen* superum, subrotundum. *Stylus* cylindricus, persistens, staminibus brevius. *Stigma* verrucosum.

PER. *Bacca* globosa.

SEM. - - -

129. ROTALA.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulosum, membranaceum, tridentatum, persistens.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria, longitudine calycis. *Anthera* subrotunda.

PIST. *Germen* superum, ovatum. *Stylus* filiformis. *Stigma* trifidum.

PER. *Caps.* ovata, subtrigona, calyci inclusa, trilocularis, trivalvis.

SEM. plurima, subrotunda.

130. TRAGIA. * *Plum. gen. 12. Jacq. amer.*

245.

* *Masculi flores.*

CAL. *Perianthium* tripartitum : laciniis ovatis, acutis, planis, patentibus.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* tria, longitudine calycis. *Anthera* subrotunda.

Obs. *Calycem* hunc esse *petalum infundibuliforme* statuit *Plumier*.

* *Feminei* in eadem planta cum masculis.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum : foliolis ovatis, concavis, acutis, persistentibus.

COR. nulla.

PIST. *Germen* subrotundum, trifidum. *Stylus* unicus, erectus, calyce longior. *Stigma* trifidum, patens.

PER. *Capsula* tricocca, subrotunda, trilocularis, hispida : loculis singulis extus ad basin punctis duobus notatis.

SEM. solitaria, globosa.

131. OMPHALEA. † *Omphalandra Brown.*

* *Masculi,*

CAL. *Perianthium* tetraphyllum : foliolis ovatis, concavis.

COR. nulla.

STAM. *Receptaculum* ovatum. *Antheræ* 2. f. 3. receptaculi lateribus immerse.

* *Feminei* in eadem planta.

PIST. *Perianthium* quadripartitum : laciniis ovato-cordatis, obtusis : duabus exterioribus oppositis.

COR. nulla.

PIST. *Germen* subrotundum, brevissimum. *Stylus* cylindricus, calyce longior. *Stigma* subtrifidum, latius, obtusum.

PER. *Capsula* carnosæ, ovata, trilocularis.

SEM. solitaria, oblonga.

132. ORTEGIA. † *P. Læfing.*

CAL. *Perianthium* pentaphyllum, erectum : foliolis ovalibus, marginibus membranaceis, persistens.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* tria, subulata, calyce breviora. *Antheræ* lineares, compressæ, filamentis breviores.

PIST. *Germen* ovatum, superne triquetrum. *Stylus* filiformis, calycis fere longitudine. *Stigma* capitato-obtusum.

PER. *Capsula* ovata, superne trigona, unilocularis, apice trivalvis.

SEM. plurima, minutissima, oblonga, utrinque acuta.

OBS. O. dichotomæ *stigmata* tria distincta. Maxime adfuit Polycarpo.

133. POLYCNUM. *

CAL. *Perianthium* foliolis tribus, lanceolatis, erectis, acutis, persistentibus.

COR. *Petala* quinque, calyciformia.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria, calyce breviora. *Antheræ* obtusæ.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* bipartitus, longitudine staminum. *Stigmata* obtusa.

PER. vix ullam, nisi membrana tenuissima.

SEM. unicum, subnudum.

134. MABA. *Suppl. p. 65. Forst. charact. gen. n. 61.*

* *Masculi.*

CAL. *Perianthium* trifidum ultra mediam. *Laciniæ* oblongæ, parallelæ, canaliculatæ.

COR. monopetala, tubulosa, extus villosissima, calyce longior. Limbus trifidus. Laciniae crassiusculae, erectae.
 STAM. Filamenta tria, brevissima. Anthera erecta, ovata.

PIST. nullum.

* *Feminei* in distincta planta.

CAL. Perianthium ut in mare.

COR. ignota.

PIST. non visum.

PER. Doupa superba, ovata, oblonga, bilocularis. Loculamenta disperma.

SEM. Noces duae, oblongae, triquetrae.

135. FICUS. * *Tournef.* 420. *Hire A. G.* 1712. t. 15. *anth.* 11. f. 10. Caprificus *Pont. ibid.*

Receptaculum commune turbinatum, carnosum, concavum, connivens. Hujus interna superficies undique tecta est flosculis, quorum exteriores, seu margini calycis propiores Masculi sunt pauciores; reliqui inferiores Feminei numerosi:

* *Masculus flos singulus pedunculo insidens.*

CAL. Perianthium proprium tripartitum, erectum: lacinii lanceolatis, erectis, aequalibus.

COR. nulla.

STAM. Filamenta tria, fetacea, longitudine calycis. Anthera didyna.

PIST. Rudimentum caducum, intortum.

* *Femineus flos singulus pedunculo insidens, cujus*

CAL. Perianthium proprium quinquepartitum: lacinii lanceolato-acuminatis, rectis, subaequalibus.

COR. nulla.

PIST. Germen ovale, magnitudine perianthii proprii. Stylus subulatus, inflexus, ad latus apicis e germine prodiens. Stigmata duo, acuminata, reflexa: altero brevior.

PER. nullum. Calyx obliquus, in sinu continens semen majus.

SEM. unicum, subrotundum, compressum.

OBS. Caprificus in distincta planta solos flosculos masculos intra calycem communem comprehendit.

Erenosyce alios flores compositos masculos, alios femineos in distincta planta.

136. SCLERIA. *Perg. in act. svec. 1765. p.*
148. c. ic. *Swartz.*

* *Flores masculi*, in eadem panicula cum femineis mixti.

CAL. *Gluma* 2 - vel 6 - valvis, disliche imbricata, ovata, multiflora: *valvulis* ovatis, acuminatis, carinatis, concavis, arcte clausis, integerrimis, persistentibus: *inferioribus* minoribus, angustioribus.

COR. *Valvulae* plurimae, oblongae, persistentes, calyce paulo longiores, stamina distinguentes

STAM. *Filamenta* unum vel tria s. tacea, longitudine corollae, intra unamquamque valvulam corollae. *Antherae* incrassatae.

* *flores feminei.*

CAL. ut in mare, sed uniflorus.

COR. bivalvis, *valvulis* lanceolatis, acutis, oblique flexis, calyce brevioribus.

PIST. *Germen* subrotundum, basi innixum fundamento, ore subciliato. *Stylus* filiformis. *Stigma* unum vel tria.

PER. nullum.

SEM. unicum, globosum, subosseum, magnum, nitidum, apice tuberculatum, basi cinctum calyce.

137. SCHOENUS. * *Cyperella. Mich. 31.*
Pseudo-Cyperus Mich. 31. Melano-
schoenus. Mich. gen. 31.

CAL. *Gluma* communis multiflora, bivalvis, magna, erecta, attenuata, persistens.

COR. *Petala* sex, lanceolata; acuta, conniventia, persistentia, situ inaequalia, fereque imbricata: exterioribus brevioribus.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria. *Antherae* oblongae, erectae.

PIST. *Germen* ovato-triquetrum, obtusum. *Stylus* setaceus, longitudine corollae. *Stigma* trifidum, tenue.

PER. nullum. *Corolla* laxè connivens, demittens maturum semen.

SEM. unicum, subovatum, superne crassius, obsolete trigonum, nitidum.

OBS. *Dantur sp. cies, in qua setae aliquot minime e receptaculo proprio enatae semen cingunt.*

OBS. *In Syst. Veg. p. 95. talis datur generis character.*

CAL. *Glumæ paleaceæ, uniuales, congestæ.*

COR. nulla.

SEM. 1. *subrotundum inter glumas. R.*

138. RESTIO. *Syst. nat. 12. p. 735. Rottbæll. icon. & descript. p. 1. Chondropetalum. Rottbæll. l. c. Thunberg. diff. bot. p. 5.*

Flores dioici, collecti intra strobilum.

CAL. *Sexglumis, compressus, subæqualis, valde raro æqualis, glaber, uniflorus. Glumæ exteriores obversæ, naviculares: interiores lanceolata, tenuiores.*

COR. nulla, nisi glumæ tres interiores.

STAM. *Filamenta tria. Antheræ oblongæ.*

PIST. *Germen superum. Stylus unicus plerumque, rarius duplex, rarissime triplex. Stigma raro simplex, sæpissime duo, rarissime tria, plumosa.*

PER. *SEMEN obscurum.*

139. CYPERUS. * *Mich. 31. Tournef. 299.*

CAL. *Spica distiche imbricata: squamis ovatis, carinatis, plano-inflexis, flores distinguuntibus.*

COR. nulla.

STAM. *Filamenta tria, brevissima. Antheræ oblongæ, fuscæ.*

PIST. *Germen minimum. Stylus filiformis, longissimus. Stigmata tria, capillaria.*

PER. *nullum.*

SEM. *unicum, triquetrum, villis destitutum.*

140. SCIRPUS. * *Mich. 31. Tournef. 300. Scirpocyperus. Mich. 31.*

CAL. *Spica undique imbricata: squamis ovatis, plano-inflexis, flores distinguuntibus.*

COR. nulla.

STAM. *Filamenta tria, tandem longiora. Antheræ oblongæ.*

PIST. *Germen minimum. Stylus filiformis, longus. Stigmata tria, capillaria.*

PER. *nullum.*

SEM. unicum, triquetrum, acuminatum, villis calyce brevioribus instructum.

OBS. Villi isti seminis in aliis ad apicem, in aliis ad basin semini annectuntur.

OBS. In Syst. Veg. p. 98. ita characterem exhibet ill. Autor.

CAL. Glumæ paleacea, undique imbricata. Corolla nulla. Semen 1. imberbe.

141. ERIOPHORUM. * Linagrostis Mich. 31. Tournef.

CAL. Spica undique imbricata: squamis ovato-oblongis, plano-inflexis, membranaceis, laxis, acuminatis, flores ostinguentibus.

COR. nulla.

STAM. Filamenta tria, capillaria. Anthera, erecta, oblonga.

PIST. Germen minimum. Stylus filiformis, longitudine squamæ calycis. Stigmata tria, stylo longiora, reflexa.

PER. nullum.

SEM. triquetrum, acuminatum, villis spica longioribus instructum.

OBS. E. alpino spica pappo brevior est.

142. APLUDA. †

CAL. Gluma communis, bivalvis, præmorsa, continens flosculum Feminæ sessilem, & Masculo, 2 pedicello communi.

* Feminæ.

CAL. nullus.

COR. Gluma bivalvis: valvula exteriori obovata, retusa, obvoluta interiori lanceolata.

PIST. Germen obovatum. Stylus filiformis, longitudine corollæ, pubescens. Stigma simplex.

PER. Gluma adnascens.

SEM. unicum, oblongum.

* Masculi 2 in pedicello longitudine calycis.

CAL. nullus.

COR. Gluma bivalvis, minor; valvulis ovato-oblongis: altera minore.

STAM. Filamenta 3, capillaria. Anthera oblonga, biloba.

143. NARDUS. *

CAL. nullus.

COR. bivalvis: *Valvula exterior* lanceolato-linearis, longa, mucronata, ventre amplexens minorem; *V. minor* interior, linearis, mucronata.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria, corolla breviora. *Anthera* oblonga.

PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* unicus, filiformis, longus, pubescens. *Stigma* simplex.

PER. *Corolla* adnascitur femini, nec dehiscit.

SEM. unicum, testum; lineari-oblongum, utrinque acuminatum, superne angustius.

144. SPARTINA. Schreb.

CAL. *Gluma* uniflora, bivalvis, compressa: *Valvulis* navicularibus, compressis, carinatis, conniventibus: *interiore* longiore, latioreque dorso striata, mucronata.

COR. bivalvis, calycina *interiore* brevior: *Valvulis* subæqualibus, linearibus, compressis, obtusiusculis, amplexantibus: *interiore* paullo longiore.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria, brevissima. *Anthera* lineares, basi bifida, acutiusculæ.

PIST. *Germen* lineare, acutum. *Stylus* filiformis, erectus, filamentibus longior. *Stigmata* duo, villosa.

PER. nullum. *Calyx* includit, demittit.

SEM. oblongum, compressum.

145. LYGEUM. * Læfng.

CAL. *Spatha*, monophylla, convoluta, ovata, acuminata, deorsum dehiscens, persistens.

COR. binæ, germini infidentes, æquales utrinque. *Corollula* gluma bivalvis: *Valvula exterior* convexa, oblonga, acuta, minore: *Valvula interior* lineari, angusta, duplo longiore, bifida, acuta.

STAMINA (singulis) *Filamenta* tria, tenuissima, planiuscula, longa. *Anthera* lineares.

PIST. *Germen* utrisque commune, hirsutum, inferum corollarum. *Stylus* simplex, planiusculus, longus. *Stigma* simplex.

PER. *Nux* oblonga, hirsutissima, bilocularis, non dehiscens.

SEM. solitaria, lineari-oblonga, hinc convexa, inde planiuscula.

146. KYLLINGIA. *Rottböll. gram. Suppl. p. II.*

CAL. *Gluma* inæqualis, compressa, bivalvis. *Valvula* lanceolata; canaliculata, acuta, corolla multo breviores: altera brevior.

COR. *Gluma* calyce longior, compressa, bivalvis. *Valvula* carinata, inæquales, apice divaricata: altera major, lanceolata, acutissima, complicata, marginem alterius amplectens: altera brevior, angustior.

STAM. *Filamenta* tria, subulata, plana. *Antheræ* lineares, erectæ.

PIST. *Germen* obovatum, complanatum, margine altero gibbum. *Stylus* unicus, filiformis. *Stigmata* duo f. tria, capillaria.

PER. nullum, sed *glumæ* corollinæ ad maturitatem semen conservantes.

SEM. oblongum, triquetrum, villis destitutum.

147. FUIRENA. *Rottböll. gram. Suppl. p. II.*

Amentum oblongum, teres, imbricatum. *Squamæ* canaliculata, cuneiformes, tricarinata, apice aristata. *Arista* teres, recta, *gluma* brevior.

Flos intra singulam *squamulam* solitarius, minimus, tuberculo insidens.

CAL. nullus.

COR. *Gluma* trivalvis. *Valvula* petaliformes, obcordata, submembranaceæ, planæ, integerrimæ, in emarginatura apicis filo incurvo terminatæ.

STAM. *Filamenta* tria, linearia, inter *glumas* corollinas receptaculo inserta. *Antheræ* lineares, erectæ.

PIST. *Germen* magnum, triquetrum. *Stylus* filiformis, *Stigmata* duo, revoluta.

PER. nullum, nisi corolla emarcida semen includens.

SEM. triquetrum, nudum, villis destitutum.

148. TYPHA. * *Tournef. 301.*

* *Masculi* numerosi in amento culmum terminantæ.

CAL. *Amentum commune* cylindricum, densissimum, constans.

Perianthiis propriis triphyllis, setaceis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria, longitudine calycis. *Antheræ* oblongæ, pendulæ.

Feminei numerosi in amento, culmum eundem cingente, compactissime digesti.

CAL. *Capilli* papposi.

COR. nulla.

PIST. *Germen* setæ insidens, ovatum. *Stylus* subulatus.
Stigma capillare, persistens.

PER. nullum. *Fructus* numerosi cylindrum constituunt.

SEM. unicum, ovatum, stylo instructum, setæ insidens.

Pappus capillaris, setæ seminiferæ quasi affixus, longitudine pistilli.

149. SPARGANIUM. *Tournef.* 302.

* *Masculi* numerosi, in capitulum collecti.

CAL. *Amentum* commune subrotundum, undique densissime imbricatum, constans.

Perianthis propriis triphyllis, linearibus, deciduis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria, longitudine calycis.

Anthera oblongæ.

* *Feminei.*

CAL. ut in masculo. *Receptaculum* commune subrotundum.

COR. nulla.

PIST. *Germen* ovatum, desinens in *Stylum* brevem, subulatum. *Stigmata* duo, acuta, persistentia.

PER. *Drupa* exsucca, turbinata cum acumine, inferne angulata.

SEM. *Nuces* duæ, osseæ, oblongo-ovatae, angulatæ.

OBS. *Semen* in aliis uniloculare, in aliis biloculare observat *Tournefortius*.

150. CAREX. * *Cyperoides.* *Tournef.* 299.

Scheuch. 10. 11. *Mich.* 32. *Scirpoides*

Mont. 17. *Carex* *Dill.gen.* 13. *Mich.* 33.

* *Masculi Flores* in spicam digesti.

CAL. *Amentum* oblongum, imbricatum, constans.

Squamis unifloris, lanceolatis, acutis, concavis, persistentibus.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* tria, setacea, erecta, calyce longiora.

Anthera erectæ, longæ, lineares.

* *Feminei Flores* in eadem vel (quibusdam) in distincta planta.

CAL. *Amentum* ut in masculis.

COR. *Petala* nulla.

Neclarium inflatum, ovato-oblongum, apice bidentatum, superne contractum, ore dehiscens, persistens.

PIST. *Germen triquetrum*, intra nectarium. *Stylus brevissimus*. *Stigmata tria vel duo*, subulata, incurva, longa, acuminata, pubescentia.

PER. nullum. *Nectarium majus factum semen fovet.*

SEM. unicum, ovato-acutum, triquetrum, altero angulo sæpius minore.

ORS. *Scirpoides* Mont. *Carex* Rupp. Dill. Mich. flores masculos & femineos in eadem spica gerit.

Cyperoides Mont. Rupp. Dill. Mich. flores masculos & femineos in distincta spica.

151. POMMEREULLA. Suppl. p. 12.

CAL. *Gluma turbinata*, triflora s. quadriflora, bivalvis, *Valvulae æquales*, cuneiformes, basi divaricatæ. *Unguis incurvus*, linearis, sensim dilatatus, quadrifidus. *Lacinie in orbem dilatatæ & flosculos involventes*, inæquales: *laterales majores*, lanceolatæ, acutæ: *interiores intermediae sesquibreviores*. subulatæ, aristatæ.

Arista dorsalis, inter lacinias minores inserta, recta, erecta, valvulis longior.

COR. *Gluma bivalvis*. *Valvulae inæquales*: *exterior calycinis simillima*, etiam aristata: *interior brevissima*, simplicissima, indivisa, ovata, plana, mutica.

STAM. *Filamenta tria*, brevissima. *Antheræ lineares*, longitudine valvularum.

PIST. *Germen unicum*, lineare. *Stylus simplex*. *Stigmata duo*, latere villosa.

PER. *Corolla immutata semen ad maturitatem continens*, quo facto, dehiscens, idemque demittens.

SEM. unicum, oblongum, latere interiore planum, exteriore convexum, pellucidum, glaberrimum.

152. OLYRA. †

* *Masculi flores infra femineos.*

CAL. *Gluma 2-valvis*, uniflora: *valvulis lanceolatis*: altera in aristam terminata.

COR. *Gluma bivalvis*, longitudine calycis.

STAM. *Filamenta tria*, capillaria, brevissima. *Antheræ oblongæ*.

* *Feminei solitarii*, terminales in eadem panicula.

CAL. *Gluma bivalvis*, uniflora, æqualis, magna, patula: *valvulis ovatis*, concavis, acuminatis: altera arista terminali.

COR. *Gluma* bivalvis, brevissima, cartilaginea, mutica.
 PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* brevis, bifidus. *Stigmata* duo.
 PER. *Gluma* corollæ involvens, decidens.
 SEM. ovatum, obtusum, cartilagineum.

153. COIX. * *Lacryma* Job. *Tournef.* 309.

* *Masculi* in spicam laxam digesti.

CAL. *Gluma* biflora, bivalvis: *valvulis* oblongo-ovatis, obtusis, muticis: *exteriore* crassiore.

COR. bivalvis: *valvula* ovato-lanceolata, longitudine calycis, tenuissima, mutica.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria. *Antheræ* oblongæ, tetragonæ.

* *Feminei* pauciores ad basin spicæ masculæ, in eadem planta.

CAL. *Gluma* biflora, bivalvis: *valvulis* rotundatis, crassis, nitidis, duris: *exteriore* majore; nitida.

COR. *Gluma* bivalvis: *valvula* exterior ovata, major; interior angustior, minor; utraque mutica.

PIST. *Germen* ovatum, minimum. *Stylus* brevis, bipartitus, *Stigmata* duo, corniculata, flore longiora, undique pubescentia.

PER. nullum. *Gluma* exterior *calycina* arcte adnascitur, increfcit, nitet, decidit, non dehiscit.

SEM. solitarium, subrotundum, calyce ossificato tectum.

154. ZEA. * *Mays* *Tournef.* 303. 304. 305.

* *Masculini* in spicas distinctas laxas dispositi.

CAL. *Gluma* biflora, bivalvis: *valvulis* ovato-oblongis, muticis.

COR. *Gluma* bivalvis: *valvulis* oblongis, muticis, longitudine calycis.

Neſſaria duo, compressa, brevissima.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria. *Antheræ* quadrangulæ, quadriloculares, apice dehiscentes.

* *Feminei* in spica densissima infra masculos, in eadem planta, foliis obecta.

CAL. *Gluma* propria bivalvis: *squamis* subrotundis, crassius, brevissimis: *exteriore* crassiore.

COR. bivalvis: *valvulis* membranaceis, latis, brevissimis, persistentibus.

PIST. *Germen* minimum. *Stylus* filiformis, omnium longissimus, pendulus. *Stigma* simplex, versus apicem pubescens.

PER. nullum, *Receptaculum commune* maximum, longum, excavatum, in quo ad dimidiam partem demersi sunt fructus, calyce & corolla propria cineti.

SEM. solitaria (post singulos flores), subrotunda, basi angulata, compressa.

155. CENCHRUS. * *Panicastrella Mich.* 31.

CAL. *Involucra* plura, laciniata, echinata, in capitulum congesta: singulis sessilibus tres calyces includentibus; biflora.

Perianthium Gluma bivalvis, lanceolata, concava, acuminata, biflora, corolla brevior.

COR. altera mascula, altera hermaphrodita.

Propria singula bivalvis: valvulis lanceolatis, acuminatis, concavis, muticis; interiore minore.

STAM. singulis *Filamenta* tria, capillaria, longitudine corollulæ. *Antheræ* sagittatæ.

PIST. Hermaphroditi *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigmata* duo, oblonga, pilosa, patentia.

PER. nullum.

SEM. subrotundum.

OBS. *Datur species floribus omnibus hermaphroditis.*

II. DIGYNIA.

156. AXYRIS. * *Ceratoides Tournef. cor?*

* *Masculi flores* in amenta digesti.

CAL. *Perianthium* tripartitum, patens, obtusum.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* tria, linearia, patentia. *Antheræ* subrotundæ.

* *Feminei flores* sparsi.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum, (diphyllum, *syss. Veg.* 706.), concavum, obtusum, connivens, persistens: foliolis duobus exterioribus brevioribus.

COR. nulla.

PIST. *Germen* subrotundum. *Styli* duo, capillares. *Stigmata* acuminata.

PER. nullum. *Calyx* foliolis tribus majoribus acute fermen involvens.

SEM. unicum, oblongum, compressum, obtusum, apice emarginatum.

OBS. Axyridem *ceratoidem* Lin. novum constituere genus, omnino intermedium inter Atriplicem, Urticam & Ceratocarpum, observationes clariss. Gueldenstaedt edocent, qui ideo ipsi nomen Krascheninnikovia imposuit. Non ingratum fore Lectoribus speramus, si characterem novi hujus generis, ad naturæ nutum ab Auctore in Nov. Com. Petropol. vol. XVI. p. 458. t. 17. concinnatum hic communicamus.

* Masculi flores subamentacei.

CAL. Perianthium tetraphyllum, persistens: foliolis æqualibus, obtusis, concavis, in globulum conniventibus.

COR. nulla.

STAM. Filamenta quatuor, capillaria, thalamo inserta, foliolis calycinis opposita, eorumque longitudine. Anthera subrotundæ, didymæ.

* Feminei flores in eadem cum masculis planta.

CAL. Perianthium monophyllum, urceolato-compressum, sulco utrinque carinatum, subbiduum: laciniis cornuto-erectis, parallelis, tubuloso-concavis; fauce inter laciniarum sinum angustissima, perforata.

COR. nulla.

PIST. Germen ovatum, superum. Stylus simplex, per faucem perianthii transeuns. Stigmata duo, capillaria, reflexa.

PER. Calyx dilatatus, amplificatus, semen in sinu fovens & undique tegens.

SEM. unicum, ovato compressum, arillo laxiusculo vestitum, quo defracto extremitates duæ deorsum flexæ & approximatae secedunt, una acuminata & integra, altera obtusa in duo labia dehiscente.

Pertinet itaque Krascheninnikovia ad Monaciam Triandriam, post Urticam ponenda.

157. BOBARTIA. †

CAL. uniflorus, imbricatus Glumis numerosis, cylindricis: quarum Exteriores plurimæ, breves, univalves; Interiores æquales, longiores, bivalves: valvula exteriori maxime, interiore lineari, truncata, ejusdem longitudinis.

COR. Gumar bivalvis, tenuissima, calyce brevior, supera, marcescens.

STAM. Filamenta tria, capillaria, brevissima. Anthera oblonga.

PIST. *Germeu breve, subinferum. Styli duo, filiformes. Stigmata simplicia.*

PER. nullum. *Calyces immutati.*

SEM. unicum, oblongiusculum.

OBS. *Glumis calycis numerosis, floreque unico supero diversissima est ab affinitus.*

158. PANICUM. *

CAL. *Gluma uniflora, trivalvis; Valvulis subovatis: tertia minima a tergo alterius posita.*

COR. bivalvis: *Valvulis subovatis: altera minor planior.*

STAM. *Filamenta tria, capillaria, brevissima. Antheræ oblongæ.*

PIST. *Germeu subrotundum. Styli duo, capillares. Stigmata plumosa.*

PER. *Corolla adnascitur semini, nec dehiscit.*

SEM. unicum, tectum, subrotundum, inde planiusculum.

OBS. *P. sanguinale & dactylon calyce bivalvi aliisque attributis a congeneribus abundunt; hinc perill. Hallerus novum ex his genus, Digitaria dictum struxit. Vid. Hall. herb. tom. 2. p. 244. R.*

159. CORNUCOPIÆ. * Cornucopioides Scheuch. 3.

CAL. *Perianthium commune, monophyllum, infundibuliforme, maximum: ore crenato, obtuso, patentierecto; multiflorum.*

Gluma uniflora, bivalvis: valvulis oblongis, obtuse acuminatis, æqualibus.

COR. univalvis, figura, magnitudine & situ valvulæ glumæ calycis simillima.

STAM. *Filamenta tria, capillaria. Antheræ oblongæ.*

PIST. *Germeu turbinatum. Styli duo, capillares. Stigmata cirrhosa.*

PER. nullum, *Corolla semen includens.*

SEM. unicum, turbinatum, hinc convexum, inde planum.

OBS. *Alopecuroinis affine.*

160. ARISTIDA. †

CAL. *Gluma bivalvis, subulata, longitudine corollæ, uniflora.*

CER. *Gluma* univalvis, longitudinaliter connivens, basi hirsuta, terminata *Aristis* tribus, subæqualibus, patulis.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria. *Antheræ* oblongæ.

PIST. *Germen* turbinatum. *Styli* duo, capillares. *Stigmata* villosa.

PER. *Gluma* connivens, involvens, dehiscens.

SEM. unicum, filiforme, longitudine corollæ, nudum.

161. ALOPECURUS. *

CAL. *Gluma* uniflora, bivalvis: *Valvulis* ovato-lanceolatis, concavis, compressis, æqualibus.

COR. univalvis: *Valvula* concava, longitudine calycis. *Arista* longa, dorso valvulæ versus basin inserta.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria. *Antheræ* utrinque bifurcæ.

PIST. *Germen* subrotundum. *Styli* duo, cirrhosi, reflexi, calyce longiores. *Stigmata* simplicia.

PER. *Corolla* semen obvestiens.

SEM. unicum, subrotundum, tectum.

OBS. *A. indicus* *valvula* *floris* *accessoria* *gaudet*, *etiam* *A. bordeifermis* *corollam* *bivalvem* *habet*. R.

162. MUHLENBERGIA. Schreb.

CAL. *Gluma* univalvis, minima, emarginata, lateralis.

COR. bivalvis: *Valvulæ* æquales: *exterior* lanceolata, longa, acuta, aristata, ventre amplexans *interiorem*, basi pilosa; *Valvula interior* paullo brevior, angustior, linearis, mucronata.

Nectarium diphyllum: *foliulis* ovatis, oblique-truncatis, gibbis, parvis.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria, corolla breviora. *Antheræ* lineares.

PIST. *Germen* ovatum. *Styli* duo, capillares. *Stigmata* plumosa.

PER. nullum. *Corolla* semen includit.

SEM. unicum, oblongum, acuminatum.

163. PHLEUM. *

CAL. *Gluma* uniflora, bivalvis, oblonga, linearis, compressa: apice bicuspidate dehiscens: *valvulis* rectis, concavis, compressis, amplexantibus, æqualibus, truncatis, carinæ apice mucronatis.

COR. bivalvis, calyce brevior: *Valvula exterior*e amplexante *interiorem* minorem.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria, calyce longiora. *Anthera* oblonga, bifurcata.

PIST. *Germe*n subrotundum. *Styli* duo, capillares, re-
tlexi. *Stigmata* plumosa.

PER. nullum. *Calyx* & *Corolla* includentia semen.

SEM. unicum, subrotundum.

164. PHALARIS. * Homalocenchrus. Hall.

helu. n. 1411.

CAL. *Gluma* uniflora, bivalvis, compressa, obtusa: *val-
vuli* navicularibus, compressis, carinatis, superne
obtusioribus, marginibus rectis, parallele conniven-
tibus.

COR. bivalvis, calyce minor: *Valvula exterior*e oblon-
ga, acuminata, convoluta; *interiore* minore.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria, calyce breviora. *An-
thera* oblonga.

PIST. *Germe*n subrotundum. *Styli* duo, capillares. *Stig-
mata* villosa.

PER. corolla circumnascitur semini crusta instar, nec
dehiscit.

SEM. unicum, tectum, glabrum, e rotundo utrinque
acuminatum.

OBS. Homalocenchrus *petalis caret.*

165. PASPALUM. *

CAL. *Gluma* uniflora, bivalvis, membranacea: *valvu-
lis* aequalibus orbiculatis, plano-concavis: *interiore*
exterius posita.

COR. *Gluma* bivalvis, magnitudine calycis: *valvulis*
subrotundis, cartilagineis, extus convexis, basi in-
flexis.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria, longitudine *glumae*.
Anthera ovata.

PIST. *Germe*n subrotundum. *Styli* duo, capillares, lon-
gitudine floris. *Stigmata* penicilliformia, pilosa, co-
lorata.

PER. *Glumae* persistentes, clausae, semini adnascentes.

SEM. unicum, subrotundum, compressum, hinc conve-
xum.

OBS. P. virgatum *valvulam calycis exterior*em brevissimam
habet.

166. MILIUM. * *Tournef. 298.*

CAL. *Gluma* uniflora, bivalvis: *Valvulis* ovatis, acuminatis, subæqualibus.

COR. bivalvis, calyce minor: *Valvula* ovata: altera earum minore.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria, brevissima. *Anthera* oblonga.

PIST. *Germen* subrotundum. *Styli* duo, capillares. *Stigmata* penicilliformia.

PER. *Corolla* semen obvestitum, glaberrimum.

SEM. unicum, tectum, subrotundum.

167. AGROSTIS. *Cinna. syst. veg. ed. pr.*

CAL. *Gluma* uniflora, bivalvis, acuminata, corolla paulo minor.

COR. bivalvis, acuminata; altera majore.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria, corolla longiora. *Anthera* furcata.

PIST. *Germen* subrotundum. *Styli* duo, reflexi, villosi. *Stigmata* longitudinaliter hispida.

PER. *Corolla* adnata semini, nec dehiscens.

SEM. unicum, subrotundum, utrinque acuminatum.

OBS. A. capillaris unicum habet petalum; hinc *Alopecuri* species. Scop. R.

168. DACTYLIS. * *Roy. lugdb. 56.*

CAL. *Glumæ* compressæ, secundæ, acutæ: valvula altera flosculo longiore carinata: altera eodem breviora.

COR. *Gluma* compressa, oblonga, acuta: valvula altera intra calycis majorem longiore, carinata.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria, longitudine corollæ. *Anthera* bifurca.

PIST. *Germen* turbinatum. *Styli* duo, capillares, patentes, villosi. *Stigmata* simplicia.

PER. nullum. *Corolla* semen includens, demittens.

SEM. solitarium, hinc depressum, inde convexum, nudum.

OBS. *Species* aliæ calyce unifloro, aliæ 3-4- & multifloro sunt.

169. STIPA. *

CAL. *Gluma* uniflora, bivalvis, laxa, acuminata.

COR. bivalvis: *Valvula* exterior apice terminata. *Arista* longissima, tortili, basi articulata, recta; *V. interior* longitudine exterioris, mutica, linearis.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria. *Antheræ* lineares.
 PIST. *Germen* oblongum. *Styli* duo, hirsuti, basi uniti.
Stigmata pubescentia.
 PER. *Gluma* adnata.
 SEM. unicum, oblongum, tectum.
 OBS. *Dignoscitur Glumæ Corollinæ Arista, ad apicem glumæ articulata.*

170. LAGURUS. *

CAL. *Gluma* uniflora, bivalvis: *Valvulis* longis, linearibus, patulis, tenuissimis, desinentibus singulis in *aristam* villosam.
 COR. *Gluma* bivalvis, calyce crassior: *Valvula exterior* longior, terminata *Aristis* duabus, parvis, rectis: *Arista tertia* e medio dorso *valvulæ ejusdem*, reflexo-torta *Valvula interiore* parva, acuminata.
 STAM. *Filamenti* tria, capillaria. *Antheræ* oblongæ.
 PIST. *Germen* turbinatum. *Styli* duo, setacei, villosi.
Stigmata simplicia.
 PER. nullum. *Corolla* semini adnascitur.
 SEM. solitarium, oblongum, tectum, aristatum.

171. ANDROPOGON. † Roy. lugdb. 52.

* *Hermaphroditi flores sessiles.*

CAL. *Gluma* uniflora, bivalvis, oblonga, obtusa, mucica: *valvula interiore* angustiore, tenuiore, basi cincta lanugine bipartita.
 COR. *Glumæ* bivalvis, calyce tenuior, minor: *Arista* e basi *valvulæ majoris*, longa, tortilis, recurva.
 STAM. *Filamenta* tria, capillaria, longitudine floris. *Antheræ* oblongæ, bifurcæ, incumbentes.
 PIST. *Germen* oblongum. *Styli* duo, capillares, coaliti.
Stigmata villosa.
 PER. nullum. *Gluma corollæ calycisque* semen obvolvendes, includentes.
 SEM. unicum, solitarium, oblongum, tectum, *arista corollæ armatum.*
 * *Masculi flores pedunculati.*

CAL. ut in *Hermaphrodito*.
 COR. ut in *Hermaphrodito*, sed absque *Arista*.
 STAM. ut in *Hermaphrodito*.

172. SACCHARUM. †

CAL. nullus, sed *Lanugo flore* longior, *florem unicum* includens.

COR. bivalvis: *Valvula* oblongo-lanceolata, acuminata, erecta, concava, æquales, mutica.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria, longitudine corollæ. *Anthera* oblongiusculæ.

PIST. *Germen* subulatum. *Styli* duo, cirrhosi. *Stigmata* simplicia.

PER. nullum. *Corolla* semen investit.

SEM. unicum, oblongum, angustum, acuminatum.

OBS. *Differt ab Arundine defectu calycis.*

S. spicati utraque *Corolla* *valvula* aristata. R.

Aliud specimen, pro Saccharo datum ita erat comparatum:

CAL. *Gluma* bivalvis, uniflora: *valvulis* lanceolatis, involutis, basi barbatis.

COR. *Gluma* bivalvis, brevior, obtusiuscula. *Arista* dorsalis torta.

STAM. Ut antea. *Germen* oblongum. *Styli* duo, penati. *Stigmata* plumosa. *Mont* 22.

173. PEROTIS *Aiton. Kew.*

CAL. nullus.

COR. *Gluma* bivalvis: *Valvulae* oblongæ, acutæ, subæquales, apice aristatæ.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria. *Anthera* oblongæ.

PIST. *Germen* superum, oblongum. *Styli* duo, capillares, corolla breviores. *Stigmata* plumosa, divaricata.

PER. nullum. *Corolla* semen includens.

SEM. unicum, lineari-oblongum.

174. HOLCUS. * *Sorgum Mich.*

* *Hermaphroditus Flor.*

CAL. *Gluma* subbiflora, bivalvis, rigida, mutica: *Valvula* exterior ovata, concava, magna, amplexante interiorem oblongam, lateribus convolutam.

COR. *Gluma* bivalvis, tenella, villosa, calyce minor: *Valvula* exterior sæpe cum *Arista* rigida, calyceque longiore: interiore vero mutica, minima.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria. *Anthera* oblongæ.

PIST. *Germen* turbinatum. *Styli* duo, capillares. *Stigmata* penicilliformia.

PER. nullum. *Corolla* involvit, tegit, adnascitur semini.

SEM. solitarium, ovatum, testum.

* *Masculus Flos femineo minor.*

CAL. *Gluma* bivalvis: *Valvulis* ovato-lanceolatis, convolutis, muticis, acutis.

COR. nulla; nisi calycem dicas.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria. *Antheræ* oblongæ.

175. AIRA. *

CAL. *Gluma* biflora, bivalvis: *Valvulis* ovato-lanceolatis, acutis, æqualibus.

COR. bivalvis: *Valvula* calyci simillimæ. Nullum floris rudimentum inter flosculos.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria, longitudine floris. *Antheræ* oblongæ, utrinque furcatæ.

PIST. *Germen* ovatum. *Styli* duo, fetacei, patentes. *Stigmata* pubescentia.

PER. nullum. *Corolla* includens femini adnascitur.

SEM. subovatum, tectum.

OBS. *Numerus flosculorum variat.*

A. aquaticæ sæpe calyces quinqueflori.

176. MELICA. *

CAL. *Gluma* biflora, bivalvis: *Valvulis* ovatis, concavis, subæqualibus.

COR. bivalvis: *Valvula* ovata, muticæ: altera concava; altera plana. *Corpusculum* inter flosculos.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria, longitudine floris. *Antheræ* oblongæ, utrinque bifurcatæ.

PIST. *Germen* ovato-turbinatum. *Styli* duo, fetacei, patentes. *Stigmata* oblonga, villosa.

PER. nullum. *Corolla* includit semen, demittit.

SEM. unicum, ovatum.

OBS. *Corpusculum pedunculatum inter flosculos (floris rudimentum) characterem essentialem præbet: hoc constat duobus rudimentis s. flosculis truncatis, alternis: glumis convolutis, pellucidis.*

OBS. *Variat etiam flosculorum numerus, & M. unifloræ Retzii flos unicus fertilis.*

177. ISCHÆMUM. †

CAL. *Gluma* biflora, bivalvis, rigida, acuminata, transversim posita: *Valvulis* acuminatis, lævibus, erectis; *Flosculo* altero masculo, altero hermaphrodito.

COR. *Glumæ* duæ, bivalves: *valvulis* minoribus, acutioribus, membranaceis,

STAM. *Filamenta* tria, capillaria. *Antheræ* oblongæ.

PIST. (Flosculo hermaphrodito) *Germen* oblongum. *Styli* duo, capillares. *Stigmata* crassa, plumosa.

PER. nullum. *Calyx* & *Corolla* immutata.

SEM. (hermaphrodito flosculo) oblongum, lineare, hinc convexum.

178. UNIOLA. †

CAL. *Gluma* multiflora, multivalvis: *Valvulis* distiche imbricatis, subulatis, compressis, navicularibus, carinularis, altera alteram claudente: ultimo pari multifloro, continente *Spicam* ovatam, compresso planam, margine acutam.

COR. *Gluma* bivalvis: *Valvula* lanceolato-compressæ, calycinis similes, *interiore* valvula parum supereminente.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria. *Antheræ* oblongæ, lineares.

PIST. *Germen* conicum. *Styli* duo, erecti, simplices. *Stigmata* pubescentia.

PER. nullum; *Corolla* includit semen.

SEM. unicum, ovato-oblongum.

179. BRIZA. *

CAL. *Gluma* multiflora, bivalvis, patens, flores in *spicam* cordatam disticham colligens: *valvulis* cordatis, concavis, æqualibus, obtusis.

COR. bivalvis: *Valvula inferior* magnitudine & figura calycis: *superiore* minima, plana, subrotunda, ventrem alterius claudente.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria. *Antheræ* oblongæ.

PIST. *Germen* subrotundum. *Styli* duo, capillares, recurvi. *Stigmata* plumosa.

PER. *Corolla* immutata continet semen, dehiscit, deimit.

SEM. unicum, subrotundum, compressum, minimum.

180. POA. *

CAL. *Gluma* multiflora, bivalvis, mutica, flores in *spicam* disticham ovato-oblongam colligens: *Valvulis* ovatis, acuminatis.

COR. bivalvis: *Valvula* ovata, acuminata, concava, compressa, calyce paulo longiores, margine scarioso.

STAM.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria: *Anthera* bifurcata.

PIST. *Germen* subrotundum. *Styli* duo, reflexi, villosi. *Stigmata* similia.

PER. *Corolla* adnascitur semini, nec dehiscit.

SEM. unicum, oblongum, acuminatum, utrinque compressum, tectum.

OBS. Poæ *Eragrostidis* flores absque margine scarioso. *Species* aliæ calyce bifloro, aliæ tri-quadrifloro, e. s. p. sunt.

181. FESTUCA.

CAL. *Gluma* multiflora, bivalvis, erecta, flosculos in spicam tenuem continens: *valvulis* subulatis, acuminatis: inferiore minore.

COR. bivalvis: *valvula* inferior major, figura calycis, magnitudine calycem superans, teretiuscula, acuminata, in mucronem terminata.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria, corolla breviora. *Anthera* oblongæ.

PIST. *Germen* turbinatum. *Styli* duo breves, reflexi. *Stigmata*, simplicia.

PER. *Corolla* arctissime clausa adnata, nec dehiscens.

SEM. unicum, tenui-oblongum, utrinque acutissimum, longitudinaliter sulco notatum.

182. BROMUS. * Mont. 32. Ægilops Dill. gen. 3.

CAL. *Gluma* multiflora, bivalvis, patens, flosculos in spicam colligans: *valvulis* ovato-oblongis, acuminatis, muticis: inferiore minore.

COR. bivalvis: *Valvula* inferior major, magnitudine & figura calycis, concava, obtusa, bifida; *aristam*, infra apicem, rectam emittens; *V. superior* lanceolata, parva, mutica.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria, corolla breviora. *Anthera* oblongæ.

PIST. *Germen* turbinatum. *Styli* duo, breves, reflexi, villosi. *Stigmata* simplicia.

PER. *Corolla* arctissime clausa, adnata, nec dehiscens.

SEM. unicum, oblongum, tectum, hinc convexum, inde sulcatum.

OBS. B. inermis *aristis* sæpe destituitur.

183. AVENA. * *Tournef.* 267.

CAL. *Gluma* saepius multiflora, bivalvis, flores laxè colligens: *valvulis* lanceolatis, acutis, ventricosis, laxis, magnis, muticis.

COR. bivalvis: *Valvula inferior* calyce durior, calycis magnitudine, teretiufcula, ventricosa, utrinque acuminata, e dorso *Aristam* spiraliter intortam, geniculo veluti reflexam, emittens.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria. *anthera* oblonga, bifurcata.

PIST. *Germen* obtusum. *Styli* duo, reflexi, pilosi. *Stigmata* simplicia.

PER. *Corolla* arctissime clausa adnascitur, nec dehiscit.

SEM. unicum, tenui-oblongum, utrinque acuminatum, sulco longitudinali notatum.

OBS. *Arista e dorso corollae articulata, intorta, constituit essentialem characterem.*

184. ARUNDO. * *Scheuch.* 3. 14. 3.

CAL. *Gluma* uni- (vel) multi-flora, bivalvis, erecta: *Valvulis* oblongis, acuminatis, muticis: altera brevior.

COR. bivalvis: *Valvula* longitudine calycis, oblonga, acuminata, e quarum basi lanugo longitudine fere floris assurgit.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria. *Anthera* utrinque bifurcata.

PIST. *Germen* oblongum. *Styli* duo, capillares, reflexi, villosi. *Stigmata* simplicia.

PER. *Corolla* adnascitur semini, nec dehiscit.

SEM. unicum, oblongum, utrinque acuminatum, basi pappo longo instructum.

185. ANTHISTIRIA. *Suppl.* p. 13.

CAL. *Gluma* quadrivalvis, triflora s. quadriflora. *Valvulae* aequales, oblongae, planae, obtusiufculae, coriaceae, erecto-patentes, apice papillofae: *Papillis* pilosis.

Flosculus hermaphroditus sessilis. Flosculi masculi pedicellati, in eodem calyce plures, hermaphrodito simillimi.

COR. *Gluma* bivalvis. *Valvula* lanceolata, acuta, mutica: *exterior* major.

STAM. *Filamenta* tria, brevia, filiformia. *Antheræ* oblongæ, erectæ.

PIST. *Germen* oblongum, ex cujus basi *Arista* orta. *Styli* duo. *Stigmata* clavata, pilosa.

PER. nullum, nisi calyx clausus.

SEM. oblongum, glabrum, sulco exaratum.

186. SECALE. *

CAL. *Receptaculum* commune elongatum in spicam.

Gluma biflora, diphylla: *foliolis* oppositis, distantibus; erectis, linearibus, acuminatis; corolla minoribus: *flosculi* sessiles.

COR. bivalvis: *Valvula* exterior rigidior, ventricosa, acuminata, compressa, carina ciliata, desinens in *Aristam* longam: *V. interior* plana, lanceolata.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria, extra florem pendula. *Antheræ* oblongæ, furcatæ.

PIST. *Germen* turbinatum. *Styli* duo, reflexi, villosi. *Stigma* simplex.

PER. nullum. *Corolla* fovens semen, dehiscit, demittit.

SEM. unicum, oblongum, subcylindraceum, nudum, hinc acuminatum.

OBS. *Flos* tertius *pedunculatus* sæpe inter duos majores sessiles.

187. TRITICVM. * *Tournef.* 292. 293.

CAL. *Receptaculum* commune elongatum in spicam.

Gluma bivalvis, subtriflora: *valvulis* ovatis, obtusiusculis, concavis.

COR. bivalvis, subæqualis, magnitudine calycis: *Valvula* exterior ventricosa, obtusa cum acumine: *V. interior* plana.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria. *Antheræ* oblongæ, bifurcatæ.

PIST. *Germen* turbinatum. *Styli* duo capillares, reflexi. *Stigmata* plumosa.

PER. nullum. *Corolla* fovet semen, dehiscit, demittit.

SEM. unicum, ovato-oblongum, utrinque obtusum, hinc convexum, inde sulcatum.

OBS. *Corollæ* *valvula* exterior in aliis *aristata*, in aliis *mutica*. *Calyces* *quadriflori*, *quinqueflori* & *ultra*: *flosculus intermedius* sæpe *masculus* est.

188. LAPPAGO. *Schreb.* *Tragus* *Hall.*

CAL. *Gluma* subtrivalvis: *Valvulis* alternis, ovato-ob-

longis, acuminatis, ventricosus, cartilagineis, striatis, muricatis, unifloris.

COR. bivalvis: *Valvula majore* oblonga, ventricosa, acuta, membranacea, glumæ calycinae opposita, ejusque longitudine; *minore* lanceolata, marginibus majoris excepta, in sinu glumæ calycinae.

Nectarium diphyllum: *foliolis* lanceolatis, acutis.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria, longitudine flosculi. *Anthera* subrotunda.

PIST. *Germen* ovatum. *Styli* duo, capillares. *Stigmata* villosa.

PER. nullum. *Corolla* semen includit.

SEM. unicum, ovatum, compressum.

OBS. *Spicula* ovata, compressa, tri- s. quadriflora: *flosculis* omnibus *valvula calycina* exceptis, hermaphroditis; accedit aliquando *flosculus* quintus, similiter calyculatus, sed imperfectus. Singulare est, quod quilibet *flosculus* suam habet glumam calycinam; & quod *Corollæ* *valvula* exterior introsum s. rachin. *spiculæ*, interior autem extrorsum spectat: unde *corolla* inversa s. resupinata! Schreb.

188. HORDEUM. * *Tournef.* 295.

CAL. *Receptaculum* commune elongatum in spicam.

Gluma hexaphylla, triflora: *floribus* sessilibus: *foliolis* distantibus, per paria digestis, linearibus, acuminatis.

COR. bivalvis: *Valvula inferior* ventricosa, angulata, ovato-acuminata, calyce longior, desinens in *Aristam* longam: *V. interior* lanceolata, plana, minor.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria, *corolla* breviora. *Anthera* oblonga.

PIST. *Germen* ovato-turbinatum. *Styli* duo, villosi, reflexi. *Stigmata* similia.

PER. *Corolla* circumnascitur femini, nec dehiscit.

SEM. oblongum, ventricosum, angulatum, utrinque acuminatum, inde sulco longitudinali notatum.

OBS. In quibusdam omnes tres flores, involucri contenti, hermaphroditi sunt fertiles; in aliis, flores laterales maiores sunt, intermedius autem solus fertilis hermaphroditus.

190. ELYMUS. *

CAL. *Receptaculum* commune elongatum in spicam.

Gluma tetraphylla, distachya: *foliolis* duobus singulæ *spiculæ* subiectis, subulatis.

GER. bivalvis: *Valvula exterior* major, acuminata, aristata: *V. interior* plana.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria, brevissima. *Anthera* oblonga, basi bifida.

PIST. *Germen* turbinatum. *Styli* duo, divaricati, pilosi, inflexi. *Stigmata* simplicia.

PER. *Corolla* semen involvens.

SEM. unicum, lineare, hinc convexum, testum.

191. **SPINIFEX.** *Linn. jun. diss. nov. gen. gram. p. 29.*

Capitulum involucreatum: involucreum diphyllum, æquale, foliolis lanceolatis, canaliculatis, apice teretibus, subulatis, mucronatis, inæqualibus: ex fasciculis pluribus compositum. *Fasciculi* tres vel quatuor, sessiles, alterni, approximati involucreati, continentes *Aristas* solitarias, palmares, rectas, teretes, subulatas: supra harum insertionem impressio lateralis, in qua reconduntur flosculi, gluma calycina testis. *Flosculus* singulæ aristæ unicæ, hermaphroditus, (*Aristæ hæc variae in eodem capitulo sine impressione atque flosculo*) dente insertus, parallelus.

CAL. *Gluma* uniflora, bivalvis: *valvula* inæquales, lanceolata, subulata: exterior interiore ipsaque corolla, quam in fovea aristæ includit, longior.

COR. *Gluma* bivalvis vel trivalvis: *valvula* lanceolata, convoluta, quarum interior genitalia obvolvitur.

STAM. *Filamenta* tria, filiformia. *Anthera* ut in mare, sed minores, forte steriles.

PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* unicæ, filiformis, glumis longior. *Stigmata* duo, villosa, exserta.

SEM. unicum, oblongum, glabrum,

* *Mas* in diversa planta.

Capitulum ut in priore. *Fasciculi* ut in priore, sed glumis brevioribus terminatis mucrone longiore, rigidior, magis pungente. *Aristæ* ut in priore opplent totum fasciculum, sed breviores, subrigonæ, dentatæ: dentibus floriferis, hinc floriferæ a basi fere usque ad apicem. *Flores* in aristis alterni, quinque ad septem, sessiles, bifarii, paralleli, ovato-oblongi, mutici, masculi.

CAL. *Gluma* biflora, bivalvis: *valvula* inæquales: ex-

teriore brevior, oblonga, obtusa, striata, canaliculata, corolla breviores, flosculo uno hermaphrodito, sed sterili.

COR. *Gluma* bivalvis: *valvula* lanceolata, canaliculata, convoluta: interiore angustiore.

STAM. *Filamenta* tria, a *valvula* interiore corollae involuta, filiformia. *Antherae* lineares, longae, utrinque bifurcae, exsertae.

PIST. nullum, vel si adest emarcidum absque stigmate.

192. LOLIUM. *

CAL. *Receptaculum* commune elongatum in spicam, flores distiche spicatos angulo culmi apprimens.

Gluma univalvis, rachi opposita, subulata, perflens.

COR. bivalvis: *Valvula inferior* angusto-lanceolata, convoluta, acuminata, longitudine calycis; *V. superior* brevior, linearis, obtusior, sursum concava.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria, corolla breviora. *Antherae* oblongae.

PIST. *Germen* turbinatum. *Styli* duo, capillares, reflexi, *Stigmata* plumosa.

PER. nullum. *Corolla* fouet semen, dehiscit, demittit.

SEM. unicum, oblongum, hinc convexum, inde sulcatoplanum, compressum.

Obs. *Spicae sessiles in eodem plano cum culmo ponuntur, unde caulis vicem valvulae alterius calycis (deficientis & oppositae) gerit.*

193. CYNOSURUS *

CAL. *Involucrum* parziale laterale, saepe triphyllum, magnum.

Gluma multiflora, bivalvis: *valvulis* linearibus, acuminatis, aequalibus.

COR. bivalvis: *exterior* concava longior; *interior* plana, mutica.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria. *Antherae* oblongae.

PIST. *Germen* turbinatum. *Styli* duo, villosi, reflexi. *Stigmata* simplicia.

PER. nullum. *Corolla* arcte obvolvens semen, nec dehiscens.

SEM. unicum, oblongum, utrinque acuminatum.

OBS. *Involucra in plurimis sunt pinnatifida s. pectiniformia. In variis speciebus varius est flosculorum numerus. R.*

C. cæruleus & sphaerocephalus a dato caractere nonnihil abluunt.

Nectarium diphyllum superum, oblongiusculum Graminibus commune superfluum duxi ubique commemorare, cum minimus non distinguat genera.

194. ÆGILOPS. *

* *Hermaphroditi flores bini laterales.*

CAL. *Gluma bivalvis, triflora, maxima: valvulis ovatis, truncatis, striatis, aristis variis.*

COR. *Gluma bivalvis: Valvula exteriore ovata, duplici triplicive arista terminata. Valvula interiore lanceolata, erecta, mucica, margine longitudinaliter inflexa.*

STAM. *Filamenta tria, capillaria. Antheræ oblongæ.*

PIST. *Germen turbinatum. Styli duo, reflexi. Stigmata pilosa.*

PER. *nullum. Valvula interior corollæ adnascitur femini, nec dehiscit.*

SEM. *oblongum.*

* *Masculus Flosculus intermedius.*

CAL. *Hermaphroditorum datus, communis.*

COR. *ut in Hermaphrodito.*

STAM. *ut in Hermaphrodito.*

PIST. *simile Hermaphroditi, sæpe abortiens.*

195. ROTTBOELLA. Suppl. p. 13.

Rachis cylindrica, filiformis, strictissima, articulata.

Articuli deorsum versus articulum inferiorem oblongo-excavati.

Flores rachidis sinubus excavatis inclusi, solitarii s. bini, alter masculus, alter hermaphroditus.

CAL. *Gluma univalvis. Valvula simplex s. bipartita, cartilaginea, ad basin truncata, sinus operculi instar claudens, rachidi articulatione mobili juncta, ovato-oblonga, acuta, plana.*

COR. *Gluma hermaphrodita bivalvis. Valvula lanceolata, acuta, concava, inæquales, membranaceæ, calyce breviores.*

Gluma mascula si adest, priori similis.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria. *Anthera* lineares, utrinque bifurcatae.

PIST. *Germen* oblongo-lineare, truncatum, capitello instructum, hinc convexum, inde concavum. *Styli* duo, filiformes. *Stigma* plumosa s. penicilliformia.

PER. nullum, nisi sinus articuli calycis gluma clausi, semen maturum non caducum continentes, usque rachis per articulos discedit.

SEM. unicum, figura germinis.

196. MANISURIS. *Linn. jun. diff. nov. gram. gen. p. 21.*

* *Flores Hermaphroditi laterales.*

CAL. *Gluma* uniflora, bivalvis. *Valvula* exterior subcartilaginea vel coriacea, operculata, disco convexo, radio plano, adpresso, rotundata, integra vel apice & lateribus emarginata.

Valvula interior in cavitate rachidis, ubi reconditur flos, adglutinata, apice, tandem libera, lanceolata, membranacea.

COR. *Gluma* bivalvis, calyce brevior, membranacea, in fovea rachidis sub valvula exteriori calycis recondita.

STAM. *Filamenta* tria, filiformia, exserta, calyce longiora. *Anthera* incumbentes lineares.

PIST. *Germen* ovatum. *Styli* duo, breves, filiformes. *Stigmata* barbata, ad basin glumarum ab utroque latere exserta.

PER. Calyx immutatus.

SEM. unicum, ovatum.

Rachis per articulos, maturo semine, discedit.

* *Flores Neutri marginales.*

CAL. *Gluma* bivalvis, uniflora, teretiuscula: valvulis parallelis, striatis, margine scariosis.

COR. *Gluma* bivalvis, membranacea, inclusa.

STAM. nulla vel tria brevissima.

179. TRIPSACUM. *

* *Masculi.*

CAL. *Gluma* utrinque biflora, 2-valvis: valvulis navicularibus parallelis.

COR. *Gluma* 2-valvis, membranacea, calyce minor.

STAM. *Filamenta* 3, capillaria, *Antheræ* oblongæ.

* *Feminei* in eadem planta.

CAL. *Gluma* 2 f. 4 partita ad basin sinubus hians.

COR. *Gluma* 2-valvis, membranacea.

PIST. *Germen* oblongum. *Styli* 2, capillares. *Stigmata* oblonga, villosa.

PER. *Glumæ* iminutata, quasi sinubus perforata.

SEM. unicum, oblongiusculum.

OBS. T. Hermaphroditum *valvula calycinia* 4-partita 'est.

III. TRIGYNIA.

198. HOLOSTEUM. *

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: *foliolis* ovatis, persistentibus.

COR. *Petala* quinque, bipartita, obtusa, æqualia.

STAM. *Filamenta* tria, filiformia, corolla breviora. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* subrotundum. *Styli* tres, filiformes. *Stigmata* obtusiuscula.

PER. *Capsula* unilocularis, subcylindracea, apice dehiscens.

SEM. plurima, subrotunda.

OBS. H. succulenti *petala* subtrifida sunt, *calyce* minora.

H. umbellatum *flaminibus* 3 & 4, *pistillisque* quatuor variat. Hall. *H. ister*.

199. POLYCARPON. * *Læfing.*

CAL. *Perianthium* pentaphyllum; *foliolis* ovatis, concavis, carinatis, mucronatis, persistentibus.

COR. *Petala* quinque, brevissima, ovata, emarginata, alterna, persistentia.

STAM. *Filamenta* tria, filiformia, calyce dimidio breviora. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* ovatum. *Styli* tres, brevissimi. *Stigmata* obtusa.

PER. *Capsula* ovata, unilocularis, trivalvis.

SEM. plurima, ovata.

200. LECHEA. † *Kalm.*

CAL. *Perianthium* triphyllum: *foliolis* ovatis, concavis, patentissimis, persistentibus.

COR. *Petala* tria, linearia, calyce angustiora, sed ferme longiora, concava.

STAM. *Filamenta* tria, (interdum 4, 5.) capillaria, corolla longiora, pistillo incumbentia, æqualia. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* nullus. *Stigmata* tria, plumosa, divaricata.

PER. *Capsula* ovata, triquetra, trilocularis, trivalvis; insuper valvulis tribus internis conniventibus versus exteriores, constituentibus dissepimenta gaudet.

SEM. solitaria, ovata, introrsum angulata.

OBS. *L. major* *filamina* 4: horum 2 superiora approximata, *Clayt.*

201. ERIOCAULON. † *Gron. Virg.* 14.

CAL. *Perianthium* commune globoso-depressum, imbricatum: squamis lanceolatis, æqualibus, persistentibus.

COR. *Universalis* uniformis, convexa.

Propria tripetala: *Petalis* æqualibus, lanceolatis, obtusis, apice villosis, basi attenuatis connatisque in pedicellum styliformem, pilosum.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria, germini insistentia. *Antheræ* oblongæ, versatiles.

PIST. *Germen* tenue, superum, sub stamina. *Styli* tres, capillares, breves. *Stigmata* simplicia.

PER. nullum. *Calyx* immutatus.

SEM. solitaria, corolla coronata.

REC. *Paleæ* magnitudine & figura squamarum calycis, unifloræ, plurimæ.

OBS. *E.* decangularis *flosculi disci masculi*, *ambitus feminei* sunt. *Vidende* ♂ *reliquæ species*, antequam *character* emendetur.

202. CATURUS.

* *Mas.*

CAL. nullus.

COR. monopetala, tubulosa, semitrifida: *laciniis* ovatis, concavis, acutis, persistentibus.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria, corolla longiora. *Antheræ* subrotundæ.

* *Femina.*

CAL. *Perianthium* tripartitum: *foliolis* ovatis, planis, persistentibus.

COR. nulla.

PIST. *Germen villosum. Styli tres, longi, pinnato-multifidi, colorati. Stigmata acuta.*

PER. *Capsula subrotunda, tricocca, trilocularis.*

SEM. *solitaria, rotunda.*

OBS. *Flores masculos minus distincte vidi.*

In C. ramifloro femina calyx nullus est & stylus unus Jacq.

203. MONTIA. * *Mich. 13. Cameraria. Dill. gen. 6. Alsinoides Vail. B. P.*

CAL. *Perianthium diphyllum: foliolis ovatis, concavis, obtusis, erectis, persistentibus.*

COR. *monopetala, quinquepartita: Laciniis tribus alternis minoribus, staminiferis.*

STAM. *Filamenta tria, capillaria, longitudine corollæ, cui inserta. Antheræ parvæ.*

PIST. *Germen turbinatum. Styli tres, villosi, patentes. Stigmata simplicia.*

PER. *Capsula turbinata, obtusa, tecta; unilocularis, trivalvis.*

SEM. *tria, subrotunda.*

OBS. *Calyx sæpe variat foliolis ternis, tumque stamina 5. sæpe producit.*

204. PHYLANTHUS. *

* *Masculi in eadem planta cum femineis.*

CAL. *Perianthium monophyllum, sexpartitum, campanulatum, coloratum: laciniis ovatis, patulis, obtusis, persistentibus.*

COR. *Petala nulla: nisi Calycem dicas.*

STAM. *Filamenta tria, calyce breviora, basi approximata, apicibus distantia. Antheræ didymæ.*

* *Feminei ut masculi positi.*

CAL. *Perianthium ut in masculis.*

COR. *Petala nulla.*

Nectarium margo duodecim angulorum, germen cingens.

PIST. *Germen subrotundum, obtuse trigonum. Styli tres, patuli, bifidi. Stigmata obtusa.*

PER. *Capsula subrotunda, trifurca, trilocularis: loculis bivalvibus.*

SEM. *solitaria, subrotunda.*

OBS. *Species datur fructu baccato.*

205. MOLLUGO. *

CAL. *Perianthium* pentaphyllum : *foliis* oblongis , erecto-patulis , introsum coloratis , persistentibus.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* tria , setacea , corolla breviora , pistillo approximata. *Antheræ* simplices.

PIST. *Germen* ovatum , trifidum . *Styli* tres , brevissimi. *Stigmata* obtusa.

PER. *Capsula* ovata , trilocularis , trivalvis.

SEM. numerosa , reniformia.

206. MINUARTIA. * *Læfing.*

CAL. *Perianthium* pentaphyllum , erectum , longum : *foliis* subulatis , rigidiusculis , persistentibus.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* tria , capillaria , brevia. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* trigonum. *Styli* tres , breves , filiformes. *Stigmata* crassiuscula.

PER. *Capsula* oblonga , triangularis , calyce longe brevior , unilocularis , trivalvis.

SEM. nonnulla , subrotunda , compressa.

OBS. *M. montana flumina sapius quinque (Alfines) habet.*
Linn.

207. QUERIA. †

CAL. *Perianthium* pentaphyllum , erectum : *foliis* oblongis , acutis , persistentibus ; exterioribus recurvatis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* tria , capillaria , brevia. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* ovatum. *Styli* tres , longitudine staminum. *Stigmata* simplicia.

PER. *Capsula* subrotunda , unilocularis , trivalvis.

SEM. unicum.

OBS. *Differt manifeste seminum numero a Minuartia.*

208. AMARANTHUS. * *Amaranthi species*
Tournef. 118. b. i. k. l.

* *Masculi Flores* in eadem planta cum femineis.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum vel triphyllum , erectum , coloratum , persistens : *foliis* lanceolatis , acutis.

COR. nulla (Nisi Calycem sumas),

STAM. *Filamenta* quinque vel tria, capillaria, erecto-patula, longitudine calycis. *Antheræ* oblongæ, versatiles.

* *Feminei Flores* in eodem cum masculis racemo.

CAL. *Perianthium* omnino ut in mare.

COR. nulla.

PIST. *Germen* ovatum. *Styli* tres, breves, subulati. *Stigmata* simplicia, persistentia.

PER. *Capſula* ovata, subcompressa, uti calyx cui infidet, colorata, ejusque magnitudine, trirostris, unilocularis, circumscissa.

SEM. unicum, globosum, compressum, magnum.

209. KOENIGIA.

CAL. *Perianthium* triphyllum: *ſeſiolis* ovatis, concavis, persistentibus.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria, calyce breviora. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* ovatum. *Styli* nulli. *Stigmata* tria, (ſæpe duo) approximata, villosa, colorata.

PER. nullum.

SEM. unicum, ovatum, nudum, longitudine calycis.

210. TRIPLARIS. *Loefling.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, maximum, ovatum, trifidum, vel tripartitum: laciniis lanceolatis, membranaceis, patentibus, longissimis; persistens.

COR. *Petala* tria, longitudine tubi calycis. *Jacq.*

STAM. *Filamenta* tria, subulata, longitudine tubi calycis. *Antheræ* lineares, membranaceæ, ovatæ.

PIST. *Germen* ovatum, triangulare: angulis compressis. *Styli* tres, subulati, longitudine staminum. *Stigmata* triquetra, villosa.

PER. nullum.

SEM. *Nux* triquetra intra calycis basin ovatam.

OBS. Nullam adesse corollam. *Syst. Nat. p. 110. R.*

211. EXCOECARIA. *Rumph.*

* *Mas.*

CAL. *Amentum* cylindricum, flosculis tectum.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* tria, filiformia. *Anthera* subrotundæ.
* *Femina*.

CAL. *Amentum* ut in mare.

COR. nulla.

PIST. *Germen* subrotundum, subtriquetrum. *Styli* tres.
Stigmata simplicia.

PER. *Bacca* (*Capsula*) tricocca, glabra, loculis sulco
exaratis.

SEM. solitaria, glabra.

212. PROSERPINACA † *Trixis*. *Mich.* 23.

CAL. *Perianthium* tripartitum, superum: *foliolis* erectis,
acuminatis, persistentibus.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* tria, subulata, patentia, longitudine
calycis. *Anthera* didymæ, oblongæ, acutæ.

PIST. *Germen* inferum, triquetrum, maximum. *Stylus*
nullus. *Stigmata* tria, pubescentia, crassiuscula, lon-
gitudine staminum.

PER. nullum.

SEM. unicum, osseum, ovatum, triquetrum, trilocula-
re, calyce clauso terminatum.

213. MEBOREA *Aubl. guian.* 323.

CAL. *Perianthium* monophyllum, persistens, sexparti-
tum; *laciniis* lanceolatis, ad basim fovea marginata
instructis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* tria; singula *stylis* adnata, infra stig-
mata. *Anthera* biloculares, loculis parallelis, hori-
zontalibus.

PIST. *Germen* subrotundum, trigonum. *Styli* tres, ere-
cti. *Stigmata* plana, acuta, reflexa.

PER. *Capsula* trigona, angulis obtusis, sexlocularis, sex-
valvis, singulis bipartitis septo intermedio, cui utrin-
que adhæret semen unicum.

SEM. ovata.

IV. POLYGYNIA.

214. EMPETRUM. * *Tournef.* 421.

* *Mas*.

CAL. *Perianthium* tripartitum: *laciniis* ovatis, persistentibus.

COR. *Petala* tria, ovato-oblonga, basi angustiora, calyce majora, marcescentia.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria, longissima, propendentia. *Antheræ* erectæ, breves, bipartitæ.

* *Femina.*

CAL. *Perianthium* ut in mare.

PIST. *Germen* depressum. *Stylus* vix ullus. *Stigmata* novem, reflexo-patentia.

PER. *Bacca* orbiculata, depressa, unilocularis, calyce major.

SEM. novem, articulatum in orbem posita, hinc gibba, inde angulata.

Obs. *Vidi olim Hermaphroditum, quem dein non observavi.*

Classis IV.

TETRANDRIA

I. MONOGYNIA.

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 215. <i>Protea.</i> | 244. <i>Blæria.</i> |
| 216. <i>Rhopala</i> | 245. <i>Ernodea.</i> |
| 217. <i>Globularia.</i> | 246. <i>Pavetta.</i> |
| 218. <i>Stilbe.</i> | 247. <i>Siderodendrum.</i> |
| 219. <i>Cephalanthus.</i> | 248. <i>Embelia.</i> |
| 220. <i>Louichea.</i> | 249. <i>Ixora.</i> |
| 221. <i>Dipsacus.</i> | 250. <i>Petesia.</i> |
| 222. <i>Scabiosa.</i> | 251. <i>Hoffmannia.</i> |
| 223. <i>Knautia.</i> | 252. <i>Catesbæa.</i> |
| 224. <i>Allionia.</i> | 253. <i>Mitchella.</i> |
| 225. <i>Opercularia.</i> | 254. <i>Chomelia.</i> |
| 226. <i>Petitia.</i> | 255. <i>Hydrophylax.</i> |
| 227. <i>Aquartia.</i> | 256. <i>Hedyotis.</i> |
| 228. <i>Myrmecia.</i> | 257. <i>Oldenlandia.</i> |
| 229. <i>Callicarpa.</i> | 258. <i>Manettia.</i> |
| 230. <i>Ægiphila.</i> | 259. <i>Sanguisorba.</i> |
| 231. <i>Curtisia.</i> | 260. <i>Houstonia.</i> |
| 232. <i>Scoparia.</i> | 261. <i>Scabritia.</i> |
| 233. <i>Centunculus.</i> | 262. <i>Rubia.</i> |
| 234. <i>Plantago.</i> | 263. <i>Galium.</i> |
| 235. <i>Littorella.</i> | 264. <i>Asperula.</i> |
| 236. <i>Polypremum.</i> | 265. <i>Scherardia.</i> |
| 237. <i>Chætocarpus.</i> | 266. <i>Spermacoce.</i> |
| 238. <i>Lasiosstoma.</i> | 267. <i>Knoxia.</i> |
| 239. <i>Buddleja.</i> | 268. <i>Diodia.</i> |
| 240. <i>Labatia.</i> | 269. <i>Crucianella.</i> |
| 241. <i>Exacum.</i> | 270. <i>Siphonanthus.</i> |
| 242. <i>Penaea.</i> | 271. <i>Epimedium.</i> |
| 243. <i>Brabejum.</i> | 272. <i>Skimmia.</i> |

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 273. <i>Othera.</i> | 294. <i>Trophis.</i> |
| 274. <i>Orixa.</i> | 295. <i>Embothrium.</i> |
| 275. <i>Ptelea.</i> | 296. <i>Nigrina.</i> |
| 276. <i>Myginda.</i> | 297. <i>Hippophaë.</i> |
| 277. <i>Blackburnia.</i> | 298. <i>Salvadora.</i> |
| 278. <i>Fagara.</i> | 299. <i>Camphorosma.</i> |
| 279. <i>Ammannia.</i> | 300. <i>Parietaria.</i> |
| 280. <i>Bankfia.</i> | 301. <i>Nepenthes.</i> |
| 281. <i>Hartogia.</i> | 302. <i>Bæhmeria.</i> |
| 282. <i>Monetia.</i> | 303. <i>Urtica.</i> |
| 283. <i>Trapa.</i> | 304. <i>Empleurum.</i> |
| 284. <i>Serpicula.</i> | 305. <i>Alchemilla.</i> |
| 285. <i>Aucuba.</i> | 306. <i>Dorstenia.</i> |
| 286. <i>Cissus.</i> | 307. <i>Cometes.</i> |
| 287. <i>Cornus.</i> | 308. <i>Batis.</i> |
| 288. <i>Montinia.</i> | 309. <i>Sirium.</i> |
| 289. <i>Ludwigia.</i> | 310. <i>Acæna.</i> |
| 290. <i>Santalum.</i> | 311. <i>Viscum.</i> |
| 291. <i>Struthiola.</i> | 312. <i>Isnardia.</i> |
| 292. <i>Krameria.</i> | 313. <i>Elæagnus.</i> |
| 293. <i>Rivina.</i> | 314. <i>Gonocarpus.</i> |

II. DIGYNIA.

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 315. <i>Bufonia.</i> | 322. <i>Galopina.</i> |
| 316. <i>Hypecoum.</i> | 323. <i>Aphanes.</i> |
| 317. <i>Nertera.</i> | 324. <i>Anthospermum.</i> |
| 318. <i>Hamamelis.</i> | 325. <i>Cruzita.</i> |
| 319. <i>Schæfferia.</i> | 326. <i>Morus.</i> |
| 320. <i>Cuscuta.</i> | 327. <i>Myrica.</i> |
| 321. <i>Gomozia.</i> | 328. <i>Betula.</i> |

III. TRIGYNIA.

329. *Buxus.*

IV. TETRAGYNIA.

330. *Ilex.*331. *Coldenia.*332. *Sagina.*333. *Tillæa.*334. *Cicca.*335. *Potamogeton.*336. *Ruppia.*

TETRIANDRIA

I. MONOGYNIA.

215. PROTEA. *Levcadendron. Gen. pl. ed. VI. Aulax Berg. Lepidocarpodendron. Bærh. Hypophyllocarpodendron Bærh. Conocarpopendron Ejusd.*

CAL. *Perianthium commune imbricatum: squamis inæqualibus, persistentibus.*

— *proprium nullum.*

COR. tetrapetala. *Petala sæpe cohærentia, sæpius divisa, lineari-oblonga: Unguibus erectis, Limbo patenti.*

STAM. *Filamenta nulla. Antheræ quatuor, lineares vel oblongæ, sub apice limbi corollæ insertæ.*

PIST. *Germen superum, oblongum. Stylus filiformis, corolla longior. Stigma simplex, clavatum.*

PER. nullum. *Calyx patens, induratus.*

SEM. solitaria, inferne attenuata, oblonga, compressiuscula, obtusa.

REC. commune pudum, villosum, paleacenum, vel *Conus. Confer Thunbergii dissertationem de Protea pag. 9.*

216. RHOPALA. *Aubl. 32.*

CAL. nullus.

COR. *Petala quatuor, oblonga, basi angusta; obtusa, supra concava subtus convexa, decidua.*

STAM. *Filamenta quatuor, brevissima, petalis inserta. Antheræ oblongæ, obtusæ, flore clauso in cavitate petali reconditæ, corolla expansa erectæ.*

PIST. *Germen subrotundum, basi glandulis cinctum. Stylus filiformis. Stigma subrotundum.*

PER. . . . uniloculare.

SEM. unicum.

217. GLOBULARIA. *Tournef. 265. Alypum Niss. A. G. 1712. t. 18.*

CAL. *Perianthium commune imbricatum, squamis longitudine disci, æqualibus.*

Perianthium proprium monophyllum, tubulatum, quinquefidum, acutum, persistens.

COR. *Universalis* subæqualis.

Propria monopetala, basi tubulata. *Limbus* quinquepartitus: *Labio* superiore angustissimo, bipartito, brevior; *L. inferiore* laciniis tribus, majoribus, æqualibus.

STAM. *Filamenta* quatuor, simplicia, longitudine corollulæ. *Antheræ* distinctæ, incumbentes.

PIST. *Germen* ovatum, superum. *Stylus* simplex, longitudine staminum. *Stigma* obtusum,

PER. nullum. *Calyx proprius* connivens, includens semen.

SEM. solitaria, ovata.

REC. commune oblongum, paleis distinctum.

218. STILBE. † *D. Bergii.*

* *Hermaphrodita.*

CAL. exterior. *Perianthium* triphyllum (sepositis 4. exterioribus); *foliis* lanceolatis, patulo-mucronatis.

Interior. *Perianthium* monophyllum, quinquedentatum, cartilagineum, indurandum

COR. monopetala, infundibuliformis: *Tubus* longitudine calycis: *Limbus* quinquepartitus: laciniis linearibus.

STAM. *Filamenta* quatuor, subulata, fauci infidentia, longiora. *Antheræ* cordatæ, obtusæ.

PIST. *Germen* superum, ovatum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* acutum.

PER. nullum. *Calyx interior* includens, induratus, deciduus.

SEM. unicum.

† *Mas* in distincto individuo.

CAL. exterior ut in Hermaphrodito.

Interior nullus.

COR. ut in Hermaphrodito, sed *Tubus* membranaceus.

STAM. ut in Hermaphrodito.

PER. nullum.

SEM. nullum.

219. CEPHALANTHUS * *Platanocephalus* *Vaill. A. G. 1722.*

CAL. *Perianthium commune* nullum, sed *Receptaculum* *Aosculos* plures in capitulum colligens globosum.

Perianthium proprium monophyllum, infundibuliforme angulatum: limbo quadrifido.

COR. *universalis* æqualis. *Propria* monopetala, infundibuliformis, acuta.

STAM. *Filamenta* quatuor, corollæ inserta, limbo breviora. *Antheræ* globosæ.

PIST. *Germen* inferum. *Stylus* corollæ longior. *Stigma* globosum.

PER. nullum.

SEM. solitaria, longa, basi attenuata, pyramidata lanuginosaque.

REC. *commune* globosum, villosum.

220. LOUICHEA. L'Heritier.

CAL. *Receptaculum commune* pedunculiforme, trichotomum, flores proferens.

Perianthium proprium monophyllum, quadripartitum: laciniis concavis, subulato-acuminatis, irregularibus.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quatuor, subulata, vix connata, receptaculo inserta. *Antheræ* subrotundæ, biloculares, peltatæ.

PISTILL. *Germen* superum, turbinatum. *Stylus* filiformis, bifidus. *Stigmata* simplicia.

PER. *calyx* clausus, semen tegens.

SEM. unicum, arillatum, obovatum: *arillo* membranaceo.

221. DIPSACUS. * Tournef. 265. Vaill. A. G. 1722.

CAL. *Perianthium commune* multiflorum, polyphyllum: foliolis flosculo longioribus, laxis, persistentibus.

Perianthium proprium vix manifestum, superum.

COR. *propria universalis* æqualis, monopetala, tubulosa: limbo quadrifido, erecto: *lacinia exteriori* majore, acutiore.

STAM. *Filamenta* quatuor, capillaria, corolla longiora. *Antheræ* incumbentes.

PIST. *Germen* inferum. *Stylus* filiformis, longitudine corollæ. *Stigma* simplex.

PER. nullum.

SEM. solitaria, columnaria, margine calycino integro coronata.

REC. *commune* conicum, *Paleis* longioribus distinctum.

222. SCABIOSA. * *Tournef.* 263. 264. *Vaill.*
A. G. 1722. *Asterocephalus Vaill. ibid.*
Succisa Vaill. ibid. *Pterocephalus Vaill.*
ibid.

CAL. *Perianthium commune* multiflorum, patens, polyphyllum: *foliis* seriebus variis receptaculum cingentibus eique insidentibus, quorum interiora gradatim minora.

Perianthium proprium duplex, utrumque superum.

P. exterius brevius, membranaceum, plicatum, persistens.

P. interius quinquepartitum: *laciniis* subulato-capillaceis.

COR. *universalis* æqualis, sæpe ex inæqualibus.

Propria monopetala, tubulosa, semi 4- f. 5-fida, æqualis f. inæqualis.

STAM. *Filamenta* quatuor, subulato-capillaria, debilia, *Anthera* oblonga, incumbentes.

PIST. *Germen* inferum, *propria* vagina involutum tanquam calyculo. *Stylus* filiformis, longitudine corollæ. *Stigma* obtusum, oblique emarginatum.

PER. nullum.

SEM. solitaria, ovato-oblonga, involuta, coronata varie calycibus propriis.

REC. *commune* convexum, placeaceum seu nudum.

OBS. Corollæ exteriores sæpe majores, magis inæquales. *Seminum* coronæ variæ in diversis.

Flosculi quadrifidi & quinquesidi primario species distinguunt.

223. KNAUTIA. * *Lychni-Scabiosa Boerh.*

CAL. *Perianthium commune* flosculos in simplicem orbem digestos continens, simplex, cylindraceum, oblongum, erectum: *laciniis* subulatis, approximatis, numero flosculorum. *Perianth. proprium* minimum, coronans germen.

COR. *universalis* æqualis. *Propria* monopetala, inæqualis. *Tubus* longitudine calycis. *Limbus* inæqualis, quadrifidus: *lacinia* exteriori majore, ovata.

STAM. *Filamenta* quatuor, tubo corollæ longiora, receptaculo inserta. *Anthera* oblonga, incumbentes.

PIST. *Germen inferum. Stylus filiformis, longitudine staminum. Stigma crassiusculum, bifidum.*

PER. nullum.

SEM. solitaria, tetragona, pappo coronata.

REC. commune vix notabile, planum, nudum.

OBS *Calyce tubulato & simplici flosculorum orbita a scabiosis distinguitur, quibus valde affinis.*

224. ALLIONIA. *Læfl. it. 181.*

CAL. *Perianthium commune oblongum, simplex, triflorum, quinquepartitum: laciniis ovatis, acutis; persistens. Perianth. proprium obsoletum, superum.*

COR. *Propria monopetala, infundibuliformis: ore quinquefido, erecto.*

STAM. *Filamenta quatuor, setacea, corolla longiora, ad unum latus flexa. Anthera subrotundæ.*

PIST. *Germen inferum, oblongum. Stylus setaceus, staminibus longior. Stigma multifidum, lineare.*

PER. nullum.

SEM. solitaria, oblonga, quinquangula, nuda.

REC. nudum.

OBS. *Variat calycibus quinquesidis & triphyllis.*

225. OPERCULARIA. *Gærtn. 24. f. 4. Pömax. Soland.*

CAL. *Perianthium commune monophyllum, campanulatum, tri- f. sexflorum, sex- f. novem-dentatum; dentibus acutis, inæqualibus, persistens.*

Perianthium proprium nullum.

COR *Universalis æqualis.*

Propria monopetala, infundibuliformis: ore quadri- f. quinquefido, erecto.

PTAM. *Filamenta quatuor, receptaculo inserta. Anthera distinctæ.*

PIST. *Germen inferum, receptaculo immersum. Stylus filiformis. Stigma crassiusculum, bifidum.*

PER. nullum.

SEM. solitaria, hinc convexa, inde sulcata.

REC. *commune supra planum, aperturam calycis infra dentes obturans; infra pyramidatum, sulcato-angulatum: angulis in dissepimenta productis, quibus ca-*

vitas calycis in loculamenta, seminum numero æqualia, dividitur; deciduum.

226. PETITIA. Jacq. amer. 14.

CAL. *Perianthium* monophyllum, parvum, erectum, quadridentatum, inferum, persistens.

COR. monopetala. *Tubus* cylindraceus, erectus, longus. *Limbus* quadrifidus, *laciniis* ovatis, acutis, planis, reflexis, tubo duplo brevioribus.

STAM. *Filamenta* quatuor, subulata, brevissima, in superiore parte tubi. *Antheræ* erectæ.

PIST. *Germen* subrotundum, parvum. *Stylus* subulatus, erectus, longitudine staminum. *Stigma* simplex.

PER. *Drupa* subrotunda.

SEM. *Nux* ovata, obtusa, bilocularis. *Nuclei* solitarii, oblongi.

227. ACQUARTIA. Jacq. amer. 15.

CAL. *Perianthium* monophyllum, persistens: *Tubo* campanulato; *Limbo* subquadrifido, patente: *laciniis* duabus oppositis obsoletis.

COR. monopetala, rotata. *Tubus* brevissimus. *Limbus* quadrifidus: *laciniis* linearibus, patentissimis.

STAM. *Filamenta* quatuor, brevia. *Antheræ* erectæ, maximæ, lineares.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, declinatus, longitudine corollæ. *Stigma* simplex.

PER. *Bacca* globosa, unilocularis.

SEM. plurima, compressa.

228. MYRMECIA. Schreb. Tachia Aubl. guian. 75. t. 29.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulosum, longum, quinquedentatum: denticulis erectis, acutis. †

COR. monopetala. *Tubus* longus. *Faux* inflata. *Limbus* quinquefidus: *laciniis* ovatis, acutis, revolutis.

Nectarium *Glandula* quinque parvæ, germinis basin cingentes.

STAM. *Filamenta* quatuor, filiformia, tubo inferne inserta, eoque longiora. *Antheræ* lineares, erectæ.

PIST. *Germen* oblongum, superum. *Stylus* filiformis, staminibus longior. *Stigma* bilamellatum.

PER. *Capsula* longa, bilocularis, bivalvis, calyce persistente testâ.

SEM. numerosa, minima, viscida, dissepimento adherentia.

229. *CALLICARPA*. *Sphondylococcus* Mitch.
20. *Burchardia Heisteri*.

CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum: ore quadrifido, erecto.

COR. monopetala, tubulosa: *Limbus* quadrifidus, obtusus, patens.

STAM. *Filamenta* quatuor, filiformia, corolla duplo longiora. *Anthera* ovata, incumbentes.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis, superne crassior. *Stigma* crassiusculum, obtusum.

PER. *Bacca* globosa, glabra.

SEM. quatuor, oblonga, menisciformia, compressa, callosa.

230. *ÆGIPHILA*. *Jacq.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum, quadridentatum, laxum, brevissimum, persistens.

COR. monopetala: *Tubus* cylindricus, calyce angustior longiorque. *Limbus* quadrifidus, planus, æqualis: laciniis oblongis.

STAM. *Filamenta* quatuor, capillaria, erecta, longiora. *Anthera* incumbentes, quadrata.

PIST. *Germen* superum. *Stylus* capillaris, semibifidus, mediocris. *Stigmata* simplicia.

PER. *Bacca* subrotunda, unilocularis.

SEM. quatuor.

231. *CURTISIA*. *Ait. Kew.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, quadripartitum: *laciniæ* ovata, acuta.

COR. *Petala* quatuor, ovata, obtusa, sessilia, calyce longiora.

STAM. *Filamenta* quatuor, receptaculo inserta, subulata, petalis breviora. *Anthera* ovata.

- PIST.** *Germen* superum, ovatum. *Stylus* subulatus, longitudine staminum. *Stigma* quadri- vel quinquefidum.
PER. *Drapa* subglobosa, glabra.
SEM. *Nux* subrotunda, ossea, quadri- vel quinquelocularis. *Nuclei* solitarii, oblongi.

232. SCOPARIA. *

- CAL.** *Perianthium* monophyllum, quadripartitum, concavum: *laciniis* tenuibus, scabris.
COR. monopetala, rotata, patens, concava, quadripartita: *laciniis* lingulatis, obtusis, æqualibus; faux barbata.
STAM. *Filamenta* quatuor, æqualia, subulata, corolla breviora. *Antherae* simplices.
PIST. *Germen* conicum. *Stylus* subulatus, longitudine corollæ, persistens. *Stigma* acutum.
PER. *Capſula* oblongo-conica, acuminata, unilocularis, bivalvis.
SEM. plurima, oblonga.

233. CENTUNCULUS * *Dill. gen. 5. Anagallidastrum. Mich. 10.*

- CAL.** *Perianthium* quadrifidum, patens, persistens: *laciniis* acutis, lanceolatis, corolla longioribus.
COR. monopetala, rotata. *Tubus* subglobosus. *Limbus* quadrifidus, planus: *laciniis* subovatis.
STAM. *Filamenta* quatuor, longitudine ferme corollæ. *Antherae* simplices.
PIST. *Germen* subrotundum, intra tubum corollæ. *Stylus* filiformis, longitudine corollæ, persistens. *Stigma* simplex.
PER. *Capſula* globosa, unilocularis, circumscissa.
SEM. plurima, subrotunda, minima.

234. PLANTAGO. * *Tournef. 48., Coronopus Tournef. Psyllium Tournef.*

- CAL.** *Perianthium* quadrifidum, erectum, brevissimum, persistens.
COR. monopetala, persistens, tabescens. *Tubus* cylin-

draceo-globosus. *Limbus* quadrifidus, reflexus: *lacinii* ovatis, acutis.

STAM. *Filamenta* quatuor, capillaria, erecta, omnium longissima. *Antheræ* oblongiusculæ, compressæ, incumbentes.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, staminibus dimidio brevior. *Stigma* simplex.

PER. *Capſula* ovata, bilocularis, circumscissa, dissepimento libero.

SEM. plurima, oblonga.

OBS. *Calyx* in quibusdam inæqualis est, in aliis æqualis.

P. virginica in America corollas explicat & stamina exserit, in Europa vix.

235. LITTORELLA. Auth. D. Bergio. Act. Suec. 1768.

* *Masculi.*

CAL. *Perianthium* tetraphyllum, erectum.

COR. monopetala. *Tubo* longitudine calycis; *Limbo* quadripartito, erecto, persistente.

STAM. *Filamenta* quatuor, filiformia, longissima, receptaculo inserta. *Antheræ* cordatæ.

* *Feminei* in eadem planta.

CAL. nullus.

COR. monopetala, conica, ore obsolete trifido, persistens.

PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis, longissimus. *Stigma* acutum.

PER. *Corolla* vestiens.

SEM. *Nux* unilocularis.

OBS. *Flos* plantaginis. *Fructus* vero alienus.

Corollam floris feminei subquadrifidam esse. Syst. Veg.
p. 848.

236. POLYPREMUM. †

CAL. *Perianthium* tetraphyllum, persistens: *foliis* lanceolatis, carinatis, interne coloratis.

COR. monopetala, rotata. *Limbus* quadrifidus: lobis obcordatis, longitudine calycis.

STAM. *Filamenta* quatuor, brevissima, in fauce corollæ. *Antheræ* subrotundæ.

298 TETRANDRIA MONOGYNIA.

PIST. *Germen* obcordatum. *Stylus* brevis, persistens.
Stigma truncatum.

PER. *Capsula* ovata, apice compressa, emarginata, bilocularis dissepimento contrario, bivalvis.

SEM. numerosa.

237. CHOETOCARPUS. Schreb. Pouteria
Aubl. guian. 85. t. 33.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quadripartitum: *laciniis* ovatis, concavis, acutis, persistentibus.

COR. monopetala. *Tubus* ovatus. *Limbus* quadrifidus: dentibus ovatis, acutis, inter quos *feta* erecta.

STAM. *Filamenta* quatuor, brevissima, tubo corollæ ad basin inserta. *Anthera* cordata.

PIST. *Germen* ovatum, villosissimum, superum. *Stylus* tetragonus, brevis. *Stigma* quadricuspidatum.

PER. *Capsula* ovata, sulcata, crassa, fetis rigidis densis tecta, quadrilocularis, quadrivalvis.

SEM. solitaria, oblonga, angulata, externe convexa.

238. LASIOSTOMA. Schreb. Rouhamon.
Aubl. guian. 93. t. 36.

CAL. *Perianthium* monophyllum, brevissimum, quinquepartitum: *laciniis* acutis. Ad ejus basin *squamulae* duae oppositæ.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* cylindraceus. *Limbus* quadrifidus: *laciniis* acutis, villosis.

STAM. *Filamenta* quatuor, capillaria, basi villosa, tubo corollæ inserta. *Antheræ* oblongæ.

PIST. *Germen* ovatum, superum. *Stylus* corollæ longior. *Stigma* obtusum.

PER. *Capsula* orbiculata, unilocularis, cortice fragili.

SEM. duo, hemisphærica.

239. BUDDLEJA. † Houst. A. A.

CAL. *Perianthium* minimum, quadrifidum, acutum, erectum, persistens.

COR. monopetala, campanulata, semiquadrifida, erecta, calyce triplo major: *laciniis* ovatis, rectis, acutis.

STAM. *Filamenta* quatuor, brevissima, ad divisuras corollæ posita. *Anthera* brevissima, simplices.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* simplex, corolla dimidio brevior. *Stigma* obtusum.

PER. *Capsula* ovata, oblonga, bisulca, bilocularis.

SEM. numerosa, minutissima.

240. LABATIA Swartz prodr.

CAL. quadriphyllus, inferus.

COR. subcampanulata, quadrifida.

Lacinia duæ minutæ in divisuris corollæ.

PER. *Capsula* quadrilocularis.

SEM. solitaria.

241. EXACUM. †

CAL. *Perianthium* tetraphyllum: *foliolis* ovatis, obtusis, erecto-patulis & persistentibus.

COR. monopetala, persistens: *Tubus* globosus, longitudine calycis; *Limbus* quadripartitus: *laciniis* subrotundis, patentibus.

STAM. *Filamenta* quatuor, filiformia, tubo insidentia, longitudine limbi. *Anthera* subrotunda.

PIST. *Germen* subrotundum, tubum implens. *Stylus* filiformis, erectus, longitudine limbi. *Stigma* capitatum.

PER. *Capsula* subrotunda, compressa, bisulca, bilocularis, longitudine calycis.

SEM. numerosa, receptaculo capsulam replente.

OBS. *Variat flaminibus exsertis & inclusis.*

E. cordatum quintam partem numeri addit

242. PENÆA. †

CAL. *Perianthium* diphyllum: *foliolis* oppositis, lanceolatis, concavis, æqualibus, coloratis, corolla dimidio brevioribus, laxis, deciduis.

COR. monopetala, campanulata. *Limbus* quadrifidus, patulus, tubo longe brevior: *laciniis* acutis.

STAM. *Filamenta* quatuor, subulata, omnium brevissima, tubo corollæ inter divisuras insidentia, erecta, nuda. *Anthera* erecta, planiuscula, utrinque emarginata,

PIST. *Germen* ovatum, tetragonum. *Stylus* alis quatuor membranaceis longitudinalibus tetragonus. *Stigma* cruciforme, obtusum, persistens.

PER. *Capsula* tetragona, stylo instructa, quadrilocularis, quadrivalvis.

SEM. bina, oblongiuscula, obtusa.

OBS. P. laterifloræ *calyx* tetraphyllus, longitudine foliorum & *stamina* absque filamentis.

243. BRABEJUM. † *ex novis observationibus*
D. Mutis. Brabya. Mant. 137.

* *Masculi* flores in eadem arbore.

CAL. *Amentum* squamis ovatis, obtusis, trifloris.

COR. infundibuliformis, quadripartita: *laciniis* oblongis.

STAM. *Filamenta* quatuor, fauci inserta, mediocria. *Anthera* oblonga, adnata lateri interiori filamentorum, excepto apice.

PIST. *Germen* nullum. *Stylus* filiformis, mediocris. *Stigmata* duo, erecta.

* *Hermaphroditi*.

CAL. nullus. (*Amenti* squama. *Syst. Veg. ed. Murray* 764.)

COR. *Petala* quatuor, linearia, obtusa, inferne erecta, tubum formantia, superne revoluta, decidua. (COR. 4-partita. *Syst. Veg. ed. Murray* 764.)

STAM. *Filamenta* quatuor, capillaria, unguibus petalorum inserta, longitudine vix corollæ. *Anthera* parvæ, lateribus dehiscentes.

PIST. *Germen* minimum, villosum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum, superne fere crassior. *Stigma* simplex.

PER. *Drupa* ficcior, subrotunda, villosa.

SEM. *Nux* globosa.

OBS. Brabya corolla 5-fida & staminibus 5 gaudet.

244. BLÆRIA. †

CAL. *Perianthium* quadripartitum: *foliolis* linearibus, erectis, corolla paulo brevioribus, persistentibus.

COR. monopetala, campanulata. *Tubus* cylindraceus, longitudine calycis, pervius. *Limbus* parvus, quadrifidus: *laciniis* ovatis, reflexis.

STAM. *Filamenta* quatuor, setacea, longitudine tubi, receptaculo inserta. *Antheræ* oblongæ, compressæ, erectæ, obtusæ, emarginatæ.

PIST. *Germen* tetragonum, breve. *Stylus* setaceus, corolla multo longior. *Stigma* obtusum.

PER. *Capsula* obtusa, quadrangularis, quadrilocularis, angulis dehiscens.

SEM. nonnulla, subrotunda.

OBS. *Antheræ* quidem emarginatæ sunt, nullo tamen modo bicornes, ut in *Erica* affini.

Blæria articulata corollam cylindricam, *B. purpurea* corollam oblongam & *B. pusilla* corollam infundibuliformem habet: *stamina* denique aliis exserta, aliis inclusa.

OBS. Cum *Ericæ* vastissimo genere, forte minus recte? conjungendam judicat *Illustr. Dahl* l. c.

245. ERNODEA. Swartz prodr.

CAL. quadripartitus.

COR. monopetala, hypocrateriformis.

PER. *Bacca* bilocularis.

SEM. solitaria.

246. PAVETTA.

CAL. *Perianthium* campanulatum, minimum, obsolete quadridentatum, germen cingens.

COR. monopetala, infundibuliformis: *Tubus* longus, tenuis, cylindricus. *Limbus* quadripartitus, patens, tubo dimidio brevior: *lacinii* lanceolatis.

STAM. *Filamenta* quatuor, brevissima, supra faucem corollæ. *Antheræ* subulatæ, patentes, longitudine limbi.

PIST. *Germen* inferum, turbinatum. *Stylus* filiformis, corolla duplo longior. *Stigma* crassiusculum, oblongum, obliquum.

PER. *Bacca* subrotunda, unilocularis.

SEM. bina, hinc convexa, cartilaginea.

247. SIDERODENDRUM Sideroxyloides. Jacq. amer. 19.

CAL. *Perianthium* monophyllum, minimum, quadridentatum, acutum, germini insideas.

112 TETRANDRIA MONOGYNIA.

COR. monopetala. *Tubus* cylindraceus, incurvus, longus. *Limbus* quadrifidus: *laciniis* oblongis, obtusis, planis, reflexis, tube duplo brevioribus.

STAM. *Filamenta* quatuor, brevissima, infra divisuras limbi orta. *Antherae* oblongae, erectae.

PIST. *Germen* subrotundum, inferum. *Stylus* filiformis, longitudine tubi corollae. *Stigma* oblongum, obtusum, crassiusculum. *Jacq.*

PER. *Bacca* dicocca, calyce coronata, bilocularis: dissepimento contrario.

SEM. solitaria, hinc convexa, rugosa, inde plana, marginata, dissepimento affixa.

248. EMBELIA. *Burm.* *Retz. fasc. 4.* *obs. bot. p. 23.*

CALYX inferus, monophyllus, cavus, quadrifidus: *laciniis* rotundatis.

STAMINA quatuor. *Filamenta* ad divisuram corollae adnate-decurrentia, supra divisuram petalo breviora. *Antherae* subrotundae, compressiusculae, ab utroque margine dehiscentes.

PIST. *Germen* globosum, superum. *Stylus* nullus. *Stigma* capitatum.

PER. *Bacca*.

OBS. *Incompletum generis characterem autoptae emendat.*

249. IXORA,

CAL. *Perianthium* quadripartitum, minimum, erectum, persistens.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* cylindraceus, longissimus, tenuis. *Limbus* quadripartitus, planus: *laciniis* ovatis.

STAM. *Filamenta* quatuor, supra faucem corollae, brevissima, incurva. *Antherae* oblongae.

PIST. *Germen* subrotundum, inferum. *Stylus* filiformis, longitudine tubi. *Stigma* bifidum.

PER. *Bacca* subrotunda, bilocularis.

SEM. quaterna, hinc convexa, inde angulata.

250. PETESIA. † *Brown. t. 2. f. 2. 3. & t. 3. f. 2.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum, superum, ore dentato.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* cylindricus, calyce longior. *Limbus* quadripartitus: lobis rotundatis, obtusis.

STAM. *Filamenta* quatuor, subulata, longitudine tubi. *Antheræ* oblongiusculæ.

PIST. *Germen* inferum. *Stylus* filiformis. *Stigma* bifidum, acutum.

PER. *Bacca* globosa, coronata, bilocularis.

SEM. plurima, subrotunda.

151. HOFFMANNIA. *Swartz prodr.*

CAL. quadridentatus.

COROL. hypocrateriformis quadripartita.

STAM. *Filamenta* nulla.

PER. *Bacca* bilocularis, polysperma,

252. CATESBÆA. † *Gronov.*

CAL. *Perianthium* quadridentatum, superum, minimum, acutum, persistens.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* omnium longissimus, rectus, superne sensim crassior. *Limbus* semiquadrifidus, latus, erecto-planus.

STAM. *Filamenta* quatuor, intra collum tubi enata. *Antheræ* oblongæ, erectæ, corolla fere longiores.

PIST. *Germen* subrotundum, inferum. *Stylus* filiformis, longitudine corollæ. *Stigma* simplex.

PER. *Bacca* ovalis, coronata, unilocularis.

SEM. plura, angulata.

* 53. MITCHELLA. † *Chamædaphne. Mitch.*
27.

CAL. Flores bini eidem germini insidentes.

Perianthia duo distincta, quadridentata, erecta, persistentia, supera.

COR. monopetala, infundibuliformis: *Tubo* cylindrico; *Limbus* quadripartitus, patens, intus hirsutus.

LINNE GEN. PL. VOL. I.

H

STAM. *Filamenta* quatuor, filiformia, erecta, intra sinus corollæ. *Anthera* oblongæ, acutæ.

PIST. *Germen* didymum, orbiculatum, duobus commune, inferum. *Stylus* filiformis, longitudine corollæ. *Stigmata* quatuor, oblonga.

PER. *Bacca* bipartita, globosa, disjunctis umbilicis.

SEM. quaterna, compressa, callosa.

254. CHOMELIA. Jacq. amer. p. 18.

CAL. *Perianthium* monophyllum, parvum, germini insidens. *Tubus* cylindraceus, erectus. *Limbus* quadrifidus: laciniis lanceolatis, acuminatis, planis, revolutis, tube brevioribus.

COR. monopetala. *Tubus* tenuis cylindraceus, longissimus, erectus. *Limbus* quadrifidus: laciniis lanceolatis, planis, in acumen setaceum abeuntibus, patentissimis, tubo brevioribus.

STAM. *Filamenta* quatuor, subulata, brevissima, erecta, in superiure parte tubi corollæ. *Anthera* lineares, magnæ incumbentes, longitudine tubi.

PIST. *Germen* oblongum, parvum, apice quadrifide, inferum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* bifidum: laciniis oblongis, crassiusculis, patentibus.

PER. *Drupa* ovalis, calyce coronata.

SEM. *Nux* oblonga, quadrifidulcata, bilocularis. *Nuclei* textes, solitarii.

255. Hydrophylax. Suppl. p. 14.

CAL. *Perianthium* monophyllum, superum, erectum, quadrupartitum, (tetraphyllum videtur, sed carnosæ laciniæ basi membranula coherent.) *Lacinia* ovate, acutæ, marginatæ, subcarnosæ, persistentes.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* calyce longior. *Limbus* angulatus, quadrifidus. *Lacinia* ovatæ, revolutæ. *Faux* barbata.

STAM. *Filamenta* quatuor, apici tubi inserta, decurrentia, erecta, corolla longiora. *Anthera* subhastatæ.

PIST. *Germen* inferum, oblongum, anceps, striatum. *Stylus* filiformis, curvatus. *Stigma* bifidum.

PER. *Fructus* oblongo-ovatus, quadrangularis, anceps (nam anguli oppositi oblitterati) parum incurvatus, lignosus, evalvis.

SEM. unicum, lineare, convolutum, scabriusculum.

256. HEDYOTIS. †

CAL. *Perianthium* monophyllum, quadripartitum, superum, persistens: *laciniis* linearibus, acutis.

COR. monopetala, infundibuliformis, calyce paulo longior, semi-quadrifida: *laciniis* patulis, subæqualibus.

STAM. *Filamenta* quatuor, subulata, ad sinus corollæ inserta. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* subrotundum, inferum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigmata* duo, crassiuscula.

PER. *Capsula* globofo-didyma, bilocularis, dehiscens juxta calycem coronalem rima transversali.

SEM. pauca, angulata.

257. OLDENLANDIA * *Plum.* 36.

CAL. *Perianthium* quadripartitum: *laciniis* subulatis; superum, persistens.

COR. monopetala: *Tubus* cylindricus, barba clausus. *Limbus* quadripartitus, acutus, patens, calyce paulo longior.

STAM. *Filamenta* quatuor, simplicia, intra tubum. *Antheræ* paræ.

PIST. *Germen* subrotundum, inferum. *Stylus* simplex, longitudine staminum. *Stigma* bifidum, obtusum.

PER. *Capsula* didyma, subrotunda, bilocularis, dehiscens inter dentes calycis.

SEM. numerosa, minima.

OBS. *Corolla tetrapetala dicitur in Syst. Veget. edit. 14. p. 161.*

258. MANETTIA. *Auth. D. Mutis.*

CAL. *Perianthium* octophyllum: *foliolis* linearibus, concavis, hirsutis, persistentibus.

COR. monopetala, hypocrateriformis; *Tubus* cylindricus, calyce longior: exaratus intus lineis quatuor; *Limbus* quadripartitus *laciniis* tubo brevioribus, ovatis, obtusis, intus barbatis.

Nectarium margo receptaculum ambides, integerrium, concavum.

STAM. *Filamenta* quatuor, filiformia, minima, fauci inserta. *Antheræ* lineares, incumbentes, biloculares.

PIST. *Germen inferum, turbinatum, compressum. Stylus filiformis, declinatus, longitudine tubi. Stigma bifidum, crassiusculum, obtusum.*

PER. *Capsula turbinata, compressa, utrinque sulcata, unilocularis, bivalvis, quasi in capsulas 2. separabilis.*

SEM. *pauca, plana, alata, orbiculata feminulo centrali, imbricata ad columellam pulposam, oblongam.*

259. SANGUISORBA *

CAL. *Perianthium diphyllum: foliolis oppositis, brevissimis, caducis.*

COR. *monopetala, rotata, quadripartita: laciniis ovatis, obtusis, unguibus cohærentibus.*

STAM. *Filamenta quatuor, superne latiora, longitudine corollæ. Antheræ subrotundæ, parvæ.*

PIST. *Germen tetragonum, inter calycem & corollam positum. Stylus filiformis, brevissimus. Stigma obtusum.*

PER. *Capsula parva, bilocularis.*

SEM. *parva.*

260. HOUSTONIA. † Gronov.

CAL. *Perianthium minimum, quadridentatum, erectum, persistens.*

COR. *monopetala, infundibuliformis. Tubus cylindraceus, longus. Limbus quadripartitus, patens: laciniis subrotundis.*

STAM. *Filamenta quatuor, in collo corollæ, minima. Antheræ simplices.*

PIST. *Germen superum, subrotundum, compressum. Stylus simplex, staminibus brevior. Stigma bifidum, acutum.*

PER. *Capsula subrotunda, didyma, bilocularis, bivalvis: valvulis dissepimento oppositis.*

SEM. *solitaria.*

361. SCABRITA.

CAL. *Perianthium monophyllum, tubulosum, truncatum, integerrimum, persistens.*

COR. *monopetala, hypocrateriformis. Tubus cylindricus, longitudine calycis. Limbus quadripartitus, patens Lobis bilobis.*

STAM. *Filamenta* quatuor, in medio tubi, brevissima.
Antheræ oblongæ, longitudine tubi.

PIST. *Germen* superum, subovatum. *Stylus* filiformis, longitudine tubi. *Stigmata* duo, acuta.

PER. nullum.

SEM. duo, parallela, appressa, obovata, apice biloba, extus convexa.

262. RUBIA. * *Tournef.* 38.

CAL. *Perianthium* minimum, quadridentatum, superum.
 COR. monopetala, campanulata, quadripartita, absque tubo.

STAM. *Filamenta* quatuor, subulata, corolla breviora.
Antheræ simplices.

PIST. *Germen* didymum, inferum. *Stylus* filiformis, superne bifidus. *Stigmata* capitata.

PER. *Bacca* duæ, coalitæ, glabræ.

SEM. solitaria, subrotunda, umbilicata.

OBS. *Flos sæpe quinquefidus evadit.*

263. GALIUM. * *Galium. Tournef.* 39. *Aparine Tournef.* 39. *Valantia Linn. gen.* 1258. *Tournef. A. G.* 1706. t. 3. *Dill. gen.* 8. *Mich.* 7. *Cruciata. Tournef.* 39.

CAL. *Perianthium* minimum, quadridentatum, superum.
 COR. monopetala, rotata, quadripartita aut tripartita, acuta: tubo nullo.

STAM. *Filamenta* quatuor, aut tria, subulata, corolla breviora. *Antheræ* simplices.

PIST. *Germen* inferum, didymum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum, semibifidus. *Stigmata* globosa.

PER. *Bacca* duæ, siccæ, globosæ, coalitæ.

SEM. solitaria globosa, aut reniformia.

264. ASPERULA. *

CAL. *Perianthium* parvum, quadridentatum, superum.
 COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* cylindricæus, longus. *Limbus* quadripartitus: *lacinis* oblongis, obtusis, reflexis.

STAM. *Filamenta* quatuor, ad apicem tubi posita. *Antheræ* simplices.

PIST. *Germen* didymum, subrotundum, inferum. *Stylus* filiformis, superne bifidus. *Stigmata* capitata.

PER. *Bacca* sicca, duæ, globosæ, coalitæ.

SEM. solitaria, subrotunda, magna.

Obs. A. tinctoria & pyrenaica flores plerosque trifidos habent.

165. SCHERARDIA. * *Dill. gen.* 3.

CAL. *Perianthium* parvum, quadridentatum, superum, persistens.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* cylindraceus, longus. *Limbus* quadripartitus, planus, acutus.

STAM. *Filamenta* quatuor, ad apicem tubi posita. *Antheræ* simplices.

PIST. *Germen* didymum, oblongum, inferum. *Stylus* filiformis, superne bifidus. *Stigmata* capitata.

PER. nullum. *Fructus* oblongus, coronatus, longitudinaliter in duo semina separabilis.

SEM. bina, oblonga, apice tribus acuminibus notata, hinc convexa, inde plana.

266. SPERMACOCE. * *Dill. el. h.* 277.

CAL. *Perianthium* parvum, quadridentatum, superum, persistens.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* cylindraceus, tenuis, calyce longior. *Limbus* quadripartitus, patenti-reflexus, obtusus.

STAM. *Filamenta* quatuor, subulata, corolla breviora. *Antheræ* simplices.

PIST. *Germen* subrotundum, compressum, inferum. *Stylus* simplex, superne bifidus. *Stigmata* obtusa.

PER. *Capsulæ* duæ, connatæ, oblongæ, hinc gibbæ, inde planæ, obtusæ, singulæ bicornes.

SEM. solitaria, subrotunda.

267. KNOXIA. *f.*

CAL. *Perianthium* tetraphyllum, superum, parvum, deciduum: foliolis acuminatis; unico lanceolato, triplo majore.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* filiformis, longus. *Limbus* quadripartitus: *laciniis* æqualibus, oblongiusculis, rotundatis.

STAM. *Filamenta* quatuor, capillaria, intra faucem corollæ. *Anthera* oblonga, æquales.

PIST. *Germen* subrotundum, inferum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigmata* duo, capitata.

PER. *Fructus* nudus, subglobosus, acuminatus, sulcatus.

SEM. duo, subrotunda, acuminata, extrorsum convexa, striis tribus exarata; introrsum plana, Receptaculo filiformi superne annexa,

268. DIODIA. † Gronou.

CAL. *Perianthium* diphyllum: *foliolis* subovatis, superis, æqualibus, persistentibus.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* tenuis, longus. *Limbus* parvus, qatens, quadripartitus: *laciniis* lanceolatis.

STAM. *Filamenta* quatuor, setacea, erecta. *Anthera* versatile.

PIST. *Germen* subrotundum, tetragonum, inferum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* bifidum.

PER. *Capsula* ovata, tetragona, coronata calyce majore, bilocularis, bivalvis.

SEM. solitaria, ovato-oblonga, nitida, hinc convexa, inde plana.

269. CRUCIANELLA. *Rubeola Tournef. 50.

CAL. *Perianthium* diphyllum, inferum: *foliolis* lanceolatis, carinulatis, acuminatis, rigidis, conniventibus compressis.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* cylindraceus, filiformis, calyce longior. *Limbus* quadrifidus: *laciniis* caudatis, acuminibus inflexis.

STAM. *Filamenta* quatuor, in ore tubi posita. *Anthera* simplices.

PIST. *Germen* compressum, inter calycem & corollam. *Stylus* bifidus, filiformis, longitudine tubi. *Stigmata* duo, obtusa, oblonga.

PER. *Capsula* duæ, connatæ.

SEM. solitaria, oblonga.

OBS. *C. maritima* corollis quinquesidis pentandris gaudet.
C. ægyptiaca etiam floribus quinquesidis est.

270. SIPHONANTHUS. *Siphonanthemum*.
Amm. Act. petrop. 1756.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum, amplum, persistens.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tabus* filiformis, angustissimus, calyce multoties longior. *Limbus* quadripartitus, patens, calyce minor.

STAM. *Filamenta* quatuor, corollæ limbo longiora. *Anthera* oblongæ, triangulares.

PIST. *Germen* quadrifidum, brevissimum, superum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum, apice recurvatus. *Stigma* simplex.

PER. *Bacca* quatuor, intra calycem patulum, subrotundæ.

SEM. solitaria, subrotunda.

271. EPIMEDIUM. * *Tournef.* 117.

CAL. *Perianthium* tetraphyllum: *foliis* ovatis, obtusis, concavis, patentibus, parvis, petalis directe (non alternatim) subjectis, caducis.

COR. *Petala* quatuor, ovata, obtusa, concava, patentia. *Nectaria* quatuor, cyathiformia, fundo obtuso, magnitudine petalorum, petalis incumbentia, margine oris affixa receptaculo.

STAM. *Filamenta* quatuor, subulata, stylum prementia. *Anthera* oblongæ, erectæ, biloculares, bivalves, a basi apicem versus dehiscentes, dissepimento libero.

PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* germine brevior, longitudine staminum. *Stigma* simplex.

PER. *Siliqua* oblonga, acuminata, unilocularis, bivalvis.

SEM. plurima, oblonga.

272. SKIMMIA. *Thunb. diff. nov. gen.* p. 57.
Flor. jap. p. 4.

CAL. *Perianthium* monophyllum, viride, minimum, persistens, ad basin fere quadripartitum, raro quinquepartitum: *lacinia* ovata, acuta.

COR. tetrapetala, alba. *Petala* ovata, minuta, concava.
STAM. *Filamenta* quatuor, brevissima.
PIST. *Germen* superum. *Stylus* unicus.
PER. *Bacca* ovata, umbilicata, glabra, rubra, obsoleta
quadrisulcata, magnitudine pisi: intus farinaceo pul-
posa alba: subquadrivalvis.
SEM. quatuor, subtrigona, seu externe convexa, ob-
longa, alba.

273. **OTHERA.** *Thunb. diff. nov. gen. p. 56.*
Flor. jap. p. 4.

CAL. *Perianthium* monophyllum, glabrum, persistens,
quadripartitum: *laciniæ* ovatae.
COR. tetrapetala, alba. *Petala* ovata, obtusa.
STAM. *Filamenta* quatuor, basi infima petalorum in-
serta, corolla duplo breviora. *Anthera* didynamæ,
quadrisulcata.
PIST. *Germen* superum, glabrum. *Stylus* nullus, sed
stigma unicum, sessile.
PER. *Fructus* ignotus, forsan capsula.

274. **ORIXA.** *Thunb. diff. nov. gen. p. 56. &*
Flor. jap. p. 3.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quadripartitum bre-
vissimum.
COR. tetrapetala, virescens. *Petalæ* lanceolata, pa-
tentia, lineam longa.
STAM. *Filamenta* quatuor, petalis breviora. *Antheræ*
globosæ.
PIST. *Germen* superum. *Stylus* unicus, erectus, petalis
brevior. *Stigma* capitatum, obtusum.
PER. ignotum, sed videtur esse capsula.
OBS. *Idem* forte *genus* cum *precedente*, & forte *utrumque*
Skimmia generis, dum *fructus* *cognitione* *etiamnum* *desi-*
tuamur.

275. **PTELEA.** *

CAL. *Perianthium* quadripartitum, acutum, parvum.
COR. *Petala* quatuor, ovato-lanceolata, plana, paten-
tia, calyce majora, coriacea.

STAM. *Filamenta* quatuor, subulata. *Anthera* subrotunda.

PIST. *Germen* orbiculatum, compressum, superum. *Stylus* brevis. *Stigmata* duo, obtusiuscula.

PER. *Membrana* subrotunda, perpendicularis, centro bilocularis.

SEM. unicum, obtusum, basi attenuatum.

OBS. *Calyx*, *Corolla*, *Stamina* saepe addunt quintam partem numeri; tum *Pistillum* tertiam cum fructu.

276. MYGINDA. Jacq. amer. 24. Samara.
gen. 156. Rhacoma gen. 150.

CAL. *Perianthium* quadripartitum, minimum, persistens.

COR. *Petala* quatuor, subrotunda, plana, patentissima.

STAM. *Filamenta* quatuor, subulata, erecta, corolla breviora. *Anthera* subrotunda.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* brevissimus, erectus, quadrifidus. *Stigmata* acuta.

PER. *Drupa* globosa, unilocularis.

SEM. *Nux* ovata, acuta, monosperma.

277. BLACKBURNIA. Forst. charact. gen.
n. 6.

CAL. *Perianthium* inferum, brevissimum, quadridentatum: *Dentibus* acutis, brevibus, horizontalibus.

COR. *Petala* quatuor, elliptica, dentibus calycinis interjecta.

STAM. *Filamenta* quatuor, subulata, petalis paullo breviora, cum iis alternantia. *Anthera* erecta, cordata.

PIST. *Germen* conicum (monospermum.) *Stylus* filiformis, erectus, longitudine staminum. *Stigma* simplex.

Per. {
SEM. { Forte *Bacca* monosperma?

278. FAGARA. † Brown. t. 5. f. 1.

CAL. *Perianthium* quadrifidum, minimum: *foliolis* concavis, persistentibus.

COR. *Petala* quatuor, oblongiuscula, concava, patentia.

STAM. *Filamenta* quatuor, corolla longiora. *Anthera* ovata.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, longitudine corollæ. *Stigma* bilobum, obtusiusculum.

PER. *Capsula* globosa, unilocularis, bivalvis.

SEM. unicum, rotundum, nitidum.

279. AMMANNIA. * *Houft.* A. A.

CAL. *Pervianthium* campanulatum, oblongum, erectum, octo striis & plicis, quadrangulare, octodentatum: *dentibus* alternis inflexis, persistens.

COR. nulla (vel) *Petala* quatuor, verticaliter ovata, patentia, calyci inserta.

STAM. *Filamenta* quatuor, setacea, longitudine calycis, cui inserta. *Anthera* didymæ.

PIST. *Germen* subovatum, magnum, superum. *Stylus* simplex, brevissimus. *Stigma* capitatum.

PER. *Capsula* subrotunda, quadrilocularis, calyce obtecta.

SEM. numerosa, parva.

OBS. *Petala* sæpe deficiunt, interdum vero occurrunt, idque in eadem specie.

A. baccifera calyce quadridentato gaudet.

A. octandra flores petaloidei octandri.

A. pinnatifida capsula tetragona.

280. BANKSIA. *Suppl.* p. 15.

CAL. *Amentum* commune undique squamis tectum. *Squamae* stuposo-coriaceæ, solidæ, transversaliter compressæ, duplici ordine circum receptaculum arcte adproximatæ, spiraliter dispositæ: *unius ordinis* minores, per paria adproximatæ: *alternæ* latiores, flosculorum paria distinguentes.

COR. duæ inter singulas squamas majores. *Singula* tetrapetala, receptaculo inserta, porrecta, marcescens. *Ungues* lineares, longissimi, diu in tubum cohærentes. *Laminae* diutius circa stigma conniventes, parvæ, lanceolatae, acutæ, concavæ, drusculæ, revolutæ.

STAM. *Filamenta* nulla. *Anthera* quatuor, cavitati laminarum insertæ, adpressæ, lanceolata, acutæ.

PIST. *Germen* superum, minutum. *Stylus* filiformis, rigidus, sulcatus, petalis longior, superne incurvus. *Stigma* simplex, stylo crassius, pyramidaliter acutum, sub fecundatione intra laminas corollæ inclusum.

PER. *Styobilus* inter squamas, continens capsulas ligneas, magnas, ovatas, uniloculares, bivalves.

SEM. unicum, obovatum, bipartibile, extus auctum membrana magna, ovata, duplicata.

291. HARTOGIA. *Thunberg. Suppl. p. 16.*

CAL. *Perianthium* quinquefidum. *Lacinia* subrotundæ, brevissima.

COR. *Petala* quatuor, patentia, ovata, obtusa.

STAM. *Filamenta* quatuor, brevissima, basi germinis inserta. *Antheræ* ovatæ, fulcatæ,

PIST. *Germen* superum, ovatum. *Stylus* simplex, subulatus. *Stigma* acutum.

PER. *Drupa* exsucca, ovata, glabra, scabriuscula.

SEM. *Nux* disperma, subcarnosa.

282. MONETIA. *L'Hérit.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, ventricosum, quadridentatum: divifuris duabus profundioribus; *lacinii* lanceolatis, acutis, reflexis; persistens.

COR. *Petala* quatuor, linearia, acuta, recurva, calyce longiora.

STAM. *Filamenta* quatuor, erecta, receptaculo inserta, fere longitudine corollæ. *Antheræ* ovatæ, incumbentes.

PIST. *Germen* superum, subtetragonum desinens in *Stylum* crassiusculum, conicum, staminibus breviora. *Stigma* acutum.

PER. *Bacca*? exsucca, globosa, apiculata, calyce cincta, bilocularis?

SEM. solitaria, hinc plana, inde convexa.

OBS. *Flores* aliquando trifidi s. bifidi.

283. TRAPA. † *Tribuloides Tournef. 431.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, quadripartitum, acutum, persistens, basi germinis adnatum: *foliolis*, lateralibus & 2 ad angulos germinis.

COR. *Petala* quatuor, obovata, calyce majora.

STAM. *Filamenta* quatuor, longitudine calycis. *Antheræ* simplices.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* simplex, longitudine calycis. *Stigma* capitatum, emarginatum.

PER. nullum.

SEM. Nux ovato-oblonga, unilocularis, armata Spinis quatuor in medio latere oppositis, patentibus (quæ calycis folia fuere), acutis, crassis.

OBS. T. bicorni nuxes bicornes, oppositæ, recurva.

284 SERPICULA.

* Masculi flores solitarii, pedunculati.

CAL. Perianthium minimum, quadridentatum, erectum, acutum, persistens.

COR. Petala quatuor, oblonga, obtusa, sessilia.

STAM. Filamenta quatuor, brevissima. Antheræ oblongæ, longitudine petalorum.

* Feminei flores in eadem planta.

CAL. Perianthium superum, quadripartitum, minimum, persistens.

COR.

PIST. Germen inferum, ovatum, sulcatum. Stylus - - - Stigma - - -

PER. Nux cylindrica, exarata torulis octo cartilagineis, unilocularis, decidua.

SEM. unicum, oblongum.

285. AUCUBA. Thunb. diff. nov. gen. p. 61.

Flor. jap. p. 4.

CAL. Perianthium monophyllum, truncatum, obsolete quadridentatum, viride, brevissimum, persistens.

COR. tetrapetala. Petala ovata, acuta, patentia: subtus concava, viridia: supra convexa, purpurea, lineam longa, decidua.

* Masculus flos.

STAM. Filamenta quatuor, receptaculo inter petala inserta, crassa, erecta, brevissima, alba, basi purpurascens. Antheræ ovatæ, didymæ, quadrifurcatæ, purpurascens.

Receptaculum maris convexo-planum, viride, glabrum, foramine medio quadrato impresso.

* Flores feminei.

PIST. Germen inferum. Stylus unicus, crassus, brevis, stigma simplex, capitatum.

PER. *Bacca* ovata, pistillo persistente coronata, subcar-nosa, monosperma.

286. CISSUS.

CAL. *Involucrum* polyphyllum, minimum.

Perianthium monophyllum, planum, breve, obsoletum tetragonum.

COR. *Petala* quatuor, concava.

Nectarium margo cingens germen.

STAM. *Filamenta* quatuor, longitudine corollæ, nectario inserta. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* subrotundum, obtuso-tetragonum, retusum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* simplex, acutum.

PER. *Bacca* rotunda, nitens, umbilicata.

SEM. *Officulum* subrotundum.

OBS. *Bacca* monosperma, cincta calyce corollaque quadripartita. *Syst. Veg. p.*

287. CORNUS. * *Tournef. 410. Virga sanguinea Dill.*

CAL. *Involucrum* sæpius tetraphyllum, multiflorum: foliis ovatis, oppositis minoribus, coloratis, deciduis.

Perianthium minimum, quadridentatum, superum, deciduum.

COR. *Petala* quatuor, oblonga, acuta, plana, involucre minora.

STAM. *Filamenta* quatuor, subulata, erecta, corolla longiora. *Antheræ* subrotundæ, incumbentes.

PIST. *Germen* subrotundum, inferum. *Stylus* filiformis, longitudine corollæ. *Stigma* obtusum.

PER. *Drupa* subrotunda, umbilicata.

SEM. *Nux* cordata s. oblonga, bilocularis.

288. MONTINIA. *Suppl. p. 65.*

* *Mars.*

CAL. *Perianthium* superum, quadridentatum, brevissimum, erectum.

COR. *Petala* quatuor, ovata, obtusissima, patentia.

STAM. *Filamenta* quatuor.

Antheræ.

* *Femina* in distincto individuo.

CAL. ut in mare.

COR. ut in mare.

STAM. *Filamenta* absque *Antheris*.

PIST. *Germen* inferum, retusum. *Stylus* cylindricus, bifidus, corolla brevior. *Stigmata* reniformia.

PER. *Capsula* ovata, oblonga, bilocularis, longitudinaliter dehiscens.

SEM. plurima, imbricata, ovata, depressa, margine alata.

289. LUDWIGIA. *

CAL. *Perianthium* monophyllum, quadripartitum, superum, persistens : *laciniis* lanceolatis, patentissimis, longitudine corollæ.

COR. *Petala* quatuor, obcordata, plana, patentissima, æqualia.

STAM. *Filamenta* quatuor, subulata, erecta, brevia. *Antheræ* simplices, oblongæ, erectæ.

PIST. *Germen* tetragonum, calycis basi vestitum, inferum. *Stylus* cylindræus, longitudine staminum. *Stigma* obsolete tetragonum, capitatum.

PER. *Capsula* tetragona, obtusa, calyce vestita, eoque coronata, quadrilocularis, apice dehiscens foraminulo integro.

SEM. numerosa, parva.

290. SANTALUM. *

CAL. *Perianthium*: Margo superus, quadridentatus.

COR. *Petala* quatuor, calycis laciniis insidentia, rectiora. *Glandulæ* quatuor, petalis minores, alternantes.

STAM. *Filamenta* quatuor, tubo calycis innata. *Antheræ* simplices.

PIST. *Germen* inferum. *Stylus* longitudine staminum. *Stigma* simplex.

PER. *Bacca*.

SEM. unicum.

291. STRUTHIOLA.

CAL. nullus, nisi corollam velis.

COR. monopetala, marcescens. *Tubus* filiformis, elongatus. *Limbus* quadripartitus, planus, tubo brevior: *Laciniis* ovatis.

Nectarium Glandulæ octo, ovatæ, fauci circumpositæ, penicillo proprio cinctæ.

STAM. *Filamenta* quatuor, brevissima, intra tubum occultata. *Antheræ* lineares.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, longitudine tubi. *Stigma* capitatum.

PER. coriaceum, ovatum, uniloculare.

SEM. unicum, acutiusculum.

OBS. Affinis *Passerinae*.

292. KRAMERIA. *Læst. it.* 195.

CAL. nullus, nisi corollam dicas.

COR. *Petala* quatuor, aequalia, patentia, oblonga, acuta: supremo patentiore; lateralibus ovatis.

Nectaria duo: *superius* superum, erectum, lineare, tripartitum: laciniis linearibus, crassiusculis, apice ovatis, membranaceis. *Inferius* inferum, diphyllum: foliolis linearibus, convexis, elevatis, rugosis.

STAM. *Filamenta* quatuor, intra nectarium, ascendentia. *Antheræ* parvæ, apice foraminibus duobus.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* subulatus, ascendens, staminum longitudine. *Stigma* acutum.

PER. *Bacca* sicca, globosa, unilocularis, echinata undique pilis rigidis retrorsum spectantibus.

SEM. unicum, ovatum, giabrum, durum.

293. RIVINA. * *Riviua Plum.* 39. *Solanoi-des Tournef. A. G.* 1706. *Piercea Mill.*

CAL. *Perianthium* tetraphyllum, coloratum, persistens: foliolis oblongo-ovatis, obtusis.

COR. nulla, nisi Calycem sumas.

STAM. *Filamenta* quatuor s. octo, calyce breviora, per paria proxima, persistens. *Antheræ* parvæ.

PIST. *Germen* magnum, subrotundum. *Stylus* brevissimus. *Stigma* simplex, obtusum.

PER.

PER. *Bacca* globosa, calyci viridi reflexo insidens, unilocularis, acumine incurvo.

SEM. unicum, subrotundum, lentiforme, scabrum.

OBS. R. octandra flaminibus cæto gaudet.

294. TROPHIS. † *Brown. Bucephalon Gen. pl. ed. VI. p. 575.*

* *Mas.*

CAL. nullus.

COR. *Petala* quatuor, obtusa, patentia.

STAM. *Filamenta* quatuor, capillaria, corolla longiora.

* *Femina* in distincta planta.

CAL. monophyllus, minimus, arcte germen vestiens.

COR. nulla.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, bipartitus. *Stigmata* adnata.

PER. *Bacca* substriata, rugosa, unilocularis.

SEM. unicum, subglobosum.

OBS. *Flos* femineus nullo calyce gaudet. *S. V. p. 882.*

295. EMBOTHRIMUM. *Suppl. p. 16. Forst. charact. gen. n. 8.*

CAL. nullus.

COR. tetrapetala, tubulosa, post fecundationem revoluta. *Petala* linearia, obliqua: apice latiore, staminifero.

STAM. *Antheræ* quatuor, sessiles s. brevissimis filamentis insidentes, apici petalorum insertæ, majusculæ.

PIST. *Germen* lineare, ascendens, inflexum. *Stylus* nullus. *Stigma* subrotundum, magnum, antice planum.

PER. *Folliculus* teres, unilocularis.

SEM. plurima, ovata, compressa, margine altero membrana alata.

296. NIGRINA. *Thunb. diff. nov. gen. p. 57. Flor. jap. p. 5.*

CAL. nullus, nisi bractea monophylla.

COR. tetrapetala.

STAM. *Filamenta* quatuor, brevissima. *Anthera* globosa, alba.

PIST. *Germen* superum. *Stylus* unicus. *Stigma*. - -

PER. *Fructus* ignotus, forsan *Capsula*?

297. HIPPOPHAE. * *Rhamnoides* Tournef. 481.

* *Mas.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, bipartitum, bivalve, fundo integro: *laciniis* subrotundis, obtusis, concavis, erectis, apicibus conniventibus; lateribus dehiscentibus.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quatuor, brevissima. *Anthera* oblonga, angulata, longitudine fere calycis.

* *Femina.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, ovato-oblongum, tubulatum, clavatum, ore bifido, deciduum.

COR. nulla.

PIST. *Germen* subrotundum, parvum. *Stylus* simplex, brevissimus. *Stigma* crassiusculum, oblongum, erectum, clyce duplo longius.

PER. *Bacca* globosa, unilocularis.

SEM. unicum, subrotundum.

Obs. Saepe in femina unus alterve flos masculus observatur.

298. SALVADORA. † *Gareiu*. A. Angl.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quadrifidum, lobis revolutis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quatuor, longitudine calycis, reflexa. *Anthera* rotunda.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* unicus, brevis. *Stigma* simplex, obtusum, umbilicatum.

PER. *Bacca* globosa, unilocularis.

SEM. unicum, sphaericum, Arillo calloso vestitum.

299. CAMPHOROSMA. † *Camphorata*. Tournef. 1705. Autore Cl. de Sauvages.

CAL. *Perianthium* urceolatum, semiquadrifidum, com-

pressum, persistens; segmentis acutis: oppositis majusculis, recurvatis.

COR. nulla.

STAM. Filamenta quatuor, filiformia, æqualia. *Anthere* ovales.

PIST. *Germen* ovatum, compressum. *Stylus* filiformis, semibifidus, calyce longior. *Stigmata* acuta.

PER. *Capsula* unilocularis, superne dehiscens; calyce tecta.

SEM. unicum, ovale, compressum, nitidum.

OBS. Cal 4phyllus: foliolis 2 majoribus carinatis: 2 minoribus planis. Stam. 4, calyce breviora. Styli 2; calyce longiores. Zinn.

Stamina 5, flore longiora. Calyx 5 - dentatus. Pollich. fl. palat. T. I. p. 166,

C. paleaceæ calyces tetraphylli & petala quatuor. An hujus generis?

300. PARIETARIA. * Tournef. 289.

* *Hermaphroditi* flores duo continentur *Involucro* pleno; hexaphyllo: foliolis duobus oppositis & exterioribus majoribus.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quadrifidum, planum; obtusum, magnitudine involucri dimidiati.

COR. nulla: nisi Calycem dicas.

STAM. Filamenta quatuor, subulata, perianthio florente longiora, illudque expandentia, persistentia. *Anthera* didymæ.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, coloratus. *Stigma* penicilliforme, capitatum.

PER. nullum. *Perianthium* elongatum, majus, campanulatum, ore laciniis conniventibus clauso.

SEM. unicum, ovatum.

* *Femineus* flos unus inter hermaphroditos ambos; intra involucrum.

CAL. ut hermaphroditi.

COR. nulla.

PIST. ut hermaphroditi.

PER. nullum. *Perianthium* tenue, involvens fructum.

SEM. ut in hermaphrodito.

301. NEPENTHES. †

CAL. *Perianthium* quadripartitum : *laciniis* subrotundis, persistentibus.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* vix ulla. *Antheræ* quatuor, apici *styli* adnatæ.

PIST. *Germen* tenuissimum. *Stylus* subulatus, longitudine calycis. *Stigma* obtusiusculum.

PER. *Capsula* oblonga, columnaris, truncata, obsoletè quadrangularis, quadrilocularis, quadrivalvis, longitudinaliter dehiscens.

SEM. numerosa, acerosa, acuminata, capsula breviora.

OES. *Pistillum* obscure vidi : an in distinctis floribus ?

302. BOEHMERIA. Swartz prodr.

* Mas.

CAL. quadripartitus.

COR. nulla.

Femina.

CAL. nullus, sed squamæ confertæ, inter quas singulas :

PIST. *Germen* obovatum. *Stylus* unicus.

SEM. unicum, compressum.

303. URTICA. * Tournef. 308.

* Masculi flores.

CAL. *Perianthium* tetraphyllum : *foliolis* subrotundis, concavis, obtusis.

COR. *Petala* nulla.

Nectarium in centro floris, cyathiforme, integrum, inferne angustius, minimum.

STAM. *Filamenta* quatuor, subulata, longitudine calycis, patentia, intra singulum folium calycinum singula. *Antheræ* biloculares.

* *Feminei flores* vel in eadem, vel in distincta planta.

CAL. *Perianthium* bivalve, ovatum, concavum, erectum, persistens.

COR. nulla.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* nullus. *Stigma* villosum.

PER. nullum. *Calyx* connivens.

SEM. unicum, ovatum, obtuso-compressum, nitidum.

Obs. U. alienata a congeneribus nonnihil differt. *Syst. Veg.*
p. 849.

304. EMPLEURUM. *Ait. Kew.*

* *Masc. flor.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum, quadridentatum, persistens.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quatuor, subulata, calyce longiora, patula. *Anthera* oblonga, subtetragonæ, retusæ.

* *Fem. flor. in eadem planta.*

CAL. ut in mare.

COR. nulla.

PIST. *Germen* superum, oblongum, compressum, terminatum processu foliaceo, erecto. *Stylus* nullus. *Stigma* denticulo lateri germinis impositum, cylindraceum, deciduum.

PER. *Capsula* oblonga, compressa, processu foliaceo coronata, unilocularis, secundum marginem rectiorem dehiscens.

SEM. solitarium, oblongum, arillatum: *arillo* subcoriaceo, bivalvi.

OBS. Rarissime duæ capsulæ ex uno eodemque calyce.

305. ALCHEMILLA. * *Alchimilla Tour. 289.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, persistens: *ore* plano, octo-partito: *laciniis* alternis minoribus.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quatuor, erecta, subulata, minima, ori calycis imposita. *Anthera* subrotundæ.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum, ad basin germinis insertum. *Stigma* globosum.

PER. nullum. *Calycis* collum clauditur, nec dehiscit.

SEM. solitarium, ellipticum, compressum.

306. DORSTENIA. † *Plum. 3, Houst. A. A.*

421. t. 1. 2.

CAL. *Receptaculum* commune monophyllum, planum, angulatum, maximum, tectum receptaculo, flosculis numerosissimis, discum inhabitantibus, minimis.

Perianthium proprium quadrangulare, concavum, receptaculo immersum, cumque eo coalitum.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quatuor, filiformia, brevissima. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* simplex. *Stigma* obtusum.

PER. nullum. *Receptaculum* commune carnosum factum.

SEM. solitaria, subrotunda, acuminata.

OBS. Qui plantam vivam vident florentemque, inquirent, num alii flosculi feminei sint hermaphroditis mixti, ut in *Parietaria*. *Dioscorea* enim inter *Ficum* & *Parietariam* media & quasi *figus* expansa.

307. COMETES.

CAL. *Involucrum* triflorum (floribus sessilibus), tetraphyllum: *Foliolis* oblongis, æqualibus, patulis, ciliato-hispidis.

Perianthium tetraphyllum: *foliolis* oblongis, æqualibus, longitudine involucri.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quatuor, capillaria, longitudine perianthii. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis, longitudine floris. *Stigma* trifidum.

PER. *Capsula* tricocca.

SEM. solitaria.

OBS. Affinitas *Dalechampia*.

308. BATIS. † *Brown. Jacq. amer.* 260.

* *Ms.*

CAL. *Amentum* pyramidatum, squamis unifloris, quadrifariam imbricatis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quatuor, erecta, squamis amenti longiora. *Antheræ* oblongæ, didymæ, incumbentes.

* *Femina* in distincta planta.

CAL. *Amentum* commune carnosum, continens flosculos aliquot conglobatos in corpus ovatum, quadrangulare: involucrio diphyllæ.

COR. nulla.

- PIST.** *Germen* quadrangulare, amento adnatum. *Stylus* nullus. *Stigma* bilobum, obtusum, villosum.
PER. *Bacca* connata cum reliquis, unilocularis.
SEM. quatuor, triangularia, acuminata.

309. SIRIUM. †

- CAL.** *Perianthium* campanulatum, semiquadrifidum, coloratum: *laciniis* ovatis, patentibus, persistentibus.
COR. nulla.
Nectarium tetraphyllum, faucem calycis coronans, erectum, brevius: squamis subrotundis, crassiusculis, alternantibus cum calyce.
STAM. *Filamenta* quatuor, filiformia, faucis inserta, calyci alterna, basi deorsum pilis ramentacea. *Anthera* oblongiusculæ, longitudine nectarii.
PIST. *Germen* semi-inferum, conicum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* trifidum.
PER. *Bacca* obovata, coronata, trilocularis.
SEM.

310. ACÆNA. D. Mutis.

- CAL.** *Perianthium* tetraphyllum: foliolis ovatis, concavis, æqualibus, persistentibus.
COR. nulla: (*nisi Calycem dicas*).
STAM. *Filamenta* quatuor, æqualia, mediocria, calyci opposita. *Anthera* quadrangulares, didymæ, erectæ.
PIST. *Germen* inferum, obovatum, hispidum. *Stylus* minimus, hinc inflexus. *Stigmata* membranula multifida, crassiuscula, colorata.
PER. *Bacca* sicca, obovata, echinata spinis retrorsis, unilocularis.
SEM. unicum.
OBS. Si Bracteas 2 sub germine pro calyce assumes, erit *Calyx* hujus corollæ.

311. VISCUM. * Tournef. 380.

- * *Mas.*
CAL. *Perianthium* quadripartitum: foliolis ovatis, æqualibus.
COR. nulla.

STAM. quatuor. *Filamenta* nulla. *Antheræ* oblongæ, acuminatæ, singulæ singulo folio calycino adnatæ.

* *Femina* mari sæpius opposita.

CAL. *Perianthium* tetraphyllum: *sepalis* ovatis, parvis, sessilibus, deciduis, germiui infidentibus.

COR. nulla.

PIST. *Germen* oblongum, trigonum, margine obsoleto quadrifido coronatum, inferum. *Stylus* nullus. *Stigma* obtusum, vix emarginatum.

PER. *Bacca* globosa, unilocularis, lævis.

SEM. unicum, cordatum, compressum, obtusum, carnosum.

312. ISNARDIA. † *Dantia* Petit. gen. 49.

CAL. *Perianthium* campanulatum, semiquadrifidum: *laciniis* acutis, patentibus.

COR. nulla: nisi calycem dicas.

STAM. *Filamenta* quatuor, e medio calycis enata. *Antheræ* simplices.

PIST. *Germen* subinferum. *Stylus* simplex, staminibus longior. *Stigma* crassiusculum.

PER. *Basis* calycis quadrata, quadrilocularis.

SEM. pauca, oblonga.

313. ELÆAGNUS. * *Tournef.* 489.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quadrifidum, superum, rectum, campanulatum, externe scabrum, interne coloratum, deciduum.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quatuor, brevissima, infra divisuras calyci inserta. *Antheræ* oblongæ, incumbentes.

PIST. *Germen* subrotundum, inferum. *Stylus* simplex, calyce paulo brevior. *Stigma* simplex.

PER. *Drupa* ovata, obtusa, glabra, apice punctato.

SEM. *Nux* oblonga, obtusa.

314. GONOCARPUS. *Thunb. diff. nov. gen.* *p.* 55. *Flor. jap. p.* 5.

CAL. nullus.

COR. quadrifida, persistens.

STAM. *Filamenta* quatuor, corollæ inserta.

PIST. *Germen inferum. Stylus unicus. Stigma — —*
 PER. *Drupa infera, subglobosa, corolla persistente coronata, octogona, glabra, unilocularis, monosperma, magnitudine arenulæ.*

II. DIGYNIA.

315. BUFONIA. * *Sauvages. Alsinoides Rafi.*

CAL. *Perianthium tetraphyllum, erectum, persistens; foliolis subulatis, carinatis marginibus membranaceis.*
 COR. *Petala quatuor, ovalia, emarginata, erecta, æqualia, calyce breviora.*
 STAM. *Filamenta quatuor, æqualia, longitudine germinis. Antheræ didymæ.*
 PIST. *Germen ovatum, compressum. Styli duo, longitudine staminum. Stigmata simplicia.*
 PER. *Capsula ovalis, compressa, unilocularis, bivalvis.*
 SEM. *duo, ovalia, compressa cum torula, hinc convexa.*
 OBS. *Stamina 4 observavit, sed dein ipse retraxit P. Læsing; semper vero stamina 4 attente vidit Alstræmer; aliquando 2, raro 3, sæpe 4 Gerard.*

316. HYPECOUM. * *Tournef. 115.*

CAL. *Perianthium diphyllum, parvum: foliolis ovatis, acutis, erectis, oppositis, deciduis.*
 COR. *tetrapetala. Petala duo exteriora opposita latiora, trifida, obtusa: P. duo interiora cum exterioribus alterna, semitrifida: lacinia media concava, compressa, erecta.*
 STAM. *Filamenta quatuor, subulata, erecta, a lacinia media petalorum intimorum tecta. Antheræ erectæ, oblongæ.*
 PIST. *Germen oblongum, cylindraceum. Styli duo, brevissimi. Stigmata acuta.*
 PER. *Siliqua longa, incurva, articulata.*
 SEM. *solitaria in singulo articulo pericarpium, globoso-compressa.*
 OBS. *H. erecti stamina videntur tetradynamæ.*

317. NERTERA. Banks. Gærtn. 26.

CAL. nullus.

COR. monopetala, infundibuliformis, supera; limbo quadrifido.

STAM. Filamenta quatuor.

PIST. Germen subrotundum, inferum. Stylus duo.

PER. Bacca globosa, apice cicatricula notata, bilocularis.

SEM. solitaria, hinc plana, inde convexa.

318. HAMAMELIS. † Trilopus. Mitch. 22.

CAL. Involucrum triphyllum, triflorum: foliolis duobus interioribus subrotundis, minoribus, obtusis; tertio extimo, majori, lanceolato.

Perianthium duplex: exterius diphyllum, minus, subrotundum; interius tetraphyllum, erectum: foliolis oblongis, obtusis, æqualibus.

COR. Petala quatuor, linearia, æqualia, longissima, obtusa, reflexa.

Nectarium foliolis 4, truncatis, corollæ adnatis.

STAM. Filamenta quatuor, linearia, calyce breviora. Anthera bicornes, inflexæ.

PIST. Germen ovatum, villosum, desinens in Stylus duos, longitudine staminum. Stigmata capitata.

PER. nullum.

SEM. Nux ovata, calyce semitecta, obtusa, apice utrinque sulcata, bicornis corniculis horizontalibus, bilocularis, bivalvis.

OBS. Ad Polygamiam certo spectat. Virginica dioica floribus petaloideis. Carolina monoica floribus polyandris, apetalis. Utrum distinctæ species? Herba similissima.

319 SCHÆFFERIA. Jacq. amer. 259. Swartz. prodr.

* Mas.

CAL. Perianthium tetra- vel quinquephyllum: foliolis subrotundis, concavis, emarginatis parvis.

COR. vel nulla, vel quadripetala. Petalis obovatis, concavis, obtusis, patentissimis.

STAM. Filamenta quatuor, subulata, erecta, petalis par-

lo breviora, germinis lateri ad basin imposita. *Antheræ* subrotundæ, compressæ, erectæ.

PIST. *Germen* subrotundum, parvum, emarginatum in duos apices exiguos desinens, *stylus* nullus. *Stigma* nullum.

PER. *abortans*.

* *Femina* in diversa planta.

CAL. quadri- vel quinque partitus.

COR. ut in mare.

PIST. *Germen* ovatum, corolla paulo brevius. *Styli* duo, subulati, breves, inflexi. *Stigmata* simplicia.

PER. *Bacca* subglobosa, acumine brevi, abrupto, uni- vel bilocularis.

SEM. duo solitaria, rugosa, hinc convexa, illinc plana, paucissima pulpa distincta.

320. CUSCUTA. * *Tournef.* 422. *Schrebera.*
Linn.

CAL. *Perianthium* monophyllum. cyathiforme, quadrisfidum, obtusum, basi carnosum.

COR. monopetala, ovata, calyce paulo longior: ore quadrisfido, obtuso.

Nectarium e squamis quatuor, linearibus, bifidis, acutis, ad basin staminum corollæ adnatis.

STAM. *Filamenta* quatuor, subulata, longitudine calycis, *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* subrotundum. *Styli* duo, erecti, breves. *Stigmata* simplicia.

PER. cornosum, subrotundum, biloculare, circumscissum.

SEM. bina.

OBS. In quibusdam $\frac{2}{3}$ pars additur fructificationis partibus.

321. GOMOZIA. *Suppl.* p. 17. *Mutis. gen.*

CAL. nullus.

COR. supera, monopetala. *Tubus* brevissimus, filiformis, gracilis. *Limbus* campanulatus, ad medium quadrisfidus. *Lacinie* lanceolatæ, recurvatæ.

STAM. *Filamenta* quatuor, æqualia, basi corollæ inserta, filiformia. *Antheræ* globosæ, angulatæ.

PIST. *Germen* inferum; oblongum, teres, magnitudine corollæ. *Styli* duo, filiformes, basi subconnati, glabri.

Stigmata oblonga, simplicia, attenuata, divaricata, villosa.

PER. *Bacca* bilocularis, figura germinis.

SEM. plurima.

322. GALOPINA. *Thunb. diff. nov. gen. p. 3.*

CAL. nullus.

COROL. quadrifida, supera, revoluta, fusco-virescens.

STAM. *Filamenta* quatuor, capillaria, decidua, longa, receptaculo inserta.

PIST. *Germen* inferum. *Styli* duo, filamentis paullo breviores, excrecentes, albi. *Stigmata* simplicia.

PER. nullum.

SEM. bina, nuda, subglobosa, muricata.

OBS. *Differt a Galio calyce nullo & Stylis duobus: ab Aphane filamentis receptaculo insertis atque corolla supera.*

323. APHANES. * *Percepier. Dill. gen. 3.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, persistens: ore plano, quadrifido; *laciniis* alternis minimis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quatuor, erecta, subulata, minima, ori calycis imposita. *Anthera* subrotundæ.

PIST. *Germina* duo ovata *Styli* filiformes, longitudine staminum, germinibus ad basin inserti. *Stigmata* capitata.

PER. nullum. *Calyx* in fundo semina continens, ore connivens.

SEM. duo, ovata, acuminata, compressa, longitudine styli.

OBS. *Ad Alchemillam proxime accedit.*

Variat pistillo, & semine uniso.

324. ANTHOSPERMUM. * *Tournefortia Pont. epist. II.*

* *Mas.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, conicum, ultra medium quadrifidum: *laciniis* ovato-oblongis, revolutis, obtusis, parum coloratis.

COR. nulla: nisi Calycem dicas.

STAM. *Filamenta* quatuor, capillaria, erecta, longita-

dine calycis, receptaculo inserta. *Antherae* didymæ, oblongæ, tetragonæ, obtusæ, erectæ.

* *Androgyna* constans masculis & femineis floribus.

* *Masculi Flores* uti in mare descripto.

* *Feminei flores*.

CAL. ut in mare.

COR. ut in mare.

PIST. *Germen* inferum, ovatum, tetragonum. *Syli*, due, recurvi. *Stigmata* simplicia.

PER. - - -

SEM. - - -

OBS. *Fructum feminei floris non vidi.*

Charactere Cl. *Pontederæ* inseram.

Flos monopetalus, infundibuliformis, calyci insidens ore leviter inciso.

Calyx abit in FRUCTUM subrotundum, angulosum, foetum SEMINIBUS octo, oblongis, & binis connexis. An Autor Calycem pro fructu & Antheras pro seminibus habuerit, vel an verum fructum viderit, determinent autoptæ.

* OBS. *Dioicum absque hermaphrodito esse hoc genus Thunb. Suppl. p. 440.*

325. CRUZITA. *Loefl.*

CAL. *Peranthium* triphyllum: folio anteriore lineari, acuto, lateralibus ovatis, concavis; persistens.

COR. *Petala* quatuor, calycis facie, ovata, concava, exterioribus duobus integerrimis; interioribus margine tenuissimo, lacero.

STAM. *Filamenta* quatuor, capillaria, calyce paulo breviora. *Antherae* parvæ.

PIST. *Germen* ovatum, obtusum, compressum. *Stylus* brevissimus, bipartitus laciniis patentibus. *Stigmata* simplicia.

PER. nullum. *Corolla* connivens, decidua cum semine.

SEM. unicum, nudum.

OBS. *Corollam nunc calycem anteriorem tetraphyllum, & Peranthium calycem posteriorem triphyllum dicit Autor; ergo corolla nulla. Syst. Veg. p. 167.*

326. MORUS. * *Tournef.* 362.

* *Masculi flores* in Amenta digesti.

CAL. *Perianthium* quadripartitum: *foliis* ovatis, concavis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quatuor, subulata, erecta, calyce longiora, intra singulum folium calycinum singula; *Anthera* simplices.

* *Feminei Flores* congesti vel in eadem, vel diversa planta a masculis.

CAL. *Perianthium* tetraphyllum: *foliis* subrotundis, obtusis, persistentibus, oppositis duobus exterioribus incumbens.

COR. nulla.

PIST. *Germen* cordatum. *Styli* duo, subulati; longi, reflexi, serabri. *Stigmata* simplicia.

PER. nullum. *Calyx* maximus, carnosus, succulentus factus *Bacca*.

SEM. unicum, ovatum, acutum.

OBS. *Dantur* ♂ *Mares* & *Feminæ* in *diœciâ*.

327. MYRICA. Gale Tournef. A. G. 1706. t. 3. Dill, gen. 10.

* *Mas.*

CAL. *Amentum* ovato-oblongum, undique imbricatum, laxum, constans.

Squamis unifloris, lunatis, obtuse acuminatis, concavis.

Perianthium proprium nullum.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quatuor (raro sex), filiformia, breviora, erecta. *Anthera* magnæ, didymæ, lobis bifidis.

* *Femina.*

CAL. ut in mare.

COR. nulla.

PIST. *Germen* subovatum. *Styli* duo, filiformes, calyce longiores. *Stigmata* simplicia.

PER. *Bacca* unilocularis.

SEM. unicum.

OBS. *Est* huius *Generis* cum *Pistacia* summa *affinitas*.

M. Gale *Stamina* quatuor. *Bacca* sicca seu crusta coriacea, apice compressa, triloba.

M. cerifera J. B. *Stamina* sæpius sex. *Fructus* *Bacca* succulenta, globosa.

328. BETULA. * *Tournef.* 350. *Alnus Tournef.* 359.

* *Masculi Flores* in Amenta cylindracea digesti.

CAL. *Amentum commune*, undique imbricatum, laxum, cylindraceum: constans squamis trifloris, quibus singulis squamulae duae, minutissimae, ad latera positae.

COR. *Composita* flosculis tribus, aequalibus, disco squamulae singulae calycinae affiis.

Propria monopetala, quadripartita, patens, minima: laciniis ovato-obtusis.

STAM. *Filamenta* (Corollulae), quatuor, minima. *Antherae* didymae.

Feminei Flores in Amenta eiusdem plantae.

CAL. *Amentum commune* imbricatum: squamis tribus, ubique oppositis, rachi affixis, bifloris, cordatis cum acumine, a mucrone versus apicem sinu parum dissectis, concavis, brevibus.

COR. nulla manifesta.

PIST. *Germen proprium* ovatum, minimum. *Styli* duo, fetacei, longitudine squamulae calycinae. *Stigmata* simplicia.

PER. nullum. *Amentum* sub singula squama duorum flosculorum femina fovens.

SEM. solitaria ovata.

Betula T. Fructus in Amentum cylindricum digesti.

Alnus T. Fructus in Strobilum subrotundum digesti.

III. TRIGYNIA.

329. BUXUS. * *Tournef.* 345.

* *Masculi Flores* ex gemmis plantae prominentes.

CAL. *Perianthium* triphyllum: foliolis subrotundis, obtusis, concavis, patentibus.

COR. *Petala* duo, subrotunda, concava, simillima calyci, at maiora.

STAM. *Filamenta* quatuor, subulata, erecto-patentia, calyce fere maiora. *Antherae* erectae, didymae.

PIST. *Germinis* rudimentum absque stylo vel stigmate.

* *Feminei* in eadem gemma cum masculis.

CAL. *Perianthium* tetraphyllum: foliolis subrotundis, obtusis, concavis, patentibus.

144 TETRANDRIA TETRAGYNIA.

COR. *Petala* tria, subrotunda, concava, simillima calyci, calyce maiora.

PIST. *Germe*n subrotundum, obtuse trigonum, desineus in *Stylos* tres, brevissimos, persistentes. *Stigmata* obtusa, hispida.

PER. *Capfula* subrotunda, trirostris, trilocularis, trifariam elastice dehiscens.

SEM. gemina, oblonga, hinc rotundata, inde plana.

IV. TETRAGYNIA.

330. ILEX. * *Aquifolium* Tournef. 371.

CAL. *Perianthium* quadridentatum, minimum, persistens.

COR. monopetala, quadripartita, rotata: *laciniis* subrotundis concavis, patentibus, majusculis, unguibus cohærentibus.

STAM. *Filamenta* quatuor, subulata, corolla breviora. *Anthera* parva.

PIST. *Germe*n subrotundum. *Stylus* nullus. *Stigmata* 4-obtusa.

PER. *Bacca* subrotunda, quadrilocularis.

SEM. solitaria, ossea, oblonga, obtusa, hinc gibba, inde angulata.

331. COLDENIA.

CAL. *Perianthium* tetraphyllum: *foliolis* lanceolatis; erectis, longitudine corollæ.

COR. monopetala, infundibuliformis: *Limbo* patulo, obtuso.

STAM. *Filamenta* quatuor, tubo inserta. *Anthera* subrotundæ.

PIST. *Germina* quatuor, ovata. *Styli* totidem, capillares, longitudine staminum. *Stigmata* simplicia, persistentia.

PER. nullum. *Fructus* ovatus, compressus, scaber, acuminatus, terminatus rostris quatuor.

SEM. duo, muricata, bilocularia.

332. SAGINA. * *Alfinella* Dill. gen. 6.

CAL. *Perianthium* tetraphyllum: *foliolis* ovatis, concavis, patentissimis, persistentibus.

COR.

COR. *Petala* quatuor, ovata, obtusa, calyce breviora, patentia.

STAM. *Filamenta* quatuor, capillaria. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germe* subglobosum. *Styli* quatuor, subulati, recurvi, pubescentes. *Stigmata* simplicia.

PER. *Capsula* ovata, recta, quadrilocularis, quadrivalvis.

SEM. numerosa, minima, receptaculo affixa.

OBS. *S. procumbens variat floribus corollatis & apetalis.*
S. apetala absque petalis est.

333. TILLÆA. * Mich. 20.

CAL. *Perianthium* tri-5. quadripartitum, planum: laciniis ovatis, magnis.

COR. *Petala* tria-5. quatuor, ovata, acuta, plana, calyce ferè minora.

STAM. *Filamenta* quatuor, simplicia, corolla breviora. *Antheræ* parvæ.

PIST. *Germina* quatuor. *Styli* simplices. *Stigmata* obtusa.

PER. *Capsulæ* tres-5. quatuor, oblongæ, acuminatæ, reflexæ, longitudine floris, longitudinaliter sursum dehiscences.

SEM. bina, ovata.

OBS. *T. muscosa Fructificationis partes ternæ.*

OBS. *Dempto partium numero Tillæa omnes notas characterificas. Crassulæ possidet. Dahl. l. c.*

334. CICCÀ.

* *Masculi flores sparsi.*

CAL. *Perianthium* tetraphyllum: foliolis subrotundis, concavis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quatuor, setacea. *Antheræ* subglobosæ, longitudine calycis.

* *Feminei flores sparsi in eadem planta.*

CAL. ut in Masculis.

COR. nulla.

PIST. *Germe* subrotundum. *Styli* quatuor, bipartiti, subulati, longitudine germinis. *Stigmata* acuta, persistentia.

PER. *Capsula* subglobosa, tetracocca, elastica.

SEM. solitaria.

OBS. *Affinitas Phyllanthi.*

Calycem feminae triphyllum definit Syst. veget. p. 848.

335. POTAMOGETON. * *Tournef. 103.*

CAL. nullus.

COR. *Petala* quatuor, subrotunda, obtusa, concava, erecta, unguiculata, decidua.

STAM. *Filamenta* quatuor, plana, obtusa, brevissima. *Anthera* didyma, breves.

PIST. *Germina* quatuor, ovato-acuminata. *Stylus* nullus. *Stigmata* obtusa.

PER. nullum.

SEM. quatuor, subrotunda, acuminata, hinc gibba, inde compressa, angulataque.

336. RUPPIA. * *Bucca ferrea. Mich. 35.*

CAL. *Spatha* præter vaginas foliorum vix ulla.

Spadix subulatus, simplicissimus, rectus, maturescente fructu incurvatus, fructificationibus distiche obvalvatus.

Perianthium nullum.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* nulla. *Anthera* quatuor, sessiles, æquales, subrotunda, subdidyma.

PIST. *Germina* 4. s. 5, subovata, conniventia. *Stylus* nullus. *Stigmata* obtusa.

PER. nullum. *Semina* insident pedicellis propriis filiformibus, longitudine fructus.

SEM. 4. s. 5. ovata, obliqua, terminata Stigmate plano, orbiculato.

Classis V.

PENTANDRIA

I. MONOGYNIA.

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 337. <i>Mirabilis.</i> | 366. <i>Aretia.</i> |
| 338. <i>Weigela.</i> | 367. <i>Hottonia.</i> |
| 339. <i>Plumbago.</i> | 368. <i>Bacopa.</i> |
| 340. <i>Cerithe.</i> | 369. <i>Menyanthes.</i> |
| 341. <i>Messerschmidia.</i> | 370. <i>Doraena.</i> |
| 342. <i>Echium.</i> | 371. <i>Allamanda.</i> |
| 343. <i>Heliotropium.</i> | 372. <i>Theophrasta.</i> |
| 344. <i>Pulmonaria.</i> | 373. <i>Scheffieldia.</i> |
| 345. <i>Lithospermum.</i> | 374. <i>Pisonia.</i> |
| 346. <i>Onosma.</i> | 375. <i>Retzia.</i> |
| 347. <i>Symphytum.</i> | 376. <i>Spigelia.</i> |
| 348. <i>Borago.</i> | 377. <i>Ophiorhiza.</i> |
| 349. <i>Lycopsis.</i> | 378. <i>Porana.</i> |
| 350. <i>Asperugo.</i> | 379. <i>Convolvulus.</i> |
| 351. <i>Cynoglossum.</i> | 380. <i>Lisianthus.</i> |
| 352. <i>Anchusa.</i> | 381. <i>Patagonula.</i> |
| 353. <i>Myosotis.</i> | 382. <i>Datura.</i> |
| 354. <i>Nolana.</i> | 383. <i>Hyoscyamus.</i> |
| 355. <i>Coris.</i> | 384. <i>Nicotiana.</i> |
| 356. <i>Hydrophyllum.</i> | 385. <i>Verbascum.</i> |
| 357. <i>Galax.</i> | 386. <i>Chironia.</i> |
| 358. <i>Cortusa.</i> | 387. <i>Genoistoma.</i> |
| 359. <i>Anagallis.</i> | 388. <i>Diapensia.</i> |
| 360. <i>Lyfimachia.</i> | 389. <i>Phlox.</i> |
| 361. <i>Cyclamen.</i> | 390. <i>Polemonium.</i> |
| 362. <i>Dodecatheon.</i> | 391. <i>Ipomoea.</i> |
| 363. <i>Soldanella.</i> | 392. <i>Brossæa.</i> |
| 364. <i>Primula.</i> | 393. <i>Azalea.</i> |
| 365. <i>Androsace.</i> | 394. <i>Epacris.</i> |

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 395. <i>Ceropegia.</i> | 429. <i>Ellisia.</i> |
| 396. <i>Nerium.</i> | 430. <i>Lycium.</i> |
| 397. <i>Echites.</i> | 431. <i>Cryptostomum.</i> |
| 398. <i>Plumeria.</i> | 432. <i>Ophioxylum.</i> |
| 399. <i>Cameraria.</i> | 433. <i>Menais.</i> |
| 400. <i>Tabernæmontana.</i> | 434. <i>Sideroxylon.</i> |
| 401. <i>Vnca.</i> | 435. <i>Chrysophyllum.</i> |
| 402. <i>Ignatia.</i> | 436. <i>Ardisia.</i> |
| 403. <i>Carissa.</i> | 437. <i>Ambrosia.</i> |
| 404. <i>Jacquinia.</i> | 438. <i>Leea.</i> |
| 405. <i>Xyris.</i> | 439. <i>Samolus.</i> |
| 406. <i>Bassovia.</i> | 440. <i>Bellonia.</i> |
| 407. <i>Laugeria.</i> | 441. <i>Viresta.</i> |
| 408. <i>Pœderia.</i> | 442. <i>Macrocnemum.</i> |
| 409. <i>Varronia.</i> | 443. <i>Dentella.</i> |
| 410. <i>Cordia.</i> | 444. <i>Uncaria.</i> |
| 411. <i>Fhretia.</i> | 445. <i>Rondeletia.</i> |
| 412. <i>Tournefortia.</i> | 446. <i>Chimarrhis.</i> |
| 413. <i>Gynopogon.</i> | 447. <i>Cinchona.</i> |
| 414. <i>Rauwolfia.</i> | 448. <i>Cyrtanthus.</i> |
| 415. <i>Cerbera.</i> | 449. <i>Lightfootia.</i> |
| 416. <i>Arduina.</i> | 450. <i>Bertiera.</i> |
| 417. <i>Camax.</i> | 451. <i>Portlandia.</i> |
| 418. <i>Myrsine.</i> | 452. <i>Solanandra.</i> |
| 419. <i>Bladhia.</i> | 453. <i>Roella.</i> |
| 420. <i>Cestrum.</i> | 454. <i>Phyteuma.</i> |
| 421. <i>Brunfelsia.</i> | 455. <i>Campanula.</i> |
| 422. <i>Randia.</i> | 456. <i>Scævola.</i> |
| 423. <i>Fagraea.</i> | 457. <i>Trachelium.</i> |
| 424. <i>Strychnos.</i> | 458. <i>Matthiola.</i> |
| 425. <i>Capficum.</i> | 459. <i>Cephaelis.</i> |
| 426. <i>Solanum.</i> | 460. <i>Morinda.</i> |
| 427. <i>Physalis.</i> | 461. <i>Psychotria.</i> |
| 428. <i>Atropa.</i> | 462. <i>Coffea.</i> |

463. *Chiococca*.
 464. *Callicocca*.
 465. *Bæobotrys*.
 466. *Gardenia*.
 467. *Genipa*.
 468. *Lonicera*.
 469. *Trioesteum*.
 470. *Mussaenda*.
 471. *Hamellia*.
 472. *Schwenkfeldia*.
 473. *Oribasia*.
 474. *Stephanium*.
 475. *Erithalis*.
 476. *Canarium*.
 477. *Melicytus*.
 478. *Hirtella*.
 479. *Rhamnus*.
 480. *Ruyschia*.
 481. *Ceanothus*.
 482. *Celastrus*.
 483. *Evonymus*.
 484. *Vitis*.
 485. *Elæodendrum*.
 486. *Corynocarpus*.
 487. *Mangifera*.
 488. *Cedrela*.
 489. *Calodendrum*.
 490. *Diosma*.
 491. *Hovenia*.
 492. *Claytonia*.
 493. *Roridula*.
 494. *Itea*.
 495. *Sauvagesia*.

496. *Pennantia*.
 497. *Portulacaria*.
 498. *Caroxylon*.
 499. *Brunia*.
 500. *Kuhnia*.
 501. *Schæpfia*.
 502. *Nauclea*.
 503. *Ribes*.
 504. *Escallonia*.
 505. *Carpodetus*.
 506. *Hedera*.
 507. *Plectronia*.
 508. *Phyllica*.
 509. *Gronovia*.
 510. *Heliconia*.
 511. *Strelitzia*.
 512. *Cyrilla*.
 513. *Argophyllum*.
 514. *Lagœcia*.
 515. *Conocarpus*.
 516. *Achyranthes*.
 517. *Celosia*.
 518. *Chenolea*.
 519. *Illecebrum*.
 520. *Glaux*.
 521. *Plocama*.
 522. *Hedycera*.
 523. *Ceratonia*.
 524. *Breynia*.
 525. *Thesium*.
 526. *Nyssa*.
 527. *Gouania*.

II. DIGYNIA.

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 528. <i>Stapelia.</i> | 560. <i>Nephelium.</i> |
| 529. <i>Cynanchum.</i> | 561. <i>Cannabis.</i> |
| 530. <i>Periploca.</i> | 562. <i>Vahlia.</i> |
| 531. <i>Pergularia.</i> | 563. <i>Phyllis.</i> |
| 532. <i>Apocynum.</i> | 564. <i>Coprosma.</i> |
| 533. <i>Asclepias.</i> | 565. <i>Panax.</i> |
| 534. <i>Melodinus.</i> | 566. <i>Eryngium.</i> |
| 535. <i>Swertia.</i> | 567. <i>Hydrocotyle.</i> |
| 536. <i>Gentiana.</i> | 568. <i>Spananthe.</i> |
| 537. <i>Dichondra.</i> | 569. <i>Sanicula.</i> |
| 538. <i>Cressa.</i> | 570. <i>Astrantia.</i> |
| 539. <i>Hydrolea.</i> | 571. <i>Heracleum.</i> |
| 540. <i>Rochortia.</i> | 572. <i>Oenanthe.</i> |
| 541. <i>Stexis.</i> | 573. <i>Eckinophora.</i> |
| 542. <i>Velezia.</i> | 574. <i>Caucalis.</i> |
| 543. <i>Iresine.</i> | 575. <i>Artemisia.</i> |
| 544. <i>Linconia.</i> | 576. <i>Daucus.</i> |
| 545. <i>Nama.</i> | 577. <i>Arctopus.</i> |
| 546. <i>Heuchera.</i> | 578. <i>Tordylium.</i> |
| 547. <i>Bumalda.</i> | 579. <i>Laserpitium.</i> |
| 548. <i>Anabasis.</i> | 580. <i>Pevcedanum.</i> |
| 549. <i>Microtea.</i> | 581. <i>Ammi.</i> |
| 550. <i>Salsola.</i> | 582. <i>Hasselquistia.</i> |
| 551. <i>Humulus.</i> | 583. <i>Conium.</i> |
| 552. <i>Chenopodium.</i> | 584. <i>Bunium.</i> |
| 553. <i>Beta.</i> | 585. <i>Athamanta.</i> |
| 554. <i>Herniaria.</i> | 586. <i>Rupleurum.</i> |
| 555. <i>Gomphrena.</i> | 587. <i>Hermas.</i> |
| 556. <i>Staavia.</i> | 588. <i>Sium.</i> |
| 557. <i>Bosea.</i> | 589. <i>Selinum.</i> |
| 558. <i>Ulmus.</i> | 590. <i>Cuminum.</i> |
| 559. <i>Celtis.</i> | 591. <i>Ferula.</i> |

592. *Crithmum*.
 593. *Bubon*.
 594. *Cachrys*.
 595. *Ligusticum*.
 596. *Angelica*.
 597. *Sison*.
 598. *Danaa*.
 599. *Aethusa*.
 600. *Coriandrum*.
 601. *Scandix*.
 602. *Chærophyllyum*.
 603. *Phellandrium*.

604. *Imperatoria*.
 605. *Seseli*.
 606. *Cicuta*.
 607. *Smyrnum*.
 608. *Carum*.
 609. *Thapsia*.
 610. *Pastinaca*.
 611. *Anethum*.
 612. *Aegopodium*.
 613. *Apium*.
 614. *Pimpinella*.
 615. *Cussonia*.

III. TRIGYNIA.

616. *Viburnum*.
 617. *Sambucus*.
 618. *Zanonia*.
 619. *Griselinia*.
 620. *Semecarpus*.
 621. *Rhus*.
 622. *Cassine*.
 623. *Spathelia*.
 624. *Staphylea*.
 625. *Schrebera*.
 626. *Tamarix*.
 627. *Drypis*.

628. *Turnera*.
 629. *Sarothra*.
 630. *Alfina*.
 631. *Telephium*.
 632. *Astronium*.
 633. *Corrigiola*.
 634. *Pharnaceum*.
 635. *Xylophylla*.
 636. *Reichelia*.
 637. *Salmasia*.
 638. *Basella*.
 639. *Pistacia*.

IV. TETRAGYNIA.

640. *Parnassia*.
 641. *Evolvulus*.

642. *Spinacia*.

V. PENTAGYNIA.

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 643. <i>Fevillea.</i> | 650. <i>Drosera.</i> |
| 644. <i>Aralia.</i> | 651. <i>Commersonia.</i> |
| 645. <i>Glossopetalum.</i> | 652. <i>Sibbaldia.</i> |
| 646. <i>Crassula.</i> | 653. <i>Statice.</i> |
| 647. <i>Giseckia.</i> | 654. <i>Acnida.</i> |
| 648. <i>Linum.</i> | 655. <i>Antidesma.</i> |
| 649. <i>Aldrovanda.</i> | 656. <i>Zanthoxylum.</i> |

IV. POLYGYNIA.

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 657. <i>Myosurus.</i> | 658. <i>Scheffleria.</i> |
|-----------------------|--------------------------|
-

PENTANDRIA

I. MONOGYNIA.

337. MIRABILIS. Jalapa *Tournef.* 50.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum, erecto-ventricosum, inferum: *folioli* ovato-lanceolatis, persistentibus.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* tenuis, longus, superne crassior, nectario impositus. *Limbus* erecto-patens, integer, obtuse-quinquefidus, plicatus.

Nectarium globosum, petalo suppositum, persistens.

STAM. *Filamenta* quinque, filiformia, e receptaculo orta, petalo (non nectario) adnata, corollae longitudine, inclinata, inaequalia. *Antherae* subrotundae, asurgentes.

PIST. *Germen* subrotundum, intra nectarium. *Stylus* filiformis, longitudine & situ staminum. *Stigma* globosum, punctatum, assurgens.

PER. nullum.

SEM. *Nux* ovato-pentagona, e Nectario indurato, decidua.

338. WEIGELA. *Thunb. diss. nov. gen. p. 5.*
Flor. jap. ejusd. p. 6.

CAL. *Perianthium* quinquephyllum: *laciniae* subulatae, erectae, aequales.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* intus villosus, longitudine calycis. *Limbus* campanulatus, semiquinquefidus: *laciniae* ovatae, obtusae, erecto-patentes.

STAM. *Filamenta* quinque, tubo inserta, filiformia, erecta, longitudine fere corollae. *Antherae* erectae, lineares, basi bifidae, apice obtusae.

PIST. *Germen* superum, tetragonum, truncatum. *Stylus* e basi germinis, filiformis, corolla paulo longior. *Stigma* peltatum, planum.

PER. Fructus adhuc ignotus. In florente planta videtur esse semen nudum.

339. PLUMBAGO. * *Tournef.* 58.

CAL. *Perianthium* monophyllum, ovato-oblongum, tubulatum, pentagonum, scabrum, ore quinquedentato, persistens.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* cylindraceus, superne angustior, calyce longior. *Limbus* quinquefidus, erecto-patens: *laciniis* ovatis.

Nectarium ex valvulis quinque, acuminatis, minimis, in fundo corollæ, germen includentibus.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, libera intra tubum corollæ, nectarii valvulis insidentia. *Antheræ* parvæ, oblongæ, versatiles.

PIST. *Germen* ovatum, minimum. *Stylus* simplex, longitudine tubi. *Stigma* quinquefidum, tenue.

PER. nullum.

SEM. unicum, oblongum, inclusum.

340. CERINTHE. * *Tournef.* 56.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum: *laciniis* oblongis, æqualibus, persistentibus.

COR. monopetala, campanulata. *Tubus* brevis, crassus. *Limbus* tubulato-ventricosus, tubo paulo crassior: ore quinquefido. *Faux* nuda, pervia.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, brevissima. *Antheræ* acutæ, erectæ.

PIST. *Germen* quadripartitum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* obtusum.

PER. nullum. *Calyx* immutatus.

SEM. duo, ossea, nitida, subovata, extus gibba, bilocularia.

341. MESSERSCHMIDIA.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum: *laciniis* sublinearibus; erectum, persistens.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* cylindricus, rudis, calyce longior, basi globosus. *Limbus* quinquefidus, plicatus, lateribus membranaceus. *Faux* nuda.

STAM. *Filamenta* quinque, minuta, in inferiore tubi parte. *Antheræ* subulatae, erectæ, intra medium tubi.

PIST. *Germen subovatum, Stylus cylindricus, brevissimus, persistens. Stigma capitatum, ovatum.*

PER. *Bacca sicca, suberosa, cylindrico-rotundata umbilico retuso, cincto dentibus 4 obtusis; bipartibilis.*

SEM. *bina intra utramque partem pericarpium, oblonga, ossea, incurva, extrorsum rotundata, introrsum angulata.*

342. ECHIUM, * *Tournef.* 54.

CAL. *Perianthium quinquepartitum, erectum, persistens: laciniis subulatis, erectis.*

COR. *monopetala, campanulata. Tubus brevissimus. Limbus erectus, sensim ampliatus, quinquefidus, obtusus: laciniis sæpius inæqualibus: superioribus duabus longioribus, infima minore, acuta, reflexa. Faux pervia.*

STAM. *Filamenta quinque, subulata, longitudine corollæ, declinata, inæqualia. Antheræ oblongæ, incurvantes.*

PIST. *Germina quatuor, Stylus filiformis, longitudine staminum. Stigma obtusum, bifidum.*

PER. *nullum. Calyx rigidior, in sinu femina fovens.*

SEM. *quatuor, subrotunda, oblique acuminata.*

OBS. *E. lævigato, italico, & rubro corollæ fere æquales: stamina in quibusdam corollam æquant, in aliis eandem multo superant.*

343. HELIOTROPIUM. * *Tournef.* 57.

CAL. *Perianthium monophyllum, tubulatum, quinque-dentatum, persistens.*

COR. *monopetala, hypocrateriformis. Tubus longitudine calycis. Limbus planus, semiquinquefidus, obtusus: laciniis minoribus, alternis, acutioribus, majoribus interjacentibus. Faux nuda.*

STAM. *Filamenta quinque, brevissima, in fauce. Antheræ parvæ, tectæ.*

PIST. *Germina quatuor, Stylus filiformis, longitudine staminum. Stigma emarginatum.*

PER. *nullum. Calyx erectus, immutatus, in sinu femina fovens.*

SEM. *quatuor, ovata, acuminata.*

344. PULMONARIA. * *Tournef.* 55. *Cerinthoides. Boerh.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquedentatum, prismatico - pentagonum, persistens.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* cylindraceus, longitudine calycis. *Limbus* semiquinquefidus, obtusus, erecto-patens. *Faux* pervia.

STAM. *Filamenta* quinque, in fauce, brevissima. *Antherae* erectae, conniventes.

PIST. *Germina* quatuor. *Stylus* filiformis, calyce brevior. *Stigma* obtusum, emarginatum.

PER. nullum. *Calyx* immutatus, in fundo semina fovens.

SEM. quatuor, subrotunda, obtusa.

OBS. *Cerinthoides* B. *calyce tubo corollae breviorē distinguebatur.*

P. suffruticosa calycibus subulatis quinquepartitis gaudet.

345. LITHOSPERMUM. * *Tournef.* 55.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, oblongum, rectum, acutum, persistens; *laciniis* subulatis, carinatis.

COR. monopetala, infundibuliformis, longitudine calycis. *Tubus* cylindraceus. *Limbus* semiquinquefidus, obtusus, erectus. *Faux* perforata, nuda.

STAM. *Filamenta* quinque, brevissima. *Antherae* oblongae, in fauce corollae.

PIST. *Germina* quatuor. *Stylus* filiformis, longitudine tubi corollae. *Stigma* obtusum, bifidum.

PER. nullum. *Calyx* patulus, semina, quibus longior, in sinu continens.

SEM. quatuor, ovato-acuminata, dura, glabra, laevia aut rugosa.

OBS. L. *dispermum semina tantum duo unilocularia & calycem quasi inflatum habet.*

346. ONOSMA.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum; *laciniis* lanceolatis, erectis, persistentibus.

COR. monopetala, campanulata. *Tubus* brevissimus. *Limbus* tubuloso-ventricosus, tubo paulo crassior: *etc* subquinquefido. *Faux* nuda, pervia.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, brevissima. *Anthera* sagittatæ, erectæ, longitudine corollæ.

PIST. *Germen* quadripartitum. *Stylus* filiformis, longitudine corollæ. *Stigma* obtusum.

PER. nullum. *Calyx* immutatus.

SEM. quatuor, ovata.

347. SYMPHYTUM. * *Tournef.* 56.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, erectum, pentagonum, acutum, persistens.

COR. monopetala, campanulata. *Tubus* brevissimus. *Limbus* tubulato-ventricosus, tubo paulo crassior: cretinquedentato, obtuso, reflexo. *Faux* munita radiis quinque, subulatis, limbo brevioribus, in conniventibus.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, cum radiis faucis alterna. *Anthera* acutæ, erectæ, testæ.

PIST. *Germina* quatuor. *Stylus* filiformis, longitudine corollæ. *Stigma* simplex.

PER. nullum. *Calyx* major, ampliatus.

SEM quatuor, gibba, acuminata, apicibus conniventia.

348. BORAGO. * *Tournef.* 53. Boraginoides *Boerh.* l. 88. *Cynoglossoides* *Isnard A.* G. 1718. t. 10.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, persistens.

COR. monopetala, rotata, longitudine calycis. *Tubus* calyce brevior. *Limbus* quinquepartitus, rotatus, planus: *faux* coronata: prominentiis quinque, emarginatis, obtusis.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, conniventia. *Anthera* oblongæ, filamentorum lateri interiori in medio affixæ, conniventes.

PIST. *Germina* quatuor. *Stylus* filiformis, staminibus longior. *Stigma* simplex.

PER. nullum. *Calyx* major inflatus.

SEM. quatuor, subrotunda, rugosa, apice extrorsum carinata, basi globosa, receptaculo excavato longitudinaliter inserta.

Obs. *Calycis laciniæ quoad figuram, & Corollæ Tubus quoad magnitudinem, differentes sunt.*

349. LYCOPSIS. * Echioides. *Dill. gen. 3.*

CAL. *Perianthium* quinquepartitum : laciniis oblongis, acuminatis, patulis, persistentibus.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* cylindraceus, curvato-flexus. *Limbus* semiquinquefidus, obtusus. *Faux* clausa, *squamulis* quinque, convexis, prominentibus, conniventibus.

STAM. *Filamenta* quinque, minima, ad flexuram tubi corollæ. *Antheræ* parvæ, testæ.

PIST. *Germina* quatuor. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* obtusum, bifidum.

PER. nullum. *Calyx* maximus, inflatus.

SEM. quatuor, oblonga.

OBS. *Essentia generis consistit in curvatura tubi corollæ.*

350. ASPERUGO. * *Tournef. 54.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquefidum, denticulis erectum, inæqualibus : persistens.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* cylindraceus, brevissimus. *Limbus* semiquinquefidus, obtusus, parvus. *Faux* clausa : *squamulis* quinque, convexis, prominentibus, conniventibus.

STAM. *Filamenta* quinque, in fauce, brevissima. *Antheræ* oblongiusculæ, testæ.

PIST. *Germina* quatuor, compressa. *Stylus* filiformis, brevis. *Stigma* obtusum.

PER. nullum. *Calyx* maximus, erectus, compressus : lamellis plano-parallelis, sinuatis.

SEM. quatuor, oblonga, compressa, per paria distantia.

OBS. A. *ægyptiaca calycem fructus ventricosum, parum compressum habet.*

351. CYNOGLOSSUM. * *Tournef. 57.* Omphalodes *Tournef. 58.*

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, oblongum, acutum, persistens.

COR. monopetala, infundibuliformis, longitudine calycis. *Tubus* cylindraceus, limbo brevior. *Limbus* semiquinquefidus, obtusus. *Faux* clausa *squamulis* quinque, convexis, prominentibus, conniventibus.

STAM. *Filamenta* quinque, brevissima, in fauce corollæ. *Antheræ* subrotundæ, nudæ.

PIST. *Germina* quatuor. *Stylus* subulatus, longitudine staminum, persistens. *Stigma* emarginatum.

PER. nullum, sed *arilli* seminum quatuor, depressi, subrotundi, extrorsum obtusiores, scabri, non dehiscen-
tes, latere exteriori planiusculi, apice affixi.

SEM. totidem, subovata, gibba, acuminata, glabra.

OES. *Essentia generis consistit in quatuor arillis monospermis stylo affixis.*

Omphalodes T. 5, 6, 7, *arillis nudis, nec echinato-
hamosis differt.*

352. ANCHUSA. * Buglossum Tournef. 53.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, oblongum, teres, acutum, persistens.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* cylindraceus, longitudine calycis. *Limbus* semiquinquesidus, erecto-patens, obtusus. *Faux* clausa (*quamulis* quinque, convexis, prominentibus, oblongis, conniventibus).

STAM. *Filamenta* quinque, brevissima, in fauce corollæ. *Antheræ* oblongæ, incumbentes, testæ.

PIST. *Germina* quatuor. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* obtusum, emarginatum.

PER. nullum. *Calyx* major, erectus, in sinu continens semina.

SEM. quatuor, oblongiuscula, obtusa, gibba.

353. MYOSOTIS. * Dill. gen. 3.

CAL. *Perianthium* semiquinquesidum, oblongum, erectum, acutum, persistens.

COR. monopetala, hypocrateriformis. *Tubus* cylindraceus, brevis. *Limbus* semiquinquesidus, planus: *lacinii* emarginatis, obtusis. *Faux* clausa (*quamulis* quinque, convexis, prominentibus, conniventibus).

STAM. *Filamenta* quinque, in collo tubi, brevissima. *Antheræ* minimæ, testæ.

PIST. *Germina* quatuor. *Stylus* filiformis, longitudine tubi corollæ. *Stigma* obtusum.

PER. nullum. *Calyx* major, erectus, in sinu semina fovens.

SEM. quatuor, ovata, acuminata, glabra.

Obs. *Species aliæ feminibus levibus, aliæ aculeis uncinatis.*

354. NOLANA. *

CAL. *Perianthium* monophyllum, basi turbinatum, quinquepartitum, quinquangulare: *laciniis* cordatis, acutis, persistentibus.

COR. monopetala, campanulata, plicata, patens, subquinqueloba, calyce duplo major.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, erecta, æqualia, corolla breviora. *Antheræ* sagittatæ.

PIST. *Germina* quinque, subrotunda. *Stylus* inter *germina*, cylindricus, rectus, longitudine staminum. *Stigma* capitatum.

PER. proprie nullum.

SEM. quinque, cortice succulento, subrotunda, basi interiore nuda receptaculo immersa, bi- & quadrilocularia.

355. CORIS. *Tournef.* 423.

CAL. *Perianthium* monophyllum, ventricosum, connivens, quinquedentatum: extus coronatum. *Spinis* quinque superioribus simplicibus; inferioribus dentatis.

COR. monopetala, irregularis. *Tubus* longitudine calycis, cylindraceus. *Limbus* planus, quinquepartitus: *laciniis* oblongis, emarginatis, obtusis; *inferioribus* *dactylis* brevioribus, magis distantibus.

STAM. *Filamenta* quinque, setacea, longitudine corollæ, declinata. *Antheræ* simplices.

PIST. *Germen* subrotundum, superum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum, declinatus. *Sigma* crassiusculum.

PER. *Capsula* globosa, in fundo calycis posita, unilocularis, quinquevalvis.

SEM. plurima, subovata, parva.

356. HYDROPHYLLUM. * *Tournef.* 16.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, corolla vix brevius, patens, persistens: *laciniis* subulatis.

COR.

COR. monopetala, campanulata, quinquefida: *laciniis* erectis, obtusis, emarginatis.

Nectarium: Rima lamellis duabus longitudinibus conniventibus clausa, intra singulæ *laciniæ* medium petalo adnata.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, corolla longiora.

Anthera incumbentes, oblongæ.

PIST. *Germen* ovatum, acuminatum. *Stylus* subulatus, longitudine staminum. *Stigma* bifidum, acutum, patens.

PER. *Capsula* globosa, unilocularis, bivalvis.

SEM. unicum, rotundum, magnum.

357. GALAX. *Viticella Mitch.* 24.

CAL. *Perianthium* decaphyllum. *Foliolis* exterioribus alternis, brevioribus, lanceolatis, reflexis: interioribus longioribus, lanceolatis, acutis, erectis.

COR. monopetala, hypocrateriformis. *Tubus* cylindricus, longitudine calycis. *Limbus* planus, quinquefidus: *laciniis* obtusis.

STAM. *Filamenta* quinque, breviora. *Anthera* subrotundæ, conniventes intra faucem corollæ.

PIST. *Germen* ovatum, villosum. *Stylus* filiformis, semibifidus, longitudine staminum, *Stigmata* subrotunda.

PER. *Capsula* ovata, unilocularis, bivalvis, colorata, elastica.

SEM. duo, magna, convexa, ovata, callosa, quasi unicum, bilobum.

358. CORTUSA. * *Boerh.*

CAL. *Perianthium* quinquefidum, patens, minimum, persistens: *laciniis* lanceolatis, tridentatis.

COR. monopetala, rotata. *Tubus* vix ullus. *Limbus* planus, quinquepartitus, amplus: *laciniis* ovatis, acutis. *Faux* annulo elevato.

STAM. *Filamenta* quinque, obtusa. *Anthera* bilamellatæ, oblongæ, erectæ, exteriori parti affixæ.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, corolla longior. *Stigma* subcapitatum.

PER. *Capsula* ovalis, acuminata, semiquinquevalvis.

SEM. numerosa, compressa, angulata.

359. ANAGALLIS. * *Tournef.* 59.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, acutum, persistens: laciniis carinatis.

COR. monopetala, rotata. *Tubus* nullus. *Limbus* quinquepartitus, planus: laciniis ovato-orbiculatis, unguibus connexis.

STAM. *Filamenta* quinque, erecta, corolla breviora, inferne hirsuta. *Antheræ* simplices.

PIST. *Germen* globosum. *Stylus* filiformis, leviter inclinatus. *Stigma* capitatum.

PER. *Capsula* globosa, unilocularis, circumscissa.

SEM. plurima, angulata. *Receptaculum* globosum, maximum.

360. LYSIMACHIA. * *Tournef.* 59.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, acutum, erectum, persistens.

COR. monopetala, rotata. *Tubus* nullus. *Limbus* quinquepartitus, planus: laciniis ovato-oblongis.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata. *Antheræ* acuminatæ.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* obtusum.

PER. *Capsula* globosa, mucronata, unilocularis, decem-valvis.

SEM. plurima, angulata. *Receptaculum* globosum, maximum, punctatum.

OBS. L. *Linum stellatum* corolla quinquesida & fructu quinquevalvi differt.

L. quadrifoliæ petala serrata, mucronata.

361. CYCLAMEN. * *Tournef.* 68.

CAL. *Perianthium* semiquinquesidum, subrotundum, persistens: laciniis ovatis.

COR. monopetala. *Tubus* subglobosus, calyce duplo major, parvus, nutans. *Limbus* sursum reflexus, quinquepartitus, maximus: laciniis lanceolatis. *Columna* prominens.

STAM. *Filamenta* quinque, minima, in tubo corollæ. *Antheræ* rectæ, acutæ, in collo corollæ, conniventes.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis, rectus, staminibus longior. *Stigma* acutum.

PER. *Bacca* globosa, unilocularis, apice quinquefariam dehiscens, testa, putamine capsulari.

SEM. plurima, subovata, angulata. *Receptaculum* ovatum, liberum.

362. DODECATHEON. *

CAL. *Involucrum* polyphyllum, multiflorum, minimum. *Perianthium* monophyllum, semiquinquesidum, persistens: *laciniis* reflexis, demum longioribus, persistentibus.

COR. monopetala, quinquepartita. *Tubus* calyce brevior. *Limbus* reflexus: *laciniis* longissimis, lanceolatis.

STAM. *Filamenta* quinque, brevissima, obtusa, tubo infidentia. *Anthera* sagittata, conniventes in rostrum.

PIST. *Germen* conicum. *Stylus* filiformis, staminibus longior. *Stigma* obtusum.

PER. *Capsula* oblonga, unilocularis, apice dehiscens.

SEM. plurima, parva. *Receptaculum* liberum, parvum.

363. SOLDANELLA. * *Tournef.* 16.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, rectum, persistens: *laciniis* lanceolatis.

COR. monopetala, campanulata, sensim ampliata, recta: ore lacero-multifido, acuto.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata. *Anthera* simplices, sagittata.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis longitudine corollæ, persistens. *Stigma* simplex.

PER. *Capsula* oblonga, teres, oblique striata, unilocularis, dehiscens apice multidentato.

SEM. numerosa, acuminata, minima. *Receptaculum* columnare, liberum.

364. PRIMULA. * *Primula veris* *Tournef.* 47. *Auricula Urfi* *Tournef.* 46.

CAL. *Involucrum* polyphyllum, multiflorum, minimum, *Perianthium* monophyllum, tubulatum, pentagonum, quinquedentatum, acutum, erectum, persistens.

COR. monopetala. *Tubus* cylindræus, longitudine calycis, terminatus collo parvo, hemispharico. *Lim-*

bus patens, semiquinquesidus: laciniis obcordatis, emarginatis, obtusis. Faux pervia.

STAM. *Filamenta* quinque, brevissima, intra collum corollæ. *Antheræ* acuminatæ, erectæ, conniventes, inclusæ.

PIST. *Germen* globosum. *Stylus* filiformis, longitudine calycis. *Stigma* globosum.

PER. *Capsula* teres, longitudine ferme perianthii, testâ, unilocularis, dehiscens apice decurrentato.

SEM. numerosa, subrotunda. *Receptaculum* ovato-oblongum, liberum.

365. ANDROSACE. * *Tournef. 46.*

CAL. *Involucrum* polyphyllum, multiflorum, minimum. *Perianthium* monophyllum, pentagonum, semiquinquesidum, acutum, erectum, persistens.

COR. monopetala, hypocrateriformis. *Tubus* ovatus, calyce obvolutus. *Limbus* planus, quinquepartitus: laciniis ovato-oblongis, obtusis, integris. *Faux* glandulis obsessa.

STAM. *Filamenta* quinque, brevissima, intra tubum corollæ. *Antheræ* oblongæ, erectæ, inclusæ.

PIST. *Germen* globosum. *Stylus* filiformis, brevissimus. *Stigma* globosum, inclusum.

PER. *Capsula* globosa, calyci plano infidens, unilocularis, quinquefariam apice dehiscens.

SEM. plurima, subrotunda, hinc gibba, inde plana. *Receptaculum* erectum, liberum.

OBS. A. maxima *Perianthiis maxime patentibus differt.*

366. ARETIA. † *Hall. helu. t. 8. f. 1.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum, semiquinquesidum, obtusiusculum, persistens.

COR. monopetala, hypocrateriformis. *Tubus* ovatus, longitudine calycis, collo coarctatus. *Limbus* quinquepartitus; laciniis obovatis.

STAM. *Filamenta* quinque, conica, in medio tubi, brevissima. *Antheræ* erectæ, acutiusculæ, intra faucem corollæ.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis, longitudine tubi. *Stigma* depresso-capitatum.

PER. *Capsula* unilocularis, quinquevalvis.

SEM. quinque. Jacq.

OBS. Fructum attente describant Botanici Vallesiae, ut certitudo generis eruatur. Habitu, planta caulescente, pedunculis simplicibus distincta videtur ab *Androsace*; rarissima planta.

OBS. Semina tria & quinque adsunt. R.

367. HOTTONIA. * Boerh. Stratiotes Vaill. A. G. 1719.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum: laciniis linearibus, erecto-patulis.

COR. monopetala, hypocrateriformis. *Tubus* longitudine calycis. *Limbus* quinquefidus, planus: laciniis ovato-oblongis, emarginatis.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, brevissima, erecta, laciniis corollae opposita, tubo corollae superimposita. *Anthera* oblonga.

PIST. *Germen* globoso-acuminatum. *Stylus* filiformis, brevis. *Stigma* globosum.

PER. *Capsula* globosa, acuminata, unilocularis, calyci imposita.

SEM. plurima, globosa. *Receptaculum* globosum, magnum.

368. BACOPA. Aubl. 49.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum: laciniis duabus oppositis oblongis, concavis, acutis; duabus inferioribus deflexis, ovatis, acutis; unica superiore latiore, subrotunda, undulata.

COR. monopetala. *Tubus* brevis, versus orificium paululum ampliatus. *Limbus* quinquepartitus: laciniis ovato-oblongis, obtusis, aequalibus, patentibus.

STAM. *Filamenta* quinque, tubo corollae inserta. *Anthera* sagittata.

PIST. *Germen* ovatum, compressum, inferne calyce adnato incrustatum. *Stylus* brevis. *Stigma* capitatum.

PER. *Capsula* unilocularis.

SEM. plurima, minutissima.

369. MENYANTHES. * *Tournef.* 15. Nymphoides *Tournef.* 67.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum, rectum persistens.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* cylindraceo - infundibuliformis, brevis. *Limbus* ultra medium quinquesfidus: *laciniis* reflexo-patentibus, obtusis, hirsutis conspicuis.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, brevia. *Antheræ* acutæ, basi bifidæ, erectæ.

PIST. *Germen* conicum. *Stylus* cylindraceus, longitudine fere corollæ. *Stigma* bifidum compressum.

PER. *Capsula* ovata, calyce cincta, unilocularis.

SEM. plurima, ovata, exigua.

OBS. Nymphoides T. *petalis ciliatis*, nec pagina superiore hirsutis distinguebatur.

370. DORÆNA. *Thunb. diff. nov. gen. p. 59.*
Flor. Jap. p. 6.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquesfidum, corolla brevius: *laciniæ* ovatæ, concavæ, glabræ.

COR. monopetala, subcylindrico-rotata, quinquesfida: limbi *laciniæ* ovatæ, obtusæ, erectæ.

STAM. *Filamenta* quinque, tubo corollæ inserta, brevissima ut fere nulla. *Antheræ* oblongæ, subtetragonæ, inclusæ.

PIST. *Germen* superum, conicum, glabrum. *Stylus* unicus, filiformis, corollæ longitudine. *Stigma* truncatum, emarginatum.

PER. *Capsula* ovata, acuta, glabra, univalvis, unilocularis, polysperma, magnitudine piperis.

371. ALLAMANDA. *Galarips. Auth. D. Allamand.*

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: foliolis ovatis, acutis.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* cylindraceus. *Limbus* semiquinquesfidus, ventricosus: *laciniis* patentibus, obtusis.

STAM. *Filamenta* vix ulla. *Antheræ* quinque, sagittatæ, conniventes, in fauce tubi.

PIST. *Germen* ovale, cinctum basi margine annulari.
Stylus filiformis, longitudine tubi. *Stigma* capitatum,
 medio coarctatum.

PER. *Capsula* orbiculata, compresso-lenticularis, echinata, unilocularis, bivalvis.

SEM. plurima, imbricata, orbiculata, plana, margine ala membranacea.

372. THEOPHRASTA. Erefia. *Plum.* 25.

CAL. *Perianthium* semiquinquefidum, parvum, persistens, obtusum laciniis & sinibus.

COR. monopetala, campanulata, semiquinquefida, erectopatula: laciniis & divijuris obtusis.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, corolla breviora. *Antheræ* simplices.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* subulatus, corolla brevior. *Stigma* acutum.

PER. *Capsula* globosa, maxima, unilocularis.

SEM. plurima, subrotunda. *Receptaculo* libero undique affixa.

373. SCHEFFIELDIA. *Suppl. p.* 18. *Forst.* *gen. n.* 9.

CAL. *Perianthium* inferum, quinquefidum, acutum persistens.

COR. monopetala, campanulata, calyce longior. Limbus quinquefidus: laciniis ovatis, reflexis.

STAM. *Filamenta* decem, subulata, tubo inserta: quinque alterna fertilia, laciniis oppositis: quinque castrata, cum laciniis alternantia. *Antheræ* cordatæ, acuminatæ.

PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* simplex.

PER. *Capsula* conica, unilocularis, quinquevalvis.

SEM. plurima, globosa, receptaculo columnari medio capsulæ inserta.

374. PISONIA. * *Plum. gen.* 11. *Houst.* *Pentagonotheca* *Vaill.* *A. G. Jacq. amer.*

274.

* *Mas.*

CAL. vix ullus.

COR. campanulata, quinquefida: *laciniis* acutis, patulis.

STAM. *Filamenta* quinque f. sex, subulata. *Antheræ* subrotundæ, didymæ.

PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* brevis. *Stigma* penicilliforme.

* *Femina*.

CAL. ut in Mare.

COR. ut in Mare.

PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* simplex, cylindricus, corolla longior, erectus. *Stigmata* bifida.

PER. *Capsula* ovalis, quinquangularis, quinquevalvis, unilocularis; vel *Bacca*.

SEM. unicum, glabrum, oblongum.

OBS. P. aculeata ex planta feminea & hermaphrodito masculo. *Fructu* angulari capsulari.

P. inermis ex planta hermaphrodita & hermaphrodito masculo. *Fructu* baccato.

375. RETZIA. *Suppl. p. 18. Thunb. Act. Lund.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, unguiculare, quinquepartitum. *Lacinie* inæquales, lanceolatae, acutæ.

COR. infera, monopetala, tubulosa, cylindrica, intus extusque villosa, apice quinquefida. *Lacinie* ovatae, obtusæ, concavæ, erectæ, apice hirsutissimæ.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, tubi ori inserta, laciniis breviora. *Antheræ* compressæ, sagittatæ.

PIST. *Germen* superum. *Stylus* filiformis, corolla longior. *Stigma* bifidum.

PER. *Capsula* oblonga, bilocularis, bivalvis, acuta, bifurca, glabra.

SEM. plura, minuta.

376. SPIGELIA. * *Arapabaca Plum. 31.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum, acuminatum, parvum, persistens.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* calyce multo longior, inferne angustatus. *Limbus* patens, quinquefidus: *laciniis* latis, acuminatis.

STAM. *Filamenta* quinque, simplicia. *Antheræ* simplices.

PIST. *Germen* globis duobus compositum, superum. *Stylus* unus, subulatus, longitudine tubi. *Stigma* simplex.

PER. *Capsula* didyma, bilocularis, quadrivalvis.
SEM. numerosa, minina.

377. OPHIORHIZA. † Fl. zeyl. *Mitreola*
edit. prior. Mitra Houst.

CAL. *Perianthium* monophyllum, erectum, quinquedentatum, æquale, persistens.

COR. monopetala, infundibuliformis: *Limbo* quinquefido, obtuso, patente.

STAM. *Filamenta* quinque, filiformia, longitudine tubi, cui inserta. *Anthera* oblonga.

PIST. *Germen* bifidum, superum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum, superne crassior. *Stigmata* duo, obtusa.

PER. *Capsula* biloba, lata, obtusiuscula: lobis oblongis divaricatis, bilocularis, Dissepimento contrario, introrsum dehiscens.

SEM. numerosa, angulata.

378. PORANA. † *Burman.*

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: foliolis lanceolatis, obtusis, corolla fere brevioribus, patentibus, persistentibus; in fructu majoribus.

COR. monopetala, campanulata, semiquinquefida, erecta, acuta.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, patentia, corolla fere breviora. *Anthera* incumbentes, ovales.

PIST. *Germen* superum, subglobosum. *Stylus* semibifidus, corolla longior, setaceus, persistens. *Stigmata* capitata.

PER. . . . bivalve.

SEM. . . .

379. CONVOLVULUS. * *Tournef.* 57.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, connivens, ovatum, obtusum, minimum, persistens.

COR. monopetala, campanulata, patens, magna, plicata, obsolete quinqueloba.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, corolla dimidio breviora. *Anthera* ovata, compressa.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigmata* duo, oblonga, latiuscula.

PER. *Capsula* calyce obvoluta, subrotunda, bilocularis, uni-bi-tri-valvis.

SEM. bina, subrotunda.

OBS. *Corolla* communiter decem crenis incisa, sed datur etiam limbo quinquesido. *Quædam species infundibuliformi corollæ gaudet.*

380. LISIANTHUS. *Brown. jam. t. 9.*

CAL. *Perianthium* quinquepartitum: foliolis lanceolatis, carinatis, margine membranaceis, brevissimis, persistentibus.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* longus, subventricosus, basi intra calycem coarctata. *Limbus* quinquepartitus: laciniis lanceolatis, tubo brevioribus, recurvatis.

STAM. *Filamenta* quinque, filiformia, tubo longiora. *Anthere* ovales, incumbentes.

PIST. *Germen* oblongum, acuminatum. *Stylus* filiformis longitudine staminum, persistens. *Stigma* capitatum, bilobum.

PER. *Capsula* oblonga, acuminata, bilocularis.

SEM. numerosa.

381. PATAGONULA. *Patagonica. Dill. elth. 226. f. 293.*

CAL. *Perianthium* minimum, quinquedentatum, persistens.

COR. monopetala rotata. *Tubus* vix ullus. *Limbus* planus, quinquepartitus: laciniis ovatis, acutis.

STAM. *Filamenta* quinque, longitudine corollæ. *Anthere* simplices.

PIST. *Germen* ovatum, acutum. *Stylus* filiformis, semibifidus, ramulis iterum semibifidis, longitudine staminum, persistens. *Stigmata* simplicia.

PER. *Capsula* ovata, acuminata, insidens *Calyci* maximo, laciniis oblongis, longis, emarginatis.

SEM. . . .

OBS. *Essentia* consistit in calycis fructiferi structura, qua ab omnibus distinguitur, licet seminum notitia desiciat hætenus. Ex stylo dichotomo videtur *Cordiis* affinis.

382. DATURA. *Stramonium* * *Tournef.* 43.
44. *Pont.* 3. 1.

CAL. *Perianthium* monophyllum, oblongum, tubulosum, ventricosum, quinquangulare, quinquedentatum, deciduum horizontaliter prope basin, parte remanente orbiculata persistente.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* cylindraceus, calyce fere longior. *Limbus* erecto-patulus, quinquangularis, quinqueplicatus, fere integer, quinquedentato-acuminatus.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, longitudine calycis. *Anthera* oblonga, compressa, obtusa.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, rectus. *Stigma* crassiusculum, obtusum, bilamellatum.

PER. *Capsula* subovata, bilocularis, quadrivalvis, basi calycis imposita. *Receptacula* convexa, magna, punctata, dissepimento affixa.

SEM. numerosa, reniformia.

OBS. *Capsulae* glabrities & aculeata asperitas in hoc genere variat.

383. HYOSCYAMUS. * *Tournef.* 42.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulosum, inferne ventricosum: ore quinquefido, acuto; persistens.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* cylindraceus, brevis. *Limbus* erecto-patens, semiquinquefidus: laciniis obtusis, unica reliquis latiore.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, inclinata. *Anthera* subrotunda.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* capitatum.

PER. *Capsula* ovata, obtusa, linea utrinque insculpta, bilocularis, duabus capsulis arte approximatis, circumscissa operculo horizontaliter dehiscente. *Receptacula* dimidiato-ovata, dissepimento affixa.

SEM. numerosa, inaequalia.

OBS. H. *Scopolia* calyce quinquefido, campanulato, mutico, corollaque campanulata, leviter quinquefida differt.

384. NICOTIANA. * *Tournef.* 41.

CAL. *Perianthium* monophyllum, ovatum, semiquinquefidum, persistens.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* calyce longior. *Limbus* patulus, semiquinquefidus, quinqueplicatus.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, longitudine fere corollæ, adscendentia. *Antheræ* oblongæ.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, longitudine corollæ. *Stigma* capitatum, emarginatum.

PER. *Capsula* subovata, utrinque linea insculpta, bilocularis, bivalvis, apice dehiscens. *Receptacula* dimidiato-ovata, punctata, dissepimento affixa.

SEM. numerosa, reniformia, rugosa.

OBS. *Figura* acuminata ♂ obtusa in bocce genere varia.

385. VERBASCUM. * *Tournef.* 61. *Blattaria Tournef.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum, parvum, persistens: *laciniis* erectis, acutis.

COR. monopetala, rotata, subinæqualis. *Tubus* cylindraceus, brevissimus. *Limbus* patens, quinquepartitus: *laciniis* ovatis, obtusis.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, corolla breviora. *Antheræ* subrotundæ, compressæ, erectæ.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum, inclinatus. *Stigma* crassiusculum, obtusum.

PER. *Capsula* subrotunda, bilocularis, bivalvis, superne dehiscens. *Receptacula* dimidiato-ovata, dissepimento affixa.

SEM. numerosa, angulata.

OBS. *In* plerisque *stamina* inclinata sunt, ♂ inæqualia villisque coloratis inferne vestita.

386. CHIRONIA. †

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum, erectum, acutum, persistens: *foliolis* oblongis.

COR. monopetala, æqualis. *Tubus* angustior. *Limbus* quinquepartitus, patens: *laciniis* ovatis, æqualibus.

STAM. *Filamenta* quinque, lata, brevia, ex apice tubi enata. *Antheræ* oblongæ, erectæ, magnæ, conniventes, desfloratæ spiraliter contortæ.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, staminibus paulo longior, declinatus. *Stigma* capitatum, assurgens.

PER. ovatum, biloculare.

SEM. numerosa, parva.

OBS. In aliis speciebus est Pericarpium Capsula, in aliis vero Bacca.

Variat calycis figura obtusa vel acuminata, uti & divisio.

387. GENIOSTOMA. Forst. charact. gen. 12.

CAL. Perianthium inferum, turbinatum, persistens, quinquefidum: laciniis acutis, brevibus.

COR. monopetala, tubulosa. Tubus dilatatus, calyce longior. Faux villosa-barbata: Limbus quinquepartitus, patens, laciniis ovatis, acutis, longitudine tubi.

STAM. Filamenta quinque, brevia, in fauce corollæ. Antheræ oblongæ, e corolla eminentes.

PIST. Germen ovatum. Stylus filiformis, tubo longior. Stigma cylindricum, obtusum, sulcatum.

PER. Capsula? oblonga, bilocularis, polysperma.

SEM. plurima, subangulata, receptaculo filiformi imposita.

388. DIAPENSIA. * Fl. lapp. 1.

CAL. Perianthium octophyllum: foliolis quinque interioribus in orbem positis, reliquis imbricatis incumbentibus, omnibus æqualibus, ovatis, obtusis, erectis, persistentibus.

COR. monopetala, hypocrateriformis. Tubus cylindraceus, apertus, longitudine calycis. Limbus quinquefidus, obtusus, planus.

STAM. Filamenta quinque, compresso-linearia, erecta, ad incisuras limbi tubum terminantia, brevia. Antheræ simplices.

PIST. Germen subrotundum. Stylus cylindraceus, longitudine staminum. Stigma obtusum.

PER. Capsula subrotunda, trilocularis, trivalvis.

SEM. plurima, subrotunda.

389. PHLOX. * Lychnidea Dill. elth. 166.

CAL. Perianthium monophyllum, cylindraceum, decangulare, quinquedentatum, acutum, persistens.

COR. monopetala, hypocrateriformis. *Tubus* cylindraceus, calyce longior, inferne angustior, incurvus. *Limbus* planus, quinquepartitus: *laciniis* æqualibus, obtulis, tubo brevioribus.

STAM. *Filamenta* quinque, intra tubum corollæ, quorum duo longiora, unicum brevius. *Antheræ* in fauce corollæ.

PIST. *Germen* conicum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* trifidum, acutum.

PER. *Capsula* ovata, trigona, trilocularis, trivalvis.

SEM solitaria, ovata.

390. POLEMONIUM. * *Tournef.* 61.

CAL. *Perianthium* monophyllum, femiquinquesidum, inferum, cyathiforme, acutum, persistens.

COR. monopetala, rotata. *Tubus* calyce brevior, clausus valvis quinque ad apicem positis. *Limbus* quinquepartitus, amplus, planus: *laciniis* subrotundis, obtulis.

STAM. *Filamenta* quinque, valvulis tubi inserta, filiformia, corolla breviora, inclinata. *Antheræ* subrotundæ, incumbentes.

PIST. *Germen* ovatum, acutum, superum. *Stylus* filiformis, longitudine corollæ. *Stigma* trifidum, revolutum.

PER. *Capsula* trigono-ovata, trilocularis, trivalvis, testæ.

SEM. plurima, irregularia, acutiuscula.

OBS. P. dubium *stylo semibifido gaudet. Planta dubii generis.*

P. Campanuloides *stigma simplex habet.*

391. IPOMOEIA. * *Quamoclit Tournef.* 39. *Volubilis. Dill. elth.* 318.

CAL. *Perianthium* quinquesidum, oblongum, minimum, persistens.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* subcylindraceus, longissimus. *Limbus* quinquesidus, patens: *laciniis* oblongis, planis.

STAM. *Filamenta* quinque fere, subulata, longitudine fere corollæ. *Anthera* subrotundæ.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis, longitudine corollæ. *Stigma* capitato-globosum.

PER. *Capsula* subrotunda, trilocularis.

SEM. nonnulla, subovata.

OBS. *Convolvulis nimis affinis Corolla tubo elongato & Stigmate capitato differens.*

392. BROSSÆA. † Plum. 17.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum: laciniis in acumina erecta longitudine corollæ definientibus.

COR. monopetala, conica, apice truncata, integra.

STAM. quinque.

PIST. *Germen* pentacoccum. *Stylus* subulatus, corollæ brevior. *Stigma* simplex.

PER. *Capsula* subrotunda, quinque sulcis divisa, quinquelocularis, testâ calyce magno, connivente, carnoso, succulento, lateribus dehiscente.

SEM. plurima, minutissima.

393. AZALEA. *

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, acutum, erectum, parvum, coloratum, persistens.

COR. monopetala, campanulata, semiquinquefida: laciniarum lateribus inflexis.

STAM. *Filamenta* quinque, filiformia, receptaculo inserta, libera. *Anthera* simplices.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis, longitudine corollæ, persistens. *Stigma* obtusum.

PER. *Capsula* subrotunda, quinquelocularis, quinquevalvis.

SEM. plurima, subrotunda.

OBS. *Figura corollæ in aliis infundibuliformis, in aliis campaniformis est; stamina in quibusdam declinata longissima. Numero staminum a Rhododendro primario differt.*

394. EPACRIS. Suppl. p. 19. Forst. gen. n. 10.

CAL. *Perianthium* inferum, quinquepartitum, æquale, persistens. *Foliola* lanceolata.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* sensim ampliatus in *limbum* quinquesidum: *dentibus* acutis, supra villosis.

STAM. *Filamenta* quinque, in fauce corollæ, brevissima. *Antheræ* incumbentes. *Nectarium* squamulæ quinque, obovatæ, emarginatæ, germi adpressæ & adnatæ.

PIST. *Germen* subrotundum, quinquesstriatum. *Stylus* cylindricus, brevis. *Stigma* capitatum.

PER. *Capsula* depressiuscula, quinquevalvis, quinquelocularis, dehiscens.

SEM. numerosa, minima.

395. CEROPEGIA. †

CAL. *Perianthium* minimum, quinquedentatum, acutum, persistens.

COR. monopetala: *basi* magna, globosa, quam *Tubus* cylindraceus, oblongus terminat. *Limbus* minimus, quinquedentatus, acuminatus, apicibus connivens, lateribus dehiscens.

STAM. *Filamenta* quinque, in *basi* corollæ, minima, incurva, conniventia. *Antheræ* parvæ.

PIST. *Germen* minimum. *Stylus* vix ullus. *Stigmata* duo.

PER. *Folliculi* duo, cylindracei, acuminati, longissimi, erecti, uniloculares, univalves.

SEM. numerosa, imbricata, oblonga, Pappo coronata.

396. NERIUM. * Tournef. 374.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, acutum, minimum, persistens.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* cylindraceus, limbo brevior. *Limbus* maximus, quinquepartitus: *laciniis* latis, obtusis, obliquis.

Nectarium Corona tubum terminans, brevis, in segmenta capillaria lacerata.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, brevissima, in tubo corollæ. *Antheræ* sagittatæ, conniventes, filo longo terminatæ.

PIST. *Germen* subrotundum, bifidum. *Stylus* cylindricus, longitudine tubi. *Stigma* truncatum, orbiculo insidens.

PER. *Folliculi* duo, teretes, longi, acuminati, erecti, univalves, longitudinaliter dehiscences.

SEM.

SEM. numerosa, oblonga, coronata pappo, imbricatim posita.

397. ECHITES. † Jacq. amer. 29.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, acutum, parvum.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Limbus* quinquefidus, planus, patentissimus.

Nectarium Glandulis quinque germen circumstantibus.

STAM. *Filamenta* quinque, tenuia, erecta. *Antheræ* rigida, oblongæ, acuminatæ, convergentes.

PIST. *Germina* duo. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* oblongo-capitatum, bilobum, glutine antheris annexum.

PER. *Folliculi* duo, longissimi, uniloculares, univalves.

SEM. plurima, imbricata, coronata Pappo longo.

OBS. E. caudata corollæ limbo apicibus linearibus longissimis terminato gaudet.

OBS. Glandulæ seminaque in folliculis papposa, maximi in hujus generis caractere sunt momenti: corolla in diversis diversissima. Jacq. amer. pag. 29.

398. PLUMERIA. * Tournef. 439.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, obtusum, minimum.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* longus, sensim ampliatus. *Limbus* quinquepartitus, erecto-patens: laciniis ovato-oblongis, obliquis.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, e medio tubi. *Antheræ* conniventes.

PIST. *Germen* oblongum, bifidum. *Styli* vix ulli. *Stigma* duplex, acuminatum.

PER. *Folliculi* duo, longi, acuminati, ventricosi, deorsum flexi, nutantes, uniloculares, univalves.

SEM. numerosa, oblonga, membranæ majori ovatæ ad basin inserta, imbricata.

OBS. P. albæ calyx quinquedentatus.

P. pudicæ corolla limbo clauso.

399. CAMERARIA. † Plum. 29.

CAL. *Perianthium* quinquefidum, acutum, connivens, minimum.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* cylindraceus, longus, basi apiceque ventricosus. *Limbus* quinquepartitus, planus: *laciniis* lanceolatis, obliquis.

STAM. *Filamenta* quinque, minima, e medio tubi. *Antheræ* conniventes.

PIST. *Germina* duo, cum appendicibus ad latera. *Styli* vix ulli. *Stigmata* obsoleta.

PER. *Folliculi* duo, horizontaliter reflexi, oblongi, utrinque obtusi, juxta latera baseos utrinque lobum emittentes, uniloculares, univalves.

SEM. numerosa, ovata, membranæ majori ovatæ ad basin inserta, imbricata.

400. TABERNÆMONTANA. † *Plum.* 30.

CAL. *Perianthium* quinquefidum, acutum, connivens, minimum.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* cylindraceus, longus. *Limbus* quinquepartitus, planus: *laciniis* obtusis, obliquis.

Nectarii glandulæ quinque, bifidæ, germen circumstantes.

STAM. *Filamenta* quinque, minima, e medio tubi. *Antheræ* conniventes.

PIST. *Germina* duo, simplicia. *Stylus* subulatus. *Stigma* oblongum, capitatum.

PER. *Folliculi* duo, horizontaliter reflexi, ventricosi, acuminati, uniloculares, univalves.

SEM. numerosa, ovato-oblonga, obtusa, rugosa, pulpæ immersa, imbricata.

401. VINCA. * *Pervinca Tournef.* 45.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, erectum, acutum, persistens.

COR. monopetala, hypocrateriformis. *Tubus* calyce longior, inferne cylindraceus, superne latior, lineis quinque insculptus: ore pentagono. *Limbus* horizontalis, quinquepartitus: *laciniis* apici tubi adnatis, extrorsum latioribus, oblique truncatis.

STAM. *Filamenta* quinque, brevissima, inflexa, retroflexa. *Antheræ* membranaceæ, obtusæ, erectæ, incurvæ, margine utrinque fariniferæ.

PIST. *Germina* duo, subrotunda, quibus ad latera *corpuscula* duo subrotunda adjacent. *Stylus* utrinque unus communis, cylindraceus; longitudine staminum. *Stigmata* duo: *inferius* orbiculatum, planum; *superius* capitatum, concavum.

PER. *Folliculi* duo, teretes, longi, acuminati, erecti, univalves, longitudinaliter dehiscentes.

SEM. numerosa, oblonga, cylindracea, sulcata, nuda.

402. IGNATIA. *Suppl. p. 20.*

CAL. *Perianthium* inferum, monophyllum, breve, campanulatum, quinquedentatum. *Dentes* erecti, ovati, obtusi.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* filiformis, spithameus, glaber, erectus. *Limbus* planus, quinquepartitus. *Lacinia* oblonga, obtusa, integerrima.

STAM. *filamenta* quinque, receptaculo inserta, longitudine tubi, filiformia, glaberrima. *Anthera* quinque conniventes, & contingentes in *Columinam* oblongam, pentagonam, acutam, hispidam.

PIST. *Germen* minimum, ovatum, glaberrimum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* tenue, bipartitum: *laciniis* subulatis.

PER. *Drupa* pyriformis, glaberrima, magna, unilocularis. *Cortex* ligneus, crassus. *Loculamentum* factum nucleis invicem appressis, nec ullum interstitium datur, unde diversa figura.

SEM. *Nuclei* diversa figura, glaberrimi, magnitudine nucis avellanae, tenui epidermide tecti, substantia solida, cornea, durissima, absque solita lamellatione Cotyledonum: *laterales* irregulariter tetragoni, lateribus interioribus planis, exteriori gibbo, inferiori obliquo: *centralis* diversissimus, hexagonus: apicibus planis.

403. CARISSA.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, acutum, minimum, persistens.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* cylindricus, fauce ventricosior, limbo longior. *Limbus* quinquepartitus, planus: *laciniis* oblongis.

STAM. *Filamenta* quinque, brevissima, in summo tubi.
Antheræ oblongæ, intra faucem.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* simpliciusculum.

PER. *Baccæ* binæ, oblongæ, biloculares. *Rumpb.*

SEM. 7. f. 8. ovalia, compressa.

404. JACQUINIA. † *Jacq. amer.* 53.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum : *foliis* subrotundis, concavis, persistentibus.

COR. monopetala; *Tubus* campanulatus, ventricosus, calyce longior. *Limbus* decemfidus: *laciniis* subrotundis: quarum, quinque interiores breviores.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, e receptaculo exorta. *Antheræ* hastatæ.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* longitudine staminum. *Stigma* capitatum.

PER. *Bacca* subrotunda, acuminata, unilocularis.

SEM. unicum, subrotundum, cartilagineum.

405. XYSTRIS. *Schreb.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum, persistens: *laciniis* lanceolatis, basi angustatis, acutis, patentibus, hispidis.

COR. monopetala. *Tubus* brevissimus. *Limbus* quinquepartitus: *laciniis* ovatis, obtusis, venosis, patentibus.

STAM. *Filamenta* quinque, setacea, erecta, apice divergentia, corolla breviora, medio tubi inserta. *Antheræ* parallelepipedæ, erectæ.

PIST. *Germen* globosum, acuminatum, superum. *Styli* duo, capillares, erecti, inferne coaliti. *Stigmata* obtusa.

PER. *Drupa* globosa, basi villis brevibus, prostratis, medio calycis insertis, cincta.

SEM. *Nux* globosa, sulcata, decemlocularis. *Nuclei* oblongi.

406. BASSOVIA. *Aubl.* 85.

CAL. *Perianthium* monophyllum, persistens, quinquepartitum: *laciniis* ovatis, acutis.

COR. monopetala. *Tubus* brevissimus. *Limbus* quinquefidus, patens: *laciniis* ovatis, acutis, calyce majoribus.

STAM. *Filamenta* quinque, tubo corollæ inserta, ejusque laciniis opposita. *Anthera* ovata.

PIST. *Germen* ovatum, glandulæ insidens. *Stylus* brevis. *Stigma* crassiusculum, obtusum.

PER. *Bacca* ovata, nodulosa.

SEM. plurima, minuta, reniformia, membranula cincta, in pulpa nidulantia.

407. LAUGERIA. † *Jacq. amer. 61.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulosum, superum, ore inæquali, parvum, deciduum.

COR. monopetala, hypocrateriformis. *Tubus* longissimus; *Limbus* quinquefidus: *laciniis* obovatis.

STAM. *Filamenta* quinque brevissima. *Anthera* lineares, longæ, sub fauce.

PIST. *Germen* subovatum, inferum. *Stylus* filiformis, tubo paulo longior. *Stigma* capitatum.

PER. *Drupa* subrotunda, puncto umbilicata.

SEM. *Nux* subrotunda, quinquefulcata, quinquelocularis.

408. PÆDERIA.

CAL. *Perianthium* monophyllum, turbinatum, quinque-dentatum, persistens.

COR. monopetala, infundibuliformis, intus hirsuta. *Limbus* quinquefidus, parvus

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, brevissima, e medio tubi. *Anthera* oblongæ, corolla breviores.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* capillaris, bifidus, longitudine corollæ. *Stigmata* simplicia.

PER. *Bacca* fragilis, ovata, inllata. *Rumph.*

SEM. duo, ovata.

409. VARRONIA. *Brown. t. 13. f. 2. Jacq. amer. 40.*

CAL. *Perianthium* monophyllum; tubulatum, quinque-dentatum: denticulis recurvis, persistens.

COR. monopetala, tubulosa, cylindrica: *Limbus* quinquepartitus. patens.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, longitu line corollæ. *Stigmata* quatuor, setacea.

PER. *Drupa* ovata, unilocularis, calyce inclusa, libera.

SEM. *Nux* quadrilocularis, subrotunda.

410. CORDIA. Plum. 14. Sebestena Dill. elth.

225.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, apice dentatum, persistens.

COR. monopetala. infundibuliformis. *Tubus* patulus, longitudine calycis. *Limbus* erecto-patens, sectus in quinque (quatuor vel sex) *laciniis* obtusas.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata. *Antheræ* oblongæ, longitudine tubi.

PIST. *Germen* subrotundum, acuminatum. *Stylus* simplex, longitudine staminum, superne bifidus, *laciniis* bifidis. *Stigmata* obtusa.

PER. *Drupa* globosa, acuminata, calyci accreta.

SEM. *Nux* sulcata, quadrilocularis.

OBS. C. spinescens calyce & corolla campanulata est.

411. EHRETIA. Brown. t. 16. f. 1. Jacq.

amer. 45.

CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum, semiquinquesidum, obtusum, minimum, persistens.

COR. monopetala. *Tubus* calyce longior. *Limbus* quinquesidus: *laciniis* subovatis, planis.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, patula, longitudine corollæ. *Antheræ* subrotundæ, incumbentes.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis, superne crassior, longitudine staminum. *Stigma* obtusum, marginatum.

PER. *Bacca* subrotunda, unilocularis.

SEM. quatuor hinc convexa, inde angulata.

OBS. *Be rre rie* *Semina* bilocularia sunt.

OBS. *Bacca* nunc bilocularis & *Semina* solitaria, bilocularia audiunt. *Syst. Veg.* p. 230.

412. TOURNEFORTIA. * Pittonia Plum. 3.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, parvum: *laciniis* subulatis, persistentibus.

COR. *monopetala*, infundibuliformis. *Tubus* cylindricus, basi globosus. *Limbus* semiquinquefidus, patens: *laciniis* acuminatis, horizontalibus, medio gibbis.

STAM. *Filamenta* quinque subulata, ad faucem corollæ. *Anthera* simplices, in fauce corollæ, conniventes, acuminatæ.

PIST. *Germen* globosum, superum. *Stylus* simplex, longitudine staminum, clavatus. *Stigma* recutitum, integrum.

PER. *Bacca* globosa, bilocularis, apice duobus poris perforata.

SEM. quatuor, subovata, pulpa distincta.

413. GYNOPOGON. *Forst. charact. gen.* 18.

CAL. *Perianthium* inferum, monophyllum, minimum, persistens, semiquinquefidum: *laciniis* linearibus, acutis, erectis.

COR. *monopetala* Contorta. *Tubus* cylindræus, sub apice ventricosus, ad faucem coarctatus. *Limbus* planus quinquepartitus, *laciniis* ovato-cordatis.

STAM. *Filamenta* quinque, brevissima, tubo supra medium inserta. *Anthera* erectæ, lineares, intra tubum.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, tubo dimidio brevior. *Stigma* globosum, didymum, apice villosum.

PER. *Bacca* pedicellata, subglobosa, coriacea, nucleo repleta.

SEM. *Nucleus* cartilagineus, subbilocularis, seminibus subsolitariis.

ORS. *Fructus* plerumque abortit, *nucleo* seminibus destituto. *Germina* secta bilocularia, loculis dispermis.

414. RAUWOLFIA. * *Plum.* 40. *Jacq. amer.*

47.

CAL. *Perianthium* quinquedentatum, minimum, persistens.

COR. *monopetala*, infundibuliformis. *Tubus* cylindraceus basi globosus. *Limbus* quinquepartitus, planus: *laciniis* subrotundis, emarginatis.

STAM. *Filamenta* quinque, tubo breviora. *Anthera* erectæ, simplices, acutæ.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* brevissimus. *Stigma* capitatum.

PER. *Drupa* subglobosa, unilocularis, hinc fulco exarata.

SEM. *Nux* basi convexa, apice depressa, bilocularis.

US. R. canescens *Nucibus* duabus scatet. Jacq.

415. CERBERA. † Ahouaj. Tournef. 434.
Jacq. amer. 48.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum, acuminatum, patens: foliolis ovato-lanceolatis.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* clavatus. *Limbus* magnus, quinquepartitus: laciniis obliquis, obtusis, latere altero magis gibbis; os tubi quinquangulare, quinquedentatum stellato-connivens.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, in medio tubi. *Antheræ* erectæ, conniventes.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis, brevis. *Stigma* capitatum, bilobum.

PER. *Drupa* maxima, subrotunda, carnosa, a latere fulco longitudinali excavata, punctisque duobus.

SEM. *Nux* bilocularis, quadrivalvis, retusa.

416. ARDUINA. † Aut Millero.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, erectum, acutum, parvum, persistens.

COR. monopetala, infundibuliformis: *Tubus* cylindricus, superne subincurvatus. *Limbus* quinquepartitus, acutus, patens.

STAM. *Filamenta* quinque, simplicia, tubo inferiori inserta, eoque breviora. *Antheræ* oblongæ, intra faucem, corollæ.

PIST. *Germen* superum, ovatum. *Stylus* filiformis, longitudine tubi. *Stigma* bifidum, crassiusculum.

PER. *Bacca* globoso-ovalis, bilocularis.

SEM. solitaria, oblonga, dura.

417. CAMAX. Schreb. Ropourea. Aubl. 78.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum: laciniis subrotundis.

COR. monopetala, rotata. *Tubus* brevissimus. *Limbus* quinquepartitus: *laciniis* subrotundis, supra villosis.
 STAM. *Filamenta* quinque, corollæ inter lacinias inserta, villosa. *Antheræ*.

PIST. *Germen* subrotundum, villosum, superum. *Stylus* capillaris. *Stigmata* tria vel quatuor, acuta.

PER. *Bacca* ovata, villosa, quadrilocularis.

SEM. plurima, in pulpa viscida nidulantia.

418. MYRSINE. *

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, parvum: *foliolis* subovatis, persistentibus.

COR. monopetala, semiquinquefida: *laciniis* semiovatis, conniventibus, obtusis.

STAM. *Filamenta* quinque, vix notabilia, medio corollæ inserta. *Antheræ* subulatæ, erectæ, corolla breviores.

PIST. *Germen* subglobosum, corollam fere replens. *Stylus* cylindræus, corolla longior, persistens. *Stigma* magnum, lanigerum, extra florem pendens.

PER. *Bacca* subrotunda, depressa, quinquelocularis.

SEM. solitaria.

OBS. *sæpe unitatem omni numero demit in omni fructificationis parte.*

419. BLADHIA. Thunb. diff. nov. gen. p. 6. Flor. jap. p. 7.

CAL. *Perianthium* monophyllum, persistens, virescens, glabrum, brevissimum, profunde quinquepartitum: *lacinia* ovata, concava, lacero-subferrata, patentes.

COR. monopetala, rotata, decidua, quinquepartita: *lacinia* ovata, obtusæ patentes.

STAM. *Filamenta* quinque, brevissima, corollæ supra faucem inserta, alba. *Antheræ* cordatæ, acutæ, conniventes in conum, flavæ, corolla breviores.

PIST. *Germen* superum, convexum, glabrum, viride. *Stylus* filiformis, albus, corolla longior. *Stigma* simplex, acutum, virescens.

PER. *Bacca* globosa, calyce styloque persistentibus coronata, glabra, unilocularis, pisi minoris magnitudine.

SEM. solitarium, globosum, membrana involutum.

420. CESTRUM. *

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulosum, teres, obtusum, brevissimum: ore quinquefido, erecto, obsoleto.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* cylindraceus, longissimus, tenuis. *Faux* subrotunda. *Limbus* planus, plicatus, quinquefidus: *laciniis* ovatis, æqualibus.

STAM. *Filamenta* quinque, filiformia, longitudinaliter tubo adnata, in medio denticulum introrsum emittentia. *Antheræ* subrotundæ, tetragonæ, intra faucem.

PIST. *Germen* cylindraceo-ovatum, longitudine calycis. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* crassiusculum, obtusum, vix emarginatum.

PER. *Bacca* ovata, unilocularis, oblonga.

SEM. plurima, subrotunda.

OBS. *Bacca* uniloculari a *Lycio* diversum.

421. BRUNFELSIA. †. *Plum.* 22.

CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum, quinque-dentatum, obtusum, minimum, persistens.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* longissimus. *Limbus* planus, quinquefidus, obtusus.

STAM. *Filamenta* quinque, longitudine tubi, cui inserta. *Antheræ* oblongæ.

PIST. *Germen* subrotundum, parvum. *Stylus* filiformis, longitudine tubi. *Stigma* crassiusculum.

PER. *Bacca* globosa, unilocularis.

SEM. numerosa, tunicæ baccae adposita, subrotunda.

422. RANDIA. † *Houft. A. A. obs. Roy.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, ovatum, persistens: ore quinque-dentato.

COR. monopetala, hypocrateriformis. *Limbo* quinquefido: *laciniis* ovatis, acutis.

STAM. *Filamenta* quinque brevissima. *Antheræ* oblongæ, erectæ, intra faucem.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* simplex, cylindricus, longitudine tubi, superne bifidus. *Stigmata* obtusa, inæqualia.

PER. *Bacca* cortice capsulari, ovata, apice truncata, unilocularis.

SEM. plurima, orbiculata, cartilaginea, compressa, pulpa cincta.

423. FAGRÆA. Thunb. diff. nov. gen. p. 34.

CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum, quinquepartitum: *laciniæ* obtusæ, incumbentes, apicæ membranaceæ.

COR. monopetala, infundibuliformis: *Tubus* teres, apice sensim dilatatus, palmaris: *Limbus* contortus, quinquepartitus: *Laciniæ* oblongæ, obliquæ, obtusæ, integræ, patulæ.

STAM. *Filamenta* quinque, tubo inserta, filiformia, æqualia, corolla breviora. *Anthera* didymæ, ovatæ, verticales, extus convexæ, quadrifurcatæ, intus planæ; facile bipartibiles.

PIST. *Germen* superum. *Stylus* filiformis, longitudine corollæ. *Stigma* peltatum, orbiculatum, planum.

PER. *Bacca* ovata, carnosæ, glabra, epidermide recta, bilocularis, magnitudine Pyri minoris.

424. STRYCHNOS.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, minimum, deciduum.

COR. monopetala. *Tubus* cylindraceus. *Limbus* patens, quinquefidus, acutus.

STAM. *Filamenta* quinque, longitudine corollæ. *Anthera* simplices.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* simplex, staminibus longior. *Stigma* crassiusculum.

PER. *Bacca* fragilis, cortice lignoso, globosa, glabra, maxima, unilocularis, pulpa plena.

SEM. orbiculata, depressa, villosa, villis versus peripheriam radiantia.

OBS. f. *potatorum* corolla quinquepartita & calyce quinquefido gaudet.

425. CAPSICUM. * Tournef. 66.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquefidum, erectum, persistens.

COR. monopetala, rotata. *Tubus* brevissimus. *Limbus* semiquinquefidus, patens, plicatus: *laciniis* latis, acutis.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, minima. *Antheræ* oblongæ, conniventes.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, staminibus longior. *Stigma* obtusum.

PER. *Bacca* sine pulpa, ad ovatam figuram accedens, bilocularis, cava, colorata. *Receptacula* dissepimento adnata, exsucca.

SEM. plurima, reniformia, compressa.

OBS *Pericarpium* figura indeterminata est; a congeneribus *Pericarpio* baccato exsucco differt.

426. SOLANUM. * *Tournef.* 62. *Melongena*
Tournef. 65. *Lycopersicon* *Tournef.* 63.

CAL. *Perianthium* monophyllum, semiquinquefidum, erectum, acutum, persistens.

COR. monopetala, rotata. *Tubus* brevissimus. *Limbus* magnus, semiquinquefidus, reflexo-planus, plicatus.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, minima. *Antheræ* oblongæ, conniventes, subcoalitæ, apice poris duobus dehiscentes.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis, staminibus longior. *Stigma* obtusum.

PER. *Bacca* subrotunda, glabra, apice punctato notata, bilocularis: *Receptaculo* utrinque convexo, carnosio.

SEM. plurima, subrotunda, nidulantia.

427. PHYSALIS. * *Alkekengi* *Tournef.* 64.

CAL. *Perianthium* monophyllum, ventricosum, semiquinquefidum, parvum, pentagonum: *laciniis* acuminatis; persistens.

COR. monopetala, rotata. *Tubus* brevissimus. *Limbus* semiquinquefidus, magnus, plicatus, *laciniis* latis, acutis.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, minima, conniventia. *Antheræ* erectæ, conniventes.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis, staminibus fere longior. *Stigma* obtusum.

PER. *Bacca* subglobosa, bilocularis, parva, intra *calycem* maximum, inflatum, clausum, pentagonum, coloratum.

Receptaculum reniforme, duplicatum.

SEM. plurima, reniformia, compressa.

428. ATROPA. * *Belladonna Tournef.* 13. *Mandragora. Tournef.* 12.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum, gibbum: *laciniis* acutis; persistens.

COR. monopetala, campanulata. *Tubus* brevissimus. *Limbus* ventricosus, ovatus, calyce longior: ore parvo quinquefido patulo: *laciniis* subæqualibus.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, e basi corollæ enata, longitudine corollæ, basi conniventia, superne extrorsum divergentia, arcuata. *Antheræ* crassiusculæ, assurgentes.

PIST. *Germen* semi-ovatum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum, inclinatus. *Stigma* capitatum, assurgens, transverso-oblongum.

PER. *Bacca* globosa, calyci magno insidens, bilocularis: *Receptaculo* carnosio, utrinque convexo, reniformi.

SEM. plurima, reniformia.

429. ELLISIA.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum: *laciniis* acutis; dehiscens.

COR. monopetala, infundibuliformis, calyce minor: *Limbo* quinquefido.

STAM. *Filamenta* quinque, tubo breviora. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis, brevis. *Stigma* bifidum, oblongum.

PER. *Capsula* scrotiformis, coriacea, bivalvis, bilocularis, calyce tum maximo, plano, stellari.

SEM. in singulo loculo bina, globosa, nigra, excavato-punctata: sed *semine* altero supra alterum, vix distinctis dissepimento transversali.

430. LYCIUM. * *Jasminoides Niss. A. G.* 1711.

CAL. *Perianthium* subquinquefidum, obtusum, erectum, minimum, persistens.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* cylindraceus, patens, incurvatus. *Limbus* quinquepartitus, obtusus, patulus, parvus.

SRAM. *Filamenta* quinque, subulata, e medio tubi, corolla breviora, tubum barba claudentia. *Antheræ* erectæ.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus simplex*, staminibus longior. *Stigma* bifidum, crassiusculum.

PER. *Bacca* subrotunda, bilocularis.

SEM. plura, reniformia. *Receptacula* convexa, dissepimento affixa.

OBS. L. capsularis *fructus capsula est*.

431. CRYPTOSTOMUM. Schreb. Moutabea Aubl. 274.

CAL. *Perianthium* monophyllum, infundibuliforme, basi ventricosum, coloratum, limbo quinquesido: laciniis lanceolatis, acutis, inæqualibus.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* brevissimus, calycis fauci insertus. *Limbus* quinquesidus: laciniis lanceolatis, acutis, inæqualibus, conniventibus.

Nectarium basi corollæ adnatum, latum, fornicatum, orificium corollæ claudens quiquedentatum.

STAM. *Filamenta* nulla. *Anthera* quinque, singulæ sub singulis denticulis nectarii insertæ.

PIST. *Germen* subrotundum, in fundo calycis: *Stylus* cylindræus, longitudine calycis. *Stigma* capitatum.

PER. *Bacca* globosa, trilocularis.

SEM. solitaria, ovata, acuta, bilo magno notata.

432. OPHIOXYLUM. †

* *Hermaphroditi* flores.

CAL. *Perianthium* quinquesidum, acutum, erectum, minimum.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* longus, filiformis, medio incrassatus. *Limbus* quinquepartitus, patulus, absque nectario.

STAM. *Filamenta* quinque, brevissima, in medio tubi. *Anthera* acuminatæ.

PIST. *Germen* subrotundum. *stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* capitatum.

PER. *Bacca* didyma, bilocularis.

SEM. solitaria, subrotunda.

† *Masculi* flores in eadem planta.

CAL. ut in hermaphroditis (bifidus. *Syst. Veg.* 765.)

COR. monopetala, infundibuliformis; *Tubus* longus; *Limbus* quinquesidus.

Nectarium in ore corollæ, cylindricum, integerrimum.
STAM. *Filamenta* duo, brevissima. *Antheræ* acuminatæ, conniventes intra nectarium.

OBS. *Character generis etiamnum dubius & obscurus.*

433. MENAIS. *Læfl.* 306. *D. Aymen.*

CAL. *Perianthium* triphyllum: *foliis* concavis, laxis, acuminatis, parvis, persistentibus.

COR. monopetala, hypocrateriformis. *Tubus* cylindricus, calyce longior. *Limbus* planus, quinquepartitus: *laciniis* rotundatis.

STAM. *Filamenta* quinque, brevissima, tubo inserta. *Antheræ* subulatæ, ad faucem corollæ.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis, longitudine tubi. *stigmata* duo, oblonga.

PER. *Bacca* globosa, quadrilocularis.

SEM. solitaria, subovata, inde acuta.

434. SIDEROXYLON. *Dill. elth.* 265. *Jacq. amer.* 55.

CAL. *Perianthium* quinquefidum, parvum, erectum, persistens.

COR. monopetala, rotata: *laciniis* quinque, subrotundis, concavis, erectis. *Denticulus* cuspidatus, serratus, ad basin singulæ divisionis petali, introrsum spectans.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, longitudine corollæ, cum denticulis alternantia. *Antheræ* oblongæ, incurvantes.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* subulatus, longitudine staminum. *Stigma* simplex, obtusum.

PER. *Drupa* subrotunda, unilocularis, apice stellato umbilicata.

SEM. *Nux* ovata, unilocularis.

OBS. *Denticuli isti corollæ, modo pro Nectario, modo pro laciniis corollæ sumuntur. Quando autem corollæ laciniæ putantur, erit ipsa corollæ decemfida. Baccam etiam pentaspermam esse. Conf. Syst. Veg. p. 232.*

S. decandrum decem gaudet staminibus, ibid.

435. CHRYSOPHYLLUM. † *Cainito Plum.* 9. *Jacq. amer.* 51.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, parvum: *foliis* subrotundis, obtusis, persistentibus.

COR. monopetala, campanulata: *Limbus* quinquefidus: *laciniis* subrotundis, patentissimis, tubo brevioribus.

STAM. *Filamenta* quinque, sabulata, tubo imposita, conniventia. *Anthera* subrotundæ, didymæ, incumbentes.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* brevissimus. *Stigma* obtusum, subquinquefidum.

PER. *Bacca* globosa, decemlocularis, magna.

SEM. solitaria, ossea, compressa, cicatricula notata, nitida.

OBS. Corollam decemfidam: *laciniis* alternis patulis desinit
Syst. veget. p. 231.

436. ARDISIA. *Ait. Kew.*

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: *foliola* oblonga, persistentia.

COR. monopetala. *Tubus* brevissimus. *Limbus* quinquepartitus: *laciniæ* oblongæ, patulo-reflexæ.

STAM. *Filamenta* quinque, tubo corollæ inserta, subulata, brevissima. *Anthera* lanceolata, erectæ, magnæ.

PIST. *Germen* superum, globosum. *Stylus* filiformis, staminibus longior. *Stigma* simplex.

PER. *Drupa* globosa.

SEM. unicum.

437. AMBROSIA. * *Tournef. 252.*

* *Masculi flores* compositi.

CAL. *Perianthium* commune monophyllum, planum, longitudine flosculorum.

COR. *Composita* uniformis, tubulosa, æqualis, in hemisphærium digesta.

Propria monopetala, tubulosa, infundibuliformis, erecta, quinquefida.

STAM. *Filamenta* (Corollulæ) quinque, minima. *Anthera* erectæ, parallelæ, acuminatæ.

PIST. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* orbiculatum, membranaceum.

REC. *Commune* vix ullum, nudum.

* *Feminei flores* infra masculos, in eadem planta, duplicati.

CAL. *Perianthium* monophyllum, acuminatum, integrum, per-

persistens, ventre cinctum dentibus quinque; uniflorum.

COR. nulla.

PIST. *Germen* ovatum, in fundo calycis. *Stylus* filiformis, longitudine calycis. *Stigmata* duo, setacea, longa, divaricata.

PER. *Nux* subovata, unilocularis, non dehiscens, coronata dentibus quinque acuminatis ex calyce.

SEM. unicum, subrotundum.

438. LEEA. *Auth. Dau. van Royeno.*

* *Masculi* flores.

CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum, quinquefidum.

COR. monopetala. *Tubus* longitudine calycis. *Limbus* quinquefidus, æqualis: laciniis faccatis.

Nectarium basi interioris corollæ adnatum, corolla dimidio brevius, cylindricum, quinquefidum: lobis bifidis.

STAM. *Filamenta* quinque, nectario breviora. *Antheræ* oblongæ, incumbentes.

PIST. *Germen* nullum. *Stylus* simplex. *stigma* obsoletum.

* *Feminei* flores in eadem planta.

CAL. ut in Masculis.

COR. ut in Masculis.

Nectarium ut in Masculis, sed duplicatum: interiore minore.

PIST. *Germen* superum, ovatum. *Stylus* simplex. *Stigma* lacerum

PER. . . . globosum, sexloculare.

SEM. solitaria.

439. SAMOLUS. * *Tournef. 60.*

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, superum, basi obtusum: laciniis erectis, persistentibus.

COR. monopetala, hypocrateriformis. *Tubus* brevissimus, longitudine calycis, patulus. *Limbus* planus, quinquepartitus, obtusus: squamulæ brevissimæ, ad basin sinus limbi, conniventes.

STAM. *Filamenta* quinque, brevía, squamulis corollæ munita. *Antheræ* conniventes, testæ.

PIST. *Germen* inferum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* capitatum.

PER. *Capsula* ovata, calyce cincta, unilocularis, semiquinquevalvis.

SEM. plurima, ovata, exigua. *Receptaculum* globosum, magnum.

440. BELLONIA. *Plum.* 31.

CAL. *Perianthium* monophyllum, superum, semiquinquefidum, persistens: *laciniis* lanceolatis, acutis.

COR. monopetala, rotata. *Tubus* brevissimus. *Limbus* planus, semiquinquefidus, obtusus, magnus.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, erecta, brevissima. *Antheræ* erectæ, conniventes, breves.

PIST. *Germen* inferum. *Stylus* subulatus, rectus, staminibus longior. *Stigma* acutum.

PER. *Capsula* turbinato-ovata, calyce obvoluta, ejusque laciniis conniventibus rostrata, unilocularis.

SEM. numerosa, subrotunda, exigua.

441. VIRECTA. *Suppl.* p. 17.

CAL. *Perianthium* superum, pentaphyllum, persistens. *Foliola* subulato-fetacea, æqualia, erecta. *Dentes* inter foliola calycina minimi, glandulosi, solitarii inter singulam foliolorum par.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* calyce triplo longior, gracilis, æqualis, erectus. *Limbus* quinquepartitus, æqualis, horizontaliter planus. *Lacinie* ovata, integræ.

STAM. *Filamenta* in medio tubi inserta, brevissima. *Antheræ* lineares, subulata, conniventes.

PIST. *Germen* inferum, globosum, intra calycem terminatum, circulo elevato persistente. *Stylus* filiformis, glaber. *Stigma* bipartitum: *laciniis* fetaceis.

PER. *Capsula* globosa, angulata, hispida, calyce coronata, unilocularis. *Receptaculum* carnosum, opplens capsulam, obtectum una serie feminum.

SEM. plurima, parva, angulata, excavato-punctata.

442. MACROCNUM. † *Brown.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, superum, turbinatum, quinquedentatum, persistens.

COR. monopetala, campanulata, quinquefida: *laciniis* ovatis, erectis.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, villosa, corolla breviora. *Antheræ* ovatae, compressæ, in fauce floris.

PIST. *Germen* inferum, conicum. *Stylus* simplex, longitudine staminum. *Stigma* crassiusculum, bilobum.

PER. *Capsula* oblonga, turbinata, bilocularis.

SEM. plurima, imbricata.

OBS. *Affine videtur Contortis.*

443. DENTELLA. Forst. charact. gen. 13.

CAL. *Perianthium* superum, quinquepartitum, *solidis* subulatis.

COR. monopetala, tubulosa, calyce longior. *Tubus* sensim ampliatus in *Limbum* quinquefidum, parentem: *laciniis* acutis, tridentatis, denticulo intermedio productiori.

STAM. *Filamenta* quinque, brevia, subulata, ad basin tubi inserta. *Antheræ* parvæ.

PIST. *Germen* inferum, villosum. *Stylus* cylindricus, brevis, crassiusculus. *Stigmata* duo, stylo crassiora, longiora, patentia.

PER. *Capsula* infera, globosa, calyce coronata, bilocularis.

SEM. plurima, ovata.

444. UNCARIA. Schreb. Ourouparia Aubl. 68.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, superne ampliatus, quinquedentatus: *denticulis* acutiusculis, æqualibus.

COR. monopetala, hypocrateriformis. *Talus* angustus, calyce longior. *Limbus* quinquefidus: *laciniis* subrotundis, externe villosis.

STAM. *Filamenta* quinque, brevissima, tubo infra orificium inserta. *Antheræ* oblongæ, in ore tubi.

PIST. *Germen* subrotundum, fundo calycis innatum, glandula coronatum. *Stylus* capillaris, corolla longior. *Stigma* oblongum, bifidum.

PER. . . . biloculare

SEM. plurima, dissepimento affixa.

445. RONDELETIA. † Plum. 12.

CAL. *Perianthium* monophyllum, superum, quinquepartitum, acutum, persistens.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* cylindraceus, calyce longior, apice ventriculosus. *Limbus* quinquepartitus, reflexo-planus: *laciniis* subrotundis.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, longitudine fere corollæ. *Antheræ* simplices.

PIST. *Germen* subrotundum, inferum. *Stylus* filiformis, longitudine corollæ. *Stigma* bifidum.

PER. *Capsula* subrotunda, coronata, bilocularis.

SEM. plura s. rarius solitaria.

446. CHIMARRHIS. Jacq. amer. p. 61.

CAL. *Perianthium* margo integer, coronans germen, persistens.

COR. *Petalum* infundibuliforme. *Tubus* brevissimus. *Limbus* quinquefidus: *laciniis* lanceolatis, concavis, obtusis, inferne lineola longitudinali media hirsutis, patentibus.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, basi hirsuta, infra divisuras limbi, longitudine corollæ. *Antheræ* ovales, erectæ.

PIST. *Germen* subrotundum, inferum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* bifidum, obtusum.

PER. *Capsula* subovata, obtusa, coronata, bilocularis, bivalvis: valvulis apice bifidis.

SEM. solitaria.

447. CINCHONA. Quinquina Condam. Aët. Gall. 1738.

CAL. *Perianthium* monophyllum, superum, campanulatum, quinquedentatum, persistens.

COR. monopetala, infundibuliformis, quinquepartita: *Tubo* longo: *laciniis* oblongis, tubo brevioribus, apice lanatis.

STAM. *Filamenta* quinque, minima. *Antheræ* oblongæ, intra faucem corollæ.

PIST. *Germen* subrotundum, inferum. *Stylus* longitudine corollæ. *Stigma* crassiusculum, oblongum, simplex.

PER. *Capsula* oblonga, calyce coronata, bipartibilis, dehiscens in duas partes interius dehiscentes, dissepimento parallelo.

SEM plurima, imbricata, oblonga, compressa, marginata.

OBS. Flos interdum demit quintam partem numeri in singulis partibus.

448. CYRTANTHUS. Schreb. Posoqueria Aubl. 51.

CAL. *Perianthium* monophyllum, turbinatum, quadrifidum, superum, persistens: *laciniis* acutis, erectis.

COR. monopetala. *Tubus* longissimus, cylindraceus, recurvus, sub limbo amplius, ore pilis cincto. *Limbus* quinquepartitus: *laciniis* oblongis, obtusis, reflexis.

STAM. *Filamenta* quinque, brevissima, incurva, ori tubi inserta: quorum unum paullo brevius. *Antheræ* oblongæ, utrinque acutæ, basi affixæ: quatuor incurvæ, quinta recta.

PIST. *Germen* inferum. *Stylus* setaceus, longitudine & situ tubi. *Stigma* trifidum, parvum.

PER. *Bacca* ovata, magna, (fulcata?) pulpa succulentata repleta, unilocularis, calyce coronata.

SEM. duodecim circiter, angulata, nidulantia.

449. LIGHTFOOTIA. Schreb.

CAL. *Perianthium* quinquedentatum, superum, acutum, persistens.

COR. monopetala, hypocrateriformis, coriacea. *Tubus* longus, rectus, cylindraceus, obsolete angulatus, superne amplius, ore anulo elevato, crenulato. *Limbus* planus, quinquepartitus: *laciniis* subrotundis.

STAM. *Filamenta* quinque, brevissima. *Antheræ* paralepipedæ, erectæ, e tubo prominentes.

PIST. *Germen* inferum, hemisphæricum, obsolete pentagonum. *Glandula* annulari carnosâ coronatum. *Stylus* tubo corollæ dimidio brevior, inferne incrassatus. *Stigma* bifidum.

PER. *Bacca* subglobosa? bilocularis, calyce coronata,

SEM. plurima, parva, receptaculo globoso in medio dissepimenti adfixa.

450. BERTIERA. *Aubl. 69.*CAL. *Perianthium* turbinatum, quinquedentatum.COR. monopetala. *Tubus* brevis: ore villosus. *Limbus* quinquefidus: laciniis ovatis, acutis, patentibus.STAM. *Filamenta* quinque, brevissima, tubo infra orificium inserta. *Antheræ* lineares, erectæ.PIST. *Germen* subrotundum, inferum. *Glandula* coronatum. *Stylus* filiformis. *Stigma* bilamellatum.PER. *Bacca* globosa, dentibus calyciis coronata, bilocularis.

SEM. plurima, subrotunda, dissipatione adfixa.

451. PORTLANDIA. † *Brown. t. 11. Jacq.*CAL. *Perianthium* pentaphyllum, superum: foliolis oblongo-lanceolatis, persistentibus.COR. monopetala. *Tubus* longus, infundibuliformi-ventricosus. *Limbus* tubo brevior, quinquepartitus, acutus.STAM. *Filamenta* quinque, subulata, declinata, longitudine fere corollæ, ex tubi fundo orta. *Antheræ* lineares, erectæ, longitudine corollæ.PIST. *Germen* pentagonum, subrotundum, inferum. *Stylus* simplex, longitudine staminum. *Stigma* oblongum, obtusum.PER. *Capsula* obovata, quinquefidiata, quinquangularis, rerusa, bilocularis, bivalvis, ab apice dehiscens, dissipatione contraria.

SEM. plurima, subrotunda, compressa, imbricata.

OBS. *P. hexandra* sex stamina habet.*P. tetrandra* quatuor: *limbus* quadrifidus.452. SOLANDRA. *Swartz. prodr.*

CAL. rumpens.

COR. infundibuliformis, maxima.

STAM. inclinata.

Bacca supera 4-locularis, polysperma.

453. ROELLA. *

CAL. *Perianthium* monophyllum, turbinatum, quinquepartitum, persistens, superum: laciniis lanceolatis, acutis, dentatis, magnis.

COR. monopetala, infundibuliformis, decidua. *Tubus* calyce paulo brevior. *Limbus* erecto-patens, quinquepartitus, calyce longior.

Nectarium e squamis quinque, conniventibus, in fundo corollæ.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, nectario insidentia. *Anthera* subulata, conniventes, longitudine filamentorum, altitudine calycis.

PIST. *Germen* oblongum, inferum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigmata* duo, oblonga, depressa, patentia.

PER. *Capsula* cylindracea, calyce brevior, coronata calyce patenti, majoreque facto, bilocularis.

SEM. plurima, angulata.

OBS. *Campanulæ affinis.*

454. PHYTEUMA. * *Rapunculus Tournef.* 38.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum, acutum erecto-patens, superum.

COR. monopetala, rotata, patens, quinquepartita. *laciniis* linearibus, acutis, recurvis.

STAM. *Filamenta* quinque, corolla breviora. *Anthera* oblonga.

PIST. *Germen* inferum. *Stylus* filiformis, longitudine corollæ, recurvus. *Stigma* bi-f. trifidum, oblongum, revolutum.

PER. *Capsula* subrotunda, bi-f. trilocularis.

SEM. plurima, parva, subrotunda.

455. CAMPANULA. * *Tournef.* 37. *Canarina. Linn.*

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, acutum, erecto-patens, superum.

COR. monopetala, campanulata, basi impervia, semiquinquefida, marcescens: *laciniis* latis, acutis, patulis.

Nectarium in fundo corollæ, constructum *valvulis* quinque, acutis, conniventibus, receptaculum tegentibus.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, brevissima, inserta valvularum *Nectarii* apicibus. *Anthera* filamentis longiores, compressæ.

PIST. *Germen* angulatum, inferum, *Stylus* filiformis,

staminibus longior. *Stigma* tripartitum, oblongum, crassiusculum: *laciniis* revolutis.

PER. *Capsula* subrotunda, angulata, tri-quinque-locularis, totidem foraminibus lateralibus emittens feminas

SEM. numerosa, parva. *Receptaculum* columnare, adnatum.

Obs. *Pericarpium* figura indeterminata est.

TRACHELII *Raj.* *pericarpium* villosum, scabrum, trilobulare.

RAPUNCULI *Raj.* *Pericarp.* glabrum, ovatum, trilobulare.

MEDII *Kn.* *Pericarpium* valvis s. testum, quinquelobulare.

SPECULI VENERIS *Raj.* *Peric.* columnare, prismaticum, trilobulare.

Pentagonia *Covolla* rotata.

Erinus *Covolla* inæquali, *Stigmate* simplici, *Capsula* apice debiscente distinctus.

456. SCÆVOLA. † *Lobelia* *Plum.* *Jacq.*

CAL. *Perianthium* superum, brevissimum, quinquefidum, persistens.

COR. monopetala, inæqualis: *Tubus* longus, fissura longitudinali. *Limbus* quinquefidus, adscendens: *laciniis* secundis, lanceolatis, margine membranaceis.

STAM. *Filamenta* quinque, brevia, capillaria, receptaculo inserta. *Antherae* distinctæ, erectæ, oblongæ, obtusæ.

YST. *Germen* inferum, ovatum. *Stylus* filiformis, superne crassior, staminibus longior, e fissura egressus, versus limbum incurvatus. *Stigma* applanatum, obtusum, ore aperto.

PER. *Drupa* subrotunda, puncto umbilicata, unilocularis.

SEMI. *Nux* ovata, rugosa, acuta, bilocularis.

Obs. *Differt a Lobeliis fructu, lactis absentia, reliquis, teste Fa quinio.*

457. TRACHELIUM. * *Tournef.* 30.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, minimum, superum.

COR monopetala, infundibuliformis: *Tubus* cylindraceus, longissimus, tenuissimus. *Limbus* patulus, parvus, quinquepartitus: *laciniis* ovatis, concavis.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, longitudine corollæ. *Antheræ* simplices.

PIST. *Germen* triquetro-subrotundum, inferum. *Stylus* filiformis, corolla duplò longior. *Stigma* globosum.

PER. *Capſula* subrotunda, obtuse triloba, trilocularis, trivalvis.

SEM. numerosa, minima.

458. MATTHIOLA. Plum. 6. Pont. 4. 38.

CAL. *Perianthium* cylindraceum, integerrimum, erectum, breve, persistens.

COR. *Petalum* unicum, longissimum, e tubo tenui lente desinens in *Limbum* integrum, ore repando.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, corolla breviora. *Antheræ* simplices.

PIST. *Germen* globosum, inferum. *Stylus* filiformis, longitudine corollæ. *Stigma* crassiusculum, obtusum.

PER. *Drupa* globosa, calyce coronata, unilocularis.

SEM. *Nux* globosa. *Nucleus* globosus.

459. CEPHÆLIS. Swartz prodr.

Flores capitati involucrati.

Corolla tubulosa.

Stigma 2-partitum.

Bacca bisperma.

Receptaculum palæaceum.

460. MORINDA. † Vaill. A. G. 1722. Rोज Plum. 26. Phillyreastrum Vaill. A. G. 1722.

CAL. *Receptaculum* commune subrotundum, in globum colligit flores sessiles.

Perianthium quinquedentatum, vix notabile, superum.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* cylindraceus. *Limbus* quinquefidus, acutus, patentissimus: laciniis lanceolatis, planis.

STAM. *Filamenta* quinque, brevissima, superne tubo in-

ferta. *Antheræ* lineares, erectæ, longitudine fere tubi.

PIST. *Germen* inferum. *Stylus* simplex. *Stigma* bifidum, crassiusculum.

PER. *Bacca* subovata, angulata, compressa undique ab adjacentibus, truncata, unilocularis.

SEM. bina, hinc convexa, inde plana.

461. **PSYCHOTRIA.** † *Psychotrophum*
Brown. jam. t. 17. f. 2. Jacq. amer. 65.

CAL. *Perianthium* minimum, quinquedentatum, superum, persistens.

COR. monopetala, hypocrateriformis: *Tubus* longus: *Limbus* brevis, quinquefidus: *laciniis* subovatis, acutis.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria. *Antheræ* lineares, tubum non superantes.

PIST. *Germen* inferum. *Stylus* filiformis. *Stigma* bifidum: *laciniis* crassiusculis, obtusis.

PER. *Bacca* subrotunda, unilocularis, calyce coronata.

SEM. duo, hemisphærica, hinc convexa quinquesulcata, inde plana.

462. **COFFEA.** * *Coffe* *Juss. A. G. 1713.*
Jacq. amer. 67.

CAL. *Perianthium* quadridentatum, minimum, superum.

COR. monopetala, hypocrateriformis. *Tubus* cylindraceus, tenuis, calyce multoties longior. *Limbus* planus, quinquepartitus, tubo longior: *laciniis* lanceolatis: lateribus revolutis.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, tubo corollæ imposita. *Antheræ* lineares, incumbentes, longitudine filamentorum.

PIST. *Germen* subrotundum, inferum. *Stylus* simplex, longitudine corollæ. *Stigmata* duo, reflexa, subulata, crassiuscula.

PER. *Bacca* subrotunda, puncto umbilicata.

SEM. bina, elliptico-hemisphærica, hinc gibba, inde plana, arillo involuta.

Obs. *C. occidentalis* *Jacq. differt flore quadrifido & semine unico inferne quadrilobo.*

463. CHIOCOCCA. † *Brown. Jacq. amer.* 68.CAL. *Perianthium* quinquedentatum, superum, persistens.COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* longus, patens. *Limbus* quinquepartitus: *laciniis* æqualibus, acutis, reflexis.STAM. *Filamenta* quinque, filiformia, longitudine corollæ. *Antheræ* oblongæ, erectæ.PIST. *Germen* inferum, subrotundum, compressum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* simplex, obtusum.PER. *Bacca* subrotunda, compressa, coronata calyce, unilocularis.

SEM. duo, subrotunda, compressa, distantia.

464. CALLICOCCA *Schreb. Tapogomea Aubl.* 60. 63. *Carapichea Aubl.* 64. *Evea Aubl.* 39.CAL. *Involucrum* subtetraphyllum, magnum. *Flores* plures, sessiles, paleis distincti.*Perianthium* quinquedentatum, superum.COR. monopetala. *Tubus* cylindraceus, supra ampliatum. *Limbus* quinquefidus, patens.STAM. *Filamenta* quinque, capillaria. *Antheræ* oblongæ, erectæ.PIST. *Germen* angulatum, inferum, *Glandula* coronatum. *Stylus* capillaris, bifidus. *Stigmata* obtusa.PER. *Bacca* angulata, unilocularis.

SEM. duo, hinc plana, inde convexa, angulata.

OBS. *Involucrum* modo pent- / tetraphyllum, modo monophyllum, modo nullum est. *Fructus* in *Carapichea Aubl.* succus. *Flores* in *Evea* quadrifidi. S.465. BÆOBOTRYS. *Forst. charact. gen. n.* II.CAL. *Perianthium* duplex: exterius diphyllum, foliolis subrotundis, concavis, minoribus.*Interior* monophyllum, campanulatum, breve, inferum, germi adnatum, quinquefidum: *laciniis* ovatis, persistentibus, post efflorescentiam conniventibus, & fructum coronantibus.

COR. monopetala, tubulosa, calyci inserta. *Tubus* brevissimus. *Limbus* quinquefidus, erectus: *laciniis* rotundatis, brevissimis.

STAM. *Filamenta* quinque, brevissima, in medio tubi. *Anthera* cordata.

PIST. *Germen* globosum, semi-superum. *Stylus* cylindricus, brevissimus, persistens. *Stigma* obtusum, apice tuberculatum.

PER. *Bacca* globosa, subsecca, unilocularis, calyci accreta.

SEM. plura, angulosa, affixa receptaculo columnari, in fundo baccae.

466. GARDENIA. *Suppl. p. 23. Thunb. dis. de Gardenia p. 11.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum: *laciniis* erectis, persistentibus.

COR. monopetala, infundibuliformis: *Tubus* cylindricus, calyce longior. *Limbus* quinquepartitus, planus.

STAM. *Filamenta* nulla. *Anthera* quinque, ori tubi inserta, lineares, striatae, longitudine dimidia limbi.

PIST. *Stigma* exsertum, ovatum, obtusum, bilobum.

PER. *Bacca*.

SEM. plurima, depressa, per series imbricatim imposita.

OBS. *Numerus partium naturalissimus est quinarius: in quibusdam vero speciebus variat usque ad novem, scilicet antherarum, laciniarum calycis & limbi corollae.*

467. GENIPA. *Tournef. 436. 437.*

CAL. *Perianthium* est margo germinis integer, superus.

COR. monopetala, rotata. *Tubus* brevissimus, infundibuliformis. *Limbus* magnus, quinquepartitus, patens: *laciniis* ovatis, acutis.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, reflexa, corolla breviora. *Anthera* subrotunda, conniventes.

PIST. *Germen* ovatum, inferum. *Stylus* simplex, brevis. *Stigma* clavatum, magnum, longitudine staminum.

PER. *Bacca* carnosa, ovata, utrinque attenuata, truncata, bilocularis.

SEM. plura, nidulantia, cordata.

468. LONICERA. * *Caprifolium* Tournef.
 378. *Periclymenum* Tournef. 378.
Chamæcerasus Tournef. 379. *Xylo-*
steum Tournef. 379. *Symphoricarpos*
Dill. elth. 273.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, superum, parvum.
 COR. monopetala, tubulosa. *Tubus* oblongus, gibbus.
Limbus quinquepartitus: *laciniis* revolutis; quarum
 una profundius separata.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, longitudine fere
 corollæ. *Anthera* oblonga.

PIST. *Germen* subrotundum, inferum. *stylus* filiformis,
 longitudine corollæ. *stigma* obtuso-capitatum.

PER. *Bacca* umbilicata, bilocularis.

SEM. subrotunda, compressa.

Obs. *Caprifolium*. *Corollæ* *lacinia* inferiori duplo profun-
 dius separata. *Baccæ* distinctæ.

Periclymenum. *Corollæ* *laciniis* fere æqualiter profunde
 sectis. *Baccæ* distinctæ.

Chamæcerasus *Corollæ* *lacinia* inferiori duplo profundius
 secta. *Baccæ* duæ eidem basi insistentes.

Xylosteum. *Corollæ* *laciniis* fere æqualiter profunde sectis.
Baccæ duæ eidem basi insistentes.

Symphoricarpos. *Corollæ* fere campanulata; *Fruſtus* bi-
 locularis, semiquadrilocularis, seminibus solitariis.

L. alpigena & *cærulea* *Germine* unico pro duobus floscu-
 lis est singularis, uti *Mitchella*.

469. TRIOSTEUM. † *Triosteospermum*.
Dill. elth. 223.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, superum, patens,
 longitudine corollæ: *foliolis* lanceolatis, persistentibus.

COR. monopetala, tubulosa; *Limbus* tubo brevior, quin-
 quepartitus, erectus: *Lobis* rotundatis, inferioribus
 minoribus.

STAM. *Filamenta* quinque, filiformia, longitudine co-
 rollæ. *Anthera* oblonga.

PIST. *Germen* subrotundum, inferum. *Stylus* cylindri-
 cus, longitudine staminum. *stigma* crassiusculum.

PER. *Bacca* obovata, subtrigona, trilocularis.

SEM. solitaria, ossea, obtusa, sulcata, obtuse trigona,

470. MUSSÆNDA. † *Burm.*

CAL. *Perianthium* superum, quinquepartitum, inæquale : *foliis* lineari-acuminatis, persistentibus.

COR. monopetala, infundibuliformis : *Tubo* longo, filiformi, hirsuto ; *Limbo* quinquesido, æquali : *laciniis* ovatis.

STAM. *Filamenta* quinque, longitudine corollæ, tubo interne adnata. *Antheræ* lineari-fetacæ, longæ, intra tubum.

PIST. *Germen* inferum, ovatum. *Stylus* filiformis. *Stigmata* duo, simplicia, crassiuscula.

PER. *Bacca* oblonga, coronata.

SEM. numerosa, in quatuor phalanges digesta.

471. HAMELLIA. † *Jacq. amer.* 71.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, acutum, minimum, superum, erectum, persistens.

COR. monopetala : *Tubus* quinquangularis, longissimus. *Limbus* quinquepartitus, æqualis, parvus, acutus.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, ad medium corollæ inserta. *Antheræ* oblongæ, lineares, longitudine corollæ.

PIST. *Germen* ovatum apice conico, inferum. *Stylus* filiformis, longitudine corollæ. *Stigma* lineare, obtusum.

PER. *Bacca* ovalis, sulcata, quinquelocularis, coronata.

SEM. plurima, subrotunda, compressa, minima.

472. SCHWENKFELDIA *Schreb. Sabicea*
• *Aubl.* 75. 76.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum, superum, persistens : *laciniis* lanceolatis, acutis.

COR. monopetala, hypocrateriformis. *Tubus* longus, tenuis. *Limbus* quinquepartitus : *laciniis* lanceolatis, acutis.

STAM. *Filamenta* quinque, tubo corollæ inserta. *Antheræ* parallelepipedæ, incumbentes.

PIST. *Germen* inferum. *Stylus* filiformis. *Stigmata* quinque, oblonga.

PER. *Bacca* globosa, calyce coronata, quinquelocularis.

SEM. plurima, minima.

473. ORIBASIA Schreb. Nonatelia. Aubl.

70. 74.

CAL. *Perianthium* quinquedentatum, acutum, superum.

COR. monopetala, tubulosa, limbo quinquefido.

STAM. *Filamenta* quinque, tubo inserta. *Anthera* ovata.

PIST. *Germen* inferum. *Stylus* capillaris, bifidus. *Stigmata* obtusa.

PER. *Bacca* globosa, decemfulcata, quinquelocularis.

SEM. solitaria.

474. STEPHANIUM Schreb. Palicourex
Aubl. 66.

CAL. *Perianthium* monophyllum, turbinatum, quinquedentatum.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* longus, incurvus, superne ventricosus. *Limbus* quinquefidus, inæqualis: *laciniis* patentibus, acutis, (tribus superioribus paullo majoribus, duabus inferioribus minoribus.)

STAM. *Filamenta* quinque, filiformia, medio tubi inserta, ejusque longitudine. *Anthera* oblongæ, incumbentes.

PIST. *Germen* subrotundum, fundo calycis innatum, glandula coronatum. *Stylus* filiformis, corolla brevior. *stigmata* duo, linearia, carnea, longitudine fere styli.

PER. . . biloculare.

SEM. solitaria. . . .

475. ERITHALIS. † Brown. t. 17. f. 3.

CAL. *Perianthium* monophyllum, superum, urceolatum, quinquedentatum, persistens.

COR. monopetala, quinquepartita: tubo brevissimo, *laciniis* lanceolatis, longis, recurvis.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, patula, longitudine vix corollæ. *Anthera* oblongæ.

PIST. *Germen* inferum, subrotundum. *Stylus* filiformis, superne compressus, longitudine staminum. *Stigma* acutum.

PER. *Bacca* globosa, coronata, decemlocularis.

SEM. parva.

476. CANARIUM.

* *Mas.*CAL. *Perianthium* diphyllum: *foliis* ovatis, concavis, persistentibus.COR. *Petala* tria, oblonga, calyciformia.STAM. *Filamenta* quinque, brevissima. *Antheræ* oblongæ, longitudine petalorum.* *Femina.*CAL. ut in *Mare*: *foliis* reflexis.COR. ut in *Mare*.PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* vix ullus. *Stigma* capitatum, trigonum.PER. *Drupa* sicca, ovata, acuminata, basi cincta membrana crenata.SEM. *Nux* ovata, trigona, acuta.477. MELICYTUS. *Forst. charact. gen.* 62.* *Flores Masculi.*CAL. *Perianthium* quinquedentatum, brevissimum.COR. *Petala* quinque, ovata, acuta, horizontalia.*Nectarium* corpuscula quinque, clavata, cyathiformia, apice excavata, latere interiore staminifera, erecta.STAM. *Filamenta* nulla. *Antheræ* quinque, ovato-subrotundæ, interius quadrifurcæ, nectariis a latere interiore longitudinaliter adnatæ, iis paullo longiores.* *Flores Feminei.*CAL. }
COR. } ut in *Masc.**Nectarium*, squamulæ quinque, triangulæ, acutæ, germi adpressæ.PIST. *Germen* ovato-globosum. *Stylus* nullus. *Stigma* planum, quadrilobum, stellatum.PER. *Bacca* ? unilocularis, polysperma.

SEM. minima, angulata.

OBS. *Fructus* non nisi ex germine dissecto cognitus.478. HIRTELLA. † *Jacq. amer.* 8.CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum, laciniis subovatis, reflexis, æqualibus, persistentibus.COR. *Petala* quinque, subrotunda, concava.

STAM.

STAM. *Filamenta* quinque, setacea, planiuscula, longissima, persistencia, tandem spiraliter involuta. *Anthera* orbiculata.

PIST. *Germen* subrotundum, compresso, declinatum, villosum. *Stylus* filiformis, longitudine ferme staminum, e latere depresso germinis ortus. *Stigma* simplex.

PER. *Bacca* ovalis, superne latior, parum compressa, obsolete trigona, ad cujus basin anticam germen villosum & stylus jacent.

SEM. unicum, magnum, figura pericarpium.

OBS. *Stamina* 3 olim ego, nuper Jacquin numeravimus, et 5 perfecta in Herbario Pisonis observavi.

479. **RHAMNUS.** * *Tournef.* 366. *Frangula Tournef.* 383. *Cervi spina Dill. gen.* 8. *Paliurus Tournef.* 387. *Alaternus Tournef.* 366. *Ziziphus Tournef.* 403.

CAL. nullus: nisi corollam pro calyce sumas.

COR. *Petalum* imperforatum, externe rude, interne coloratum, infundibuliforme. *Tubus* turbinato-cylindraceus. *Limbus* patens, divisus, acutus.

Squamulae quinque, minimae, ad basin singulae divisurae singulae, introrsum conniventes.

STAM. *Filamenta* tot, quot laciniae corollae, subulata, petalo sub squamula inserta. *Antherae* parvae.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* obtusum, divisum in pauciores lacinias, quam corolla.

PER. *Bacca* subrotunda, nuda, divisa in pauciores, quam corolla, partes internas.

SEM. solitaria, subrotunda, hinc gibba, inde compressa.

OBS. a. **FRANGULA.** *Stigmate emarginato.* *Bacca tetrasperma.* *Corolla quinquesida.*

b. **CATHARTICUS.** *Stigmate quadrifido.* *Bacca tetrasperma.* *Corolla quadrifida.* *Dioica Tetrandra.*

c. **PALIURUS.** *Styli tres.* *Nucleo triloculari.* *Corolla quinquesida:* margine membranaceo cingente bacam.

d. **ALATERNUS** *Stigmate trifido.* *Bacca trisperma.* *Corolla quinquesida.* *Polygamia dioica per mares & hermaphroditas.* *Squamulae corollarum deficient.*

- c. ZIZIPHUS. *Stylis duobus. Baccæ Nucleus bilocularis: Corolla quinquesida.*

480. RUYSCHIA. *Iacq. amer. 75.*

CAL. *Perianthium* pentaphyllum, persistens: *foliis* subrotundis, concavis, obtusis, conniventibus, imbricatis: auctam basi squamis duabus, foliolorum confimilibus: inter easdemque appendice obovato, acuto, perpendiculariter dependente, antice convexo, postice concavo, majori foliolis.

COR. *Petala* quinque, ovata, planiuscula, obtusa, reflexa, calyce triplo longiora.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, plana, patula, petalis breviora. *Antheræ* oblongæ, incumbentes.

PIST. *Germen* ovato-subrotundum. *Stylus* nullus. *Stigma* quadrangulare, cruciforme, planum.

PER. *Bacca*. — —

SEM. — —

481. CEANOTHUS. *

CAL. *Perianthium* monophyllum, turbinatum: *Limbo* quinquepartito, acuto, connivente-clauso, persistens.

COR. *Petala* quinque, æqualia, subrotunda, fornicato-faccata, compressa, obtusissima, patentia, calyce minora, insidentia unguibus longitudine petali, ex incisuris calycis enatis.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, erecta, petalis opposita, longitudine corollæ. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* trigonum. *Stylus* cylindricus, semitrifidus, longitudine staminum. *Stigma* obtusum.

PER. *Bacca* sicca, tricoeca, trilocularis, obtusa, retusa, tuberculis interstincta.

SEM. solitaria, ovata.

OBS. C. africanus calyce semiquinquesido, stylo ex tribus condonato, stigmatibusque tribus differt.

482. CELASTRUS. * *Euonymoides Isnard. A. G. 1716.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, semiquinquesidum, planum, minimum: *laciniis* obtusis, inæqualibus.

COR. *Petala* quinque, ovata, patentia, sessilia, æqualia, marginibus reflexa.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, longitudine corollæ. *Anthera* minimæ.

PIST. *Germen* minimum. *Receptaculo* magno, plano, decem striis notato, immersum. *Stylus* subulatus, staminibus brevior. *Stigma* obtusum, trifidum.

PER. *Capsula* colorata, ovata, obtuse trigona, gibba, trilocularis, trivalvis.

SEM. pauca, ovata, colorata, glabra, semi-involuta. *Arillo* ore quadrifido, inæquali, colorato.

OBS. *Species* datur stylo nullo, stigmate triplici, proin *Pentandria* triginia affinis.

483. EVONYMUS. * *Tournef.* 388.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum, planum: laciniis subrotundis, concavis.

COR. *Petala* quinque, ovata, plana, patentia, calyce longiora.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, erecta, corolla breviora, germine tanquam receptaculo imposita. *Anthera* didymæ.

PIST. *Germen* acuminatum. *Stylus* brevis, simplex. *Stigma* obtusum.

PER. *Capsula* succulenta, colorata, pentagona, quinqueangularis, quinquelocularis, quinquevalvis.

SEM. solitaria, ovata, obvoluta *Arillo* baccato.

OBS. *Frustrificatio* in quibusdam individuis vel speciebus aufert quintam numeri partem.

Quibusdam Filamenta, præter acumina receptaculi, nulla.

484. VITIS. * *Tournef.* 384.

CAL. *Perianthium* quinquedentatum, minimum.

COR. *Petala* quinque, rudia, parva, caduca.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, erecto-patentia, caduca. *Anthera* simplices.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* nullus. *Stigma* capitato-obtusum.

PER. *Bacca* subrotunda, magna, unilocularis.

SEM. quinque, ossæ, turbinato-cordata, basi contracta, semibilocularia.

OBS. V. *heptaphylla petala apice coharentia, basi decidua habet.*

485. *ELÆODENDRUM*. *Jacq. jun. in act. helv. vol. I. pag. 36.*

CAL. *Perianthium quinquephyllum, persistens: foliolis rotundatis, obtusis, concavis, parvis, patentissimis.*

COR. *Petala quinque, subrotunda, obtusa, concava, patentissima, calyce duplo longiora.*

STAM. *Filamenta quinque, subulata, petalis paullo breviora, non erecta, sed tandem inter petala retrorsum flexa, orta ex disco germinis.*

PIST. *Germen superum, ex disco pentagono assurgens, sensim in stylum conicum, longitudine staminum. Stigma obtusum, bifidum.*

PER. *Drupa ovata, obtusa.*

SEM. *Nux ejusdem figuræ, glabra, lignea, crassissima, durissima, bilocularis. Nuclei solitarii, oblongi, compressi, longitudine fere ipsius nucis, cortice rufo, intus albi.*

OBS. *Numerus petalorum & foliolorum calycis quandoque est quaternarius, etiam senus, stamina tamen semper quinque.*

486. *CORYNOCARPUS*. *Suppl. p. 21. Forst. charact. gen. n. 16.*

CAL. *Perianthium inferum, pentaphyllum. Foliola oblonga, concava.*

COR. *Petala quinque, subrotunda, basi angulata, erecta. Nectarium. Foliola quinque, erecta, petaliformia, sed angustiora, vix breviora, basi glandula globosa aucta, cum petalis alternantia.*

STAM. *Filamenta quinque, subulata, e basi petalorum. Antheræ oblongæ.*

PIST. *Germen superum, globosum. Stylus brevis, filiformis. Stigma obtusum.*

PER. *Nux turbinato-clavata, monosperma.*

SEM. *Nucleus oblongus.*

487. *MANGIFERA*. †

CAL. *Perianthium quinquepartitum: laciniis lauceolatis.*

COR. *Petala quinque, lanceolata, calyce longiora.*

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, patentia, longitudine corollæ. *Antheræ* subcordatæ.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis, longitudine calycis. *Stigma* simplex.

PER. *Drupa* reniformis, oblonga, gibba, compressa.

SEM. *Nucleus* oblongus, compressus, lanuginosus.

OBS. *M. pinnata floribus decandris gaudet.*

488. CEDRELA. † Cedro Læfl. 183. Cedrela. Brown. t. 10. f. 1.

CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum, minimum, quinquedentatum, marcescens.

COR. infundibuliformis, pentapetala, tubo inferne ventricoso: *Petala* lineari-oblonga, obtusa, erecta, ad ½ inferne receptaculo adnata.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, receptaculo infidentia, corolla breviora. *Antheræ* oblongæ, apice extrorsum flexæ.

PIST. *Receptaculum* proprium quinquangulare. *Germen* globosum. *Stylus* cylindricus, longitudine corollæ. *Stigma* capitatum, depressum.

PER. *Capsula* lignosa, subrotunda, quinquelocularis, quinquevalvis: valvulis deciduis.

SEM. numerosa, carnosa, deorsum imbricata, ala membranacea terminata. *Receptaculum* lignosum, quinquangulare, liberum.

OBS. *Conferatur Swietenia.*

489. CALODENDRUM. Thunb. diff. nov. gen. p. 41.

CAL. *Perianthium* monophyllum, persistens, quinquepartitum: *laciniæ* ovatæ, acutæ, crassiusculæ: intus glabræ, albidæ: extus villoso-muricatæ, marginibus subrevolutis: corolla multoties breviores.

COR. ante explicationem quinquangularis, longitudine calycis: explicata pentapetala. *Petala* lanceolata, obtusa, patentia, intus canaliculata, extus carinata, undulata, villosa, calyce triplo longiora, unguicularia, incarnata.

Nectaria quinque, petaliformia, intra petala receptaculo inserta, lineari-lanceolata, apice subu-

lata, glandula terminata, corolla angustiora, ejusdem vero longitudine, glabra, argenteo-glandulosa.

STAM. *Filamenta* quinque, æqualia, longitudine corollæ, alba: quatuor antheriferis, unoque sterili. *Anthera* ovata, fulcata, cordata, brunnea, dorso inferta.

PIST. *Germen* superum, pedicellatum, capitatum, muricatum, fuscum. *Stylus* lateri altero germinis insertus, filiformis, longitudine filamentorum. *Stigma* simplex, obtusum.

PER. *Capsula* ovata, quinquangularis, angulis obtusis, quinquelulca, muricata, pedunculata, quinquevalvis, quinquelocularis, magnitudine Pruni.

SEM. bina in singulo loculamento, subtriangularia, dorso convexa, glabra, brunnea, magnitudine Pisi.

OBS. *Differt a Cedrela: nectario.*

a Salvagesia: capsula quinqueloculari.

Variat flaminum numero: quæ sæpe sex, non raro quatuor. Cum Dictamno capensi unam eandemque esse plantam suspicatur Illustr. Dahl l. c.

490. DIOSMA. * Hartogia. Edit. VI.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: *foliolis* ovatis, acutis, persistentibus.

COR *Petala* quinque, ovata, obtusa, sessilia, erecto-patula.

Nectaria quinque, germini imposita.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata. *Anthera* subovata, erecta.

PIST. *Germen* coronatum nectario. *Stylus* simplex, longitudine flaminum. *Stigma* obsoletum.

PER. *Capitula* tres s. quinque, ovato-acuminata, compressa, margine introrsum coalita, apicibus distantes, tutura superiori dehiscences.

SEM. solitaria, oblonga, ovato-depressa, apice acuminata.

Arillus elasticus, hinc dehiscens, singulum involvens semen.

OBS. *Polymorphum genus sexu, nectariorum figura, capsularum numero, suavit divisionem in Diosmata & Hartogias, sed utraque demum plures observationes retraxerunt in unam. Syst. Veg. p. 240.*

Sunt species floribus monoicis, aliæ hermaphroditis; aliæ univiribus 10, quorum 5 sterilia, aliæ aliter a congeneribus differunt.

491. HOVENIA. Thunb. *diff. nov. gen. p. 7.*
Flor. jap. p. 7.

CAL. *Perianthium* monophyllum, basi intus pilosum, quinquepartitum, persistens dentibus deciduis: *lacinia* ovata, reflexa, supra lineam mediam elevata, decidua.

COR. pentapetala. *Petala* inter lacinias calycis inserta, obovata, obtusissima, patula, convoluta, stamina obvolvencia, alba, longitudine dentium calycis.

STAM. *Filamenta* quinque, basi calycis inserta, calyce breviora. *Antheræ* subrotundæ, intra petala reconditæ.

PIST. *Germen* superum, convexum, glabrum. *Stylus* unicus, erectus, calyce multo brevior. *Stigmata* tria, patula, reflexa, obtusa.

PER. *Capsula* ovato-globosa, trifulca, glabra, trivalvis, trilocularis, magnitudine piperis.

SEM. in singulo loculamento unicum, lenticulare, glaberrimum, rubrum.

492. CLAYTONIA. * Gronov.

CAL. *Perianthium* bivalve, ovatum, basi transversum.
COR. *Petala* quinque, obcordata, unguiculata, emarginata.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, recurva, corolla paulo breviora, singula unguibus petalorum inserta. *Antheræ* oblongæ, incumbentes.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* simplex, longitudine staminum. *Stigma* trifidum.

PER. *Capsula* subrotunda, trilocularis, trivalvis, elastica.

SEM. tria, rotunda.

OBS. Clayt. *Portulacaria petalis obovatis, stylo nullo, stigmatibus tribus, simplicibus a generico charactere recedit.*

493. RORIDULA. † N. L. Burmann.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: *foliis* lanceolatis, æqualibus, persistentibus.

COR. *Petala* quinque, oblonga, æqualia, calyce majora.
STAM. *Filamenta* quinque, subulata, corolla dimidio breviora. *Antheræ* supra suam basin insertæ, subulatæ, semibifidæ, apice dehiscentes. *Nectarium* e basi antheræ scrotiformi deorsum protrusa.

PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* truncatum, subtrilobum.

PER. *Capsula* oblonga, trigona, trivalvis.

SEM. plurima.

OBS. *Droseræ adfinis.*

494. ITEA. † Diconangia. *Mitch.* 5.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquesidum, erectum, acuminatum, minimum, persistens: *laciniis* acutis, coloratis.

COR. *Petala* quinque, lanceolata, longa, calyci inserta.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, erecta, longitudine corollæ, calyci inserta. *Antheræ* subrotundæ, incumbentes.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* cylindræus, persistens, longitudine staminum. *Stigma* obtusum.

PER. *Capsula* ovata, calyce multoties longior, stylo mucronata, unilocularis, bivalvis, ex duabus coalita, apice dehiscent.

SEM. numerosa, minima, oblonga, nitida.

495. SAUVAGESIA. † *Iacq. amer.* 77.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum: *foliolis* lanceolatis, acutis, concavis, patentibus, persistentibus.

COR. *Petala* quinque, obtusa, æqualia, rhombeo-ovata, longitudine calycis.

Nectarium foliolis quinque, minoribus, cum petalis alternantibus, oblongis, erectis: cinctis *Pilis* plurimis brevioribus.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, brevissima. *Antheræ* oblongæ, acutæ, breves.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* simplex, longitudine staminum. *Stigma* simplex, obtusum.

PER. *Capsula* ovata, acuminata, unilocularis, apice trivalvis.

SEM. plurima, minima, serie longitudinali affixa.

Obs. Calycem pentaphyllum esse. *Syst. Veg.* p. 244.

496. PENNANTIA. *Forst. charact. gen.* 67.

* Flores Hermaphroditi.

CAL. nullus.

COR. *Petala* quinque, lanceolata, acuta, patentissima.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, longitudine petalorum. *Antheræ* oblongæ, incumbentes.

PIST. *Germen* superum, obtuse trigonum. *Stylus* nullus. *Stigma* planum, peltatum, subtrilobum.

PER. *Germen* triquetrum, biloculare, loculamentis monospermis, altero plerumque abortiente.

SEM. Solitaria, subtriquetra.

* Flores Masculi.

CAL. }
COR. } ut in hermaphrodito.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, petalis duplo longiora. *Antheræ* ovatae, incumbentes.

497. PORTULACARIA. *Jacq. collect. v. I.*
p. 160. *Claytonia. Linn. syst. p.* 245.
Mant. 2. p. 211.

CAL. *Perianthium* diphyllum, persistens, coloratum: *joliolis* subrotundis, concavis, obtusis, patentissimis, oppositis.

COR. *Petala* quinque, obverse ovata, obtusa, integerima, superne concava, basi lateribus mutuo incumbantibus & plana, patentissima, calyce fere triplo longiora, persistentia.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, brevissima, erecta, sine respectu ad situm petalorum posita sic, ut duobus germinis lateribus accumbant gemina, tertio lateri unicum. *Antheræ* ovatae, erectae, vix pertinentes ad medium germen.

PIST. *Germen* superum, trigonum, longitudine petalorum. *Stylus* nullus. *Stigmata* tria, patentissima, apice adscendentia, per totam longitudinem supra muricata.

PER. nullum. Calyx & corolla, nunc erecta, basin feminis arcte amplexantur.

SEM. unicum, ovato oblongum, obtusum, alato-triquetrum.

498. CAROXYLON. *Thunb. diss. nov. gen.*
p. 37.

CAL. *Perianthium* diphyllum, suborbiculatum, rude, intus concavum, extus carinatum, margine tenuissimum, erectum, corolla brevius.

COR. monopetala, quinquepartita fere ad basin: *Tubus* nullus. *Limbi* laciniae obtusae, latae, subrotundae, concavo-crispae, membranaceae, patentes, flavescentes vel parum obscure purpurascentes.

Nectarium: squamae quinque, corollae mediae insertae, corolla paulo angustiores & breviores, cumque ea inferne connatae: fructui conniventi impositae, ovatae, acutiusculae, concavae, membranaceae, flavescentes, basi virescente.

STAM. *Filamenta* quinque, lateri germinis inserta, corolla, breviora alba, capillaria. *Antherae* minimae.

PIST. *Germen* superum, conicum, glabrum: *Stylus* simplex, corolla brevior, erectus, albus. *Stigmata* duo, revoluta, albida: raro stigma simplex.

PER. nullum.

SEM. unicum, depressum, rotundum, viride, spirale, membrana tenuissima vestitum, filamentis nectarioque persistentibus tectum.

OBS. *Salsolae* adfines genus, & forte non satis distinctum.

499. BRUNIA. *

CAL. *Perianthium commune* subrotundum, implicatum multiflorum: *foliis* angustis, acuminatis.

Perianthium proprium pentaphyllum: *foliis* oblongis, villosis, corolla brevioribus.

COR. *Petala* quinque: *ungues* tenues, longitudine calycis. *Limbus* patens, laminis subrotundis.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, flaccida, corolla longiora, unguibus petalorum inserta.

PIST. *Germen* minimum, superum. *Stylus* simplex, longitudine corollae. *Stigma* bifidum.

PER. nullum. *Receptaculum commune* fructificationis squamulis villosis perianthia propria distinguit.

SEM. solitaria, villosiuscula, bilocularia.

OBS. B. nodiflora & paleacea duobus stylis gaudent.

B. abrotanoides stylo unico, emarginato est.

500. KUHNIA. *

CAL. Perianthium commune oblongum, imbricatum: squamis plurimis, lanceolatis, gibbis, persistentibus.

COR. communis æqualis: flosculis decem ad quindecim.

Corollula monopetala, infundibuliformis, calyce duplo longior: Limbo quinquesido, erecto.

STAM. Filamenta quinque, capillaria, brevissima. Antheræ subcylindricæ, tubo corollæ breviores, apice labio dehiscentes.

PIST. Germen inferum. Stylus longitudine staminum. Stigmata duo, clavata.

PER. Calyx immutatus.

SEM. solitaria, oblonga, coronata Pappo plumoso, calyce longiore.

REC. nudum.

OBS. Flos Compositus affinis Eupatorio, sed Anthera diversissima.

501. SCHOEPIA. Schreb.

CAL. Perianthium germen inferne in crustans, turbinato-angulatum, obsolete quinquedentatum.

COR. monopetala, campanulata, basi decemsulcata, quinquesida: laciniis triangularibus, acutis, reflexis.

STAM. Filamenta quinque, brevissima. Antheræ didymæ, erectæ, in ore corollæ.

PIST. Germen turbinatum, semi inferum, intra corollam coronatum. Glandula semiglobosa, porosa. Stylus corolla brevior, cylindraceus, erectus. Stigma capitatum, trifidum.

PER. Bacca trilocularis.

SEM. aliquot.

OBS. Corolla basi quinquangularis: protuberantiis ovatis inter angulos, his majoribus, ad quorum quemque utrinque sulcus. Inde corolla decemsulcata.

502. NAUCLEA. †.

CAL. nullus. Receptaculum commune globosum, subvillosum, tectum undique flosculis.

COR. monopetala, infundibuliformis : *Tubus* filiformis, longior. *Limbus* quinquepartitus, brevis : *laciniis* ovatis, obtusis, recurvis.

STAM. *Filamenta* quinque, brevissima, in fauce corollæ. *Anthera* ovata, longitudine tubi.

PIST. *Germen* inferum, oblongum. *Stylus* capillaris, erectus, corolla longior. *Stigma* obovatum.

PER. nullum.

SEM. solitaria, oblonga, subtrigona, inferne attenuata, apice obtusa, bilocularia.

503. **RIBES.** * *Ribesium* *Dill. elth.* 246. *Großularia* *Tournef.* 409.

CAL. *Perianthium* monophyllum, semiquinquefidum, ventricosum : *laciniis* oblongis, concavis, coloratis, reflexis, persistentibus.

COR. *Petala* quinque, parva, obtusa, erecta, calycis margini innata.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, erecta, calyci inserta. *Anthera* incumbentes, compressæ, margine dehiscentes.

PIST. *Germen* subrotundum, inferum. *Stylus* bifidus. *Stigmata* obtusa.

PER. *Bacca* globosa, umbilicata, unilocularis : *receptaculis* duobus, lateralibus, oppositis, longitudinalibus.

SEM. plurima, subrotunda, subcompressa.

OBS. *R. alpinum dioica planta est, de Leers Fl. herbörn.*

504. **ESCALLONIA.** *Mutis. Suppl. p.* 21.

CAL. *Perianthium* monophyllum, planum, quinquedentatum, persistens.

COR. *Petala* quinque, lingulata, distantia, longiora.

STAM. *Filamenta* quinque, linearia, longitudine calycis. *Anthera* incumbentes.

PIST. *Germen* inferum, hæmisphæricum. *Stylus* cylindricus, longitudine germinis. *Stigma* capitatum.

PER. *Bacca* subrotunda, calyce coronata, bilocularis.

SEM. numerosa, parva.

505. **CARPODETUS.** *Forst. charact. gen.* 17.

CAL. *Perianthium* turbinatum, germi adnatum, quinquedentatum, *dentibus* subulatis, deciduis.

COR. *Petala* quinque, ovata, parva, calycis margini inserta.

STAM. *Filamenta* quinque subulata, brevia, calycis margini inserta. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* inferum. *Stylus* filiformis, staminibus longior. *Stigma* capitato-depressum.

PER. *Bacca* sicca, globosa, e margine calycis adnato anulo quasi cincta, quinquelocularis.

SEM. aliquot, subangulata.

506. **HEDERA.** * *Tournef.* 384.

CAL. *Invulcrum* umbellæ simplicis, minimum, multidentatum. *Perianthium* minimum, quinquedentatum, *germen* cingens.

COR. *Petala* quinque, oblonga, patentia, apicibus incurvis.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, erecta, longitudine corollæ. *Antheræ* basi bifidæ, incumbentes.

PIST. *Germen* turbinatum, receptaculo cinctum. *Stylus* simplex, brevissimus. *Stigma* simplex.

PER. *Bacca* globosa, unilocularis.

SEM. quinque, magna, hinc gibba, inde angulata.

OBS. *H.* quinquefolia ratione partium fructificationis ab hac descriptione paulum recedit. *Syst. Veget. pag.* 244.

507. **PLECTRONIA.**

CAL. *Perianthium* monophyllum, turbinatum, obsolete quinquedentatum, clausum sinibus seu squamis 5 villosis; persistens.

COR. *Petala* quinque, lanceolata, sessilia, calycis faucibus inserta.

STAM. *Filamenta* quinque, brevissima. *Antheræ* geminatae, subrotundæ, singulæ obtektæ squamis calycinis.

PIST. *Germen* inferum. *Stylus* filiformis, calyce brevior. *Stigma* ovatum.

PER. *Bacca* oblonga, bilocularis. *Burm.*

SEM: solitaria, oblonga, compressa. *Burm.*

508. **PHYLICA.** *

CAL. *Receptaculum* commune fructificationum in discum colligans flores.

Perianthium proprium monophyllum, quinquefidum, turbinatum, ore villoso, persistens.

COR. nulla. *Squamula* quinque, acuminatæ, ad basin singulæ divisuræ, calycis singulæ, introrsum conni-ventes.

STAM. *Filamenta* quinque, minima, sub *squamula* inserta. *Antheræ* simplices.

PIST. *Germen* in fundo corollæ. *Stylus* simplex. *Stigma* obtusum.

PER. *Capsula* subrotunda, tricocca, trilocularis, trivalvis.

SEM. solitaria, subrotunda, hinc gibba, inde angulata.

OBS. Datur *species* floribus dioicis; alia *stigmatibus* tribus prædita.

509. GRONOVIA. † Mart. IV. p. 42.

CAL. *Perianthium* monophyllum, ultra medium quinquefidam, campanulatum, coloratum, persistens: *laciniis* semilanceolatis, erectis.

COR. *Petala* quinque, omnium minutissima, subrotunda, ex incisuris calycis.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, longitudine corollæ, calyci inserta, cum petalis alterna. *Antheræ* erectæ, didymæ.

PIST. *Germen* inferum. *Stylus* filiformis, staminibus longior. *Stigma* obtusum.

PER. *Bacca* sicca, subrotunda, colorata, unilocularis.

SEM. unicum, subrotundum, magnum.

510. HELICONIA. Palilia. auth. D. Allamand. Bihai Plum. 3.

CAL. *Spathæ* communes partialesque alternæ, distinctæ, floribus hermaphroditis.

Perianthium nullum.

COR. *Petala* 3, oblonga, canaliculata, erecta, acuta, æqualia.

Neclavium diphyllum, foliolo altero petalis subæquali; altero brevissimo, canaliculato, uncinato, opposito.

STAM. *Filamenta* quinque, filiformia. *Antheræ* longæ, erectæ.

PIST. *Germen* inferum, oblongum. *Stylus* staminibus bre-

vior. Stigmā longum, gracile, curvatum, capitulo terminali.

PER. *Capsula* oblonga, truncata, triquetra, trilocularis.

SEM. solitaria, oblonga.

OBS. *distinguenda a Musa Capsula tricocca.*

OBS. H. Bihai, psittacorum & hirsutæ corolla dipetala, Minime ejusdem generis omnes videntur.

511. STRELITZIA. Ait. Kew.

CAL. *Spatha universalis* terminalis, monophylla, canaliculata, patenti-declinans, multiflora, basin florum involvens.

spathæ partiales lanceolatae, floribus breviores.

Perianthium proprium nullum.

COR. irregularis. *Petala* tria, lanceolata, acuta: inferius naviculare; superiora obtuse carinata.

Nectarium triphyllum. *Foliola* duo inferiora petalis paulo breviora, e lata basi subulata, margine undulata, complicata, includentia genitalia, versus apicem postice aucta appendice crasso, forma dimidiæ sagittæ. *Foliolum* inferius breve, ovatum, compressum, carinatum.

STAM *Filamenta* quinque, receptaculo insidentia, filiformia: tria in altero foliolo nectarii, duo cum stylo in altero foliolo inclusa. *Anthera* lineares, erectæ, filamentis fere longiores, inclusa.

PIST. *Germen* inferum, oblongum, obtuse trigonum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigmata* tria, subulata, petalis altiora, erecta, initio florescentiæ conglutinata.

PER. *Capsula* subcoriacea, oblonga, obtusa, obsolete trigona, trilocularis, trivalvis

SEM. numerosa, conceptaculo centrali duplici ordine adhaerentia.

512. CYRILLA. auth. D. Garden.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum: *foliis* lanceolatis, acuminatis, persistentibus.

COR. *Petala* quinque, receptaculo infera, lanceolata, acuta, patentia, disco longitudinali villosa.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, erecta, longitudine corollæ. *Anthera* subcordata, incumbentes.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, superne crassior, compressus, superne bifidus, persistens. *Stigmata* distantia, glandulosa.

PER. *Capsula* subrotundo-ovata, obtusa, stylo mucronata, bilocularis, bivalvis.

SEM. plurima, angulata, parva.

513. ARGOPHYLLUM. *Suppl. p. 22. Forst. charact. gen. n. 15.*

CAL. *Perianthium* superum, breve, quinquesidum, acutum.

COR. *Petala* quinque, lanceolata, patentia, calyce majora.

Nectarium quinquangulare, pyramidale, apice pervium, constans ex *Papillis* plurimis, conniventibus, basi connatis.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, receptaculo inserta, nectario breviora. *Antherae* ovatae.

PIST. *Germen* calyci adnatum, unde inferum, turbintum, supra planum. *Stylus* filiformis, longitudine nectarii. *Stigma* globosum.

PER. *Capsula* supra plana, trilocularis, trifariam dehiscens.

SEM. plurima, globosa, porosa.

OBS. *Affinitas magna cum Hedera, sed differt nectario, forte & fructu.*

514. LAGOEZIA. * *Cuminoides Tournef. 155.*

CAL. *Involucrum universale* octophyllum: *foliis* pennato-dentatis, ciliatis, reflexis; continens umbellulam.

Involucrum proprium tetraphyllum: *foliis* capillaceo-pennatis, pedunculum unicum, ipso foliolo brevior, involvens.

Perianthium proprium pentaphyllum, capillaceo-multidum, superum.

COR. *Petala* quinque, bicornia, corolla breviora.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, longitudine corollae. *Antherae* subrotundae.

PIST. *Germen* subrotundum, infra receptaculum perianthii. *Stylus* longitudine staminum. *Stigma* simplex.

PER.

PER. nullum.

SEM. solitaria, ovato-oblonga, perianthio coronata.

515. CONOCARPUS. † Jacq. amer. 78.
Rudbeckia Houst. A. A.

CAL. Perianthium monophyllum, superum, minimum, quinquepartitum, acutum, erectum: laciniis subulatis.

COR. Petala quinque, conniventia, vel nulla.

STAM. Filamenta quinque vel decem, subulata, erecta. Antheræ globosæ.

PIST. Germen magnum, compressum, obtusum, inferum. Stylus unicus, brevis. Stigma obtusum.

PER. nullum a semine distinctum.

SEM. unicum, obovatum: margine membranaceo, crasso, utrinque prominente.

OBS. Germina plura imbricatim colliguntur in conum globosum, tanquam squamæ reflexæ.

C. erecta pentandra, apetala. Jacq.

C. racemosa decandra, pentapetala. Jacq.

516. ACHYRANTHES. * Achyracantha
Dill. elth. 7. f. 7.

CAL. Perianthium exterius triphyllum, lanceolatum, acutum, persistens.

Perianthium interius pentaphyllum, persistens.

COR. nulla.

Nectarium valvulis quinque, germen cingentibus, apice barbatis, concavis, caducis.

STAM. Filamenta quinque, filiformia, longitudine corollæ. Antheræ ovatae, incumbentes.

PIST. Germen turbinatum. Stylus filiformis, longitudine staminum. Stigma bifidum, villosum.

PER. Capsula subrotunda, unilocularis, non dehiscens.

SEM. unicum, oblongum.

OBS. Character generis non in omnes exacte quadrat species.

OBS. A. corymbosæ corolla pentapetala & stylus capitatus.

517. CELOSIA. * Stachyarpagophora Vaill.
A. G. 1722.

CAL. Perianthium triphyllum: foliolis lanceolatis, aridis, acutis, persistentibus, corollæ similibus.

LINNE GEN. PL. VOL. I.

P

COR. *Petala* quinque, lanceolata, acuminata, erecta, persistentia, rigidiuscula, calyciformia.

Nectarium margo cingens Germen, minimum, quiaquefidum.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, basi nectario plicato conjuncta, longitudine corollæ. *Anthera* versatiles.

PIST. *Germen* globosum. *Stylus* subulatus, rectus, longitudine staminum. *Stigma* simplex.

PER. *Capsula* globosa, corolla cincta, unilocularis, circumscissa.

SEM. nonnulla, subrotunda, emarginata.

OBS. *C. trigyna* *stigmatibus* *tribus* *instruitur*.

518. CHENOLEA. *Thunb. diff. nov. gen. p. 9.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, globosum, concavum, subcarnosum, quinquepartitum: *laciniis* arcte inflexis: extus argenteo-tomentosum; intus glabrum

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quinque, basi calycis inserta, filiformia, erecta, secundum marginem capsulæ flexa, longitudine calycis. *Anthera* minutæ.

PIST. *Germen* superum. *Stylus* filiformis, brevissimus, vix lineam dimidiam longus. *Stigmata* duo, simplicia, subulata, acuta, patenti-reflexa, stylo paulo longiora.

PER. *Capsula* rotunda, subdepressa, umbilicata, glabra, unilocularis.

SEM. subrotundum, apice bifidum, glabrum, maturitate nigrum.

519. ILLECEBRUM. * *Rupp. Corrigiola Dill. gen. p. 169. Moehr. p. 106. Paronychia Tournef. 281.*

CAL. *Perianthium* pentaphyllum, cartilagineum, quinquangulare: *foliolis* coloratis, acuminatis, apicibus distantibus, persistentibus.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, intra calycem. *Anthera* simplices.

PIST. *Germen* ovatum, acutum, in *Stylum* brevem bifidum desinens. *Stigma* simplex, obtusum.

PER. *Capsula* subrotunda, utrinque acuminata, quinquevalvis, unilocularis, calyce testâ.

SEM. unicum, subrotundum, utrinque acutum, maximum.

OBS. *Character generis non omnibus speciebus in totum convenit.*

520. GLAUX. * *Tournef.* 60.

CAL. nullus: nisi corollam dicas calycem.

COR. *Petalum* unicum, quinquepartitum, campanulatum, erectum, persistens: *laciniis* obtusis, revolutis.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, erecta, longitudine corollæ. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* capitatum.

PER. *Capsula* globosa, acuminata, unilocularis, quinquevalvis.

SEM. quinque, rotundiuscula. *Receptaculum* maximum, globosum, feminibus excavatum.

521. PLOCAMA. *Ait.* *Kew.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, minimum, quinque-dentatum, persistens.

COR. monopetala, campanulata, quinquepartita: *laciniæ* oblongæ.

STAM. *Filamenta* quinque, tubo inserta, breviter. *Antheræ* lineares, incumbenti-erectæ.

PIST. *Germen* inferum, globosum. *Stylus* filiformis, subclavatus, staminibus longior. *Stigma* simplex, obtusum.

PER. *Bacca* subglobosa, trilocularis.

SEM. solitaria - lineari - oblonga.

522. HEDYCREA *Schreb.* *Licania* *Aubl.* 45.

CAL. *Perianthium* monophyllum, hemisphæricum, quinque-dentatum: *dentibus* acutis, patulis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quinque annulo calycem interne infra dentes cingenti, inserta, dentibus opposita, iisque breviora. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* subrotundum, villosum, superum. *Stylus* calyce longior, setaceus, villosus. *Stigma* obtusum.

PER. *Drupa* ovalis, mollis, intus fibrosa, unilocularis.

SEM. *Nux* ovata, fibris tecta, unilocularis: putamine duro.

523. CERATONIA. * *Siliqua* Tournef. 344.

* *Mas.*

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, maximum.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, longissima, patentia. *Antheræ* magnæ, didymæ.

* *Femina* Dill.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tuberculis quinque divisum.

COR. nulla.

PIST. *Germen* intra receptaculum carnosum delitescens. *Stylus* longus, filiformis. *Stigma* capitatum.

PER. *Legumen* maximum, obtusum, compressum, coriaceum, dissepimentis plurimis transversis, isthmis pulpa repletis.

SEM. solitaria, subrotunda, compressa, dura, nitida. *Hermaphrodita* in distincta arbore.

524. BREYNIA. *Forst. charact. gen.* 73.

* *Flores Hermaphroditi.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, turbinatum, laciniatum, sibi dispar: *floris* minutum, laciniiis sex obtusis arcte conniventibus, apice plano depressis, ut foraminulo tandem pervium sit: *fructus* (postea excrescens) patentissimum triplo majus, laciniiis orbiculatis, subæqualibus.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* nulla. *Antheræ* quinque, lineares, stylo longitudinaliter adnatæ, approximatae.

PIST. *Germen* minimum. *Stylus* cylindricus, longitudine calycis. *Stigma* obtusum.

PER. *Bacca* sicca, globosa, trilocularis, loculis dispersis.

SEM. duo, dorso convexa, lateribus duobus, planis.
* *Flores Masculi.*

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, *foliis* subrotundis, concavis, subæqualibus.

COR. nulla.

Nectarium glandulae quinque, subpedicellatae, cum staminibus alternæ.

STAM. *Filamenta* quinque, brevissima. *Anthera* subrotundæ, longitudine calycis.

* *Flores Feminei.*

CAL. & COR. ut in Masculis.

PIST. *Germen* globosum. *Stylus* nullus. *Stigmata* quinque, obcordata, petaloidea.

PER. *Capsula* quinquelocularis.

SEM. solitaria, subtriquetra.

525. THESIIUM. *

CAL. *Perianthium* monophyllum, turbinatum, persistens, semiquinquefidum: *laciniis* semilanceolatis, erectis, obtusis.

COR. nulla: nisi calycem interne coloratum dicas.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, basi laciniarum calycis inserta, calyce breviora. *Anthera* subrotundæ.

PIST. *Germen* inferum, calycis basi innatum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* crassiusculum, obtusum.

PER. nullum. *Calix* in fundo continet semen, nec dehiscit.

SEM. unicum, subrotundum, testum.

OBS. *T. alpinum* demit $\frac{1}{2}$ e fructificatione.

526. NYSSA. † Gronow. per *Kalmium*.

* *Mas.*

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, patens fundo plano.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* decem, subulata, calyce breviora. *Anthera* didymæ, longitudine filamentorum.

* *Hermaphrodita.*CAL. *Perianthium* ut in mare, germini insidens.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, erecta. *Anthera* simplices.PIST. *Germen* ovatum, inferum. *Stylus* subulatus, incurvus, staminibus longior. *Stigma* acutum.PER. *Drupa*.SEM. *Nux* ovalis, acuta, fulcīs longitudinalibus exarata, angulata, irregularis.527. GOVANIA. *Jacq. amer.* 263.* *Hermaphroditi.*CAL. *Perianthium* monophyllum, superum, infundibuliforme, quinquefidum: *Tubo* persistente; *Laciniis* ovatis, acutis, patentibus, deciduis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, longitudine calycis, eoque alternantia. *Anthera* subrotundæ, incumbentes, calyptratae calyptra cucullata elastica.PIST. *Germen* inferum. *Stylus* subulatus, semitrifidus. *Stigmata* obtusa.PER. *Fruſtus* siccus, triqueter, tripartibilis in totidem semina.SEM. *Fruſtus* partes tres, subrotundæ, subtriangulæ, biatae.* *Masculi* in eadem planta.CAL. ut in *Hermaphrodito*.COR. ut in *Hermaphrodito*.STAM. ut in *Hermaphrodito*.PIST. *Germen* nullum. *Stylus* ut in *Hermaphrodito*. *Stigmata* obsoleta (nulla).

II. DIGYNIA.

528. STAPELIA. *

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquefidum, acutum, parvum, persistens.COR. monopetala plana, magna, ultra medium quinquefida: *laciniis* latis, planis, acuminatis.*Nectarium* *Stellula* plana, quinquefida, *laciniis* linearibus, apicibus laceris ambiens genitalia, *Stel-*

lula alia plana, quinquefida (laciniis acutis integris) tegens genitalia.

STAM. *Filamenta quinque, plana, erecta, lata. Antherae lineares, utrinque filamenti lateri adnatæ.*

PIST. *Germina duo, ovalia, introrsum plana. Styli nulli. Stigmata obsoleta.*

PER. *Folliculi duo, oblongi, subulati, uniloculares, univalves.*

SEM. *numerosa, imbricata, compressa, Pappo coronata.*

OBS. *In quibusdam orbiculus planus fœllulis subjicitur.*

529. CYNANCHUM. *

CAL. *Perianthium monophyllum, quinquedentatum, erectum, minimum, persistens.*

COR. *monopetala. Tubus vix ullus. Limbus quinquepartitus, planus: laciniis linearibus, longis.*

Nectarium in centro floris, longitudine corollæ, erectum, cylindraceum: ore quinquedentato.

STAM. *Filamenta quinque, longitudine nectarii, parallelæ. Antheræ contingentes, intra os corollæ.*

PIST. *Germen oblongum, bifidum. Stylus vix ullus. Stigmata duo, obtusa.*

PER. *Folliculi duo, oblongi, acuminati, uniloculares, longitudinaliter dehiscentes.*

SEM. *numerosa, oblonga, coronata Pappo, imbricatim posita.*

OBS. *C. viiminale a chavactere hic dato paulum recedit, Mant. 392.*

530. PERIPILOCA. * Tournef. 22.

CAL. *Perianthium quinquefidum, minimum: laciniis ovatis; persistens.*

COR. *monopetala, rotata, plana, quinquepartita: laciniis oblongis, linearibus, truncatis, emarginatis.*

Nectarium minimum, quinquefidum, genitalia ambiens. Filamenta quinque, incurva, corolla breviora, cumque ea alterna.

STAM. *Filamenta breviora, incurva, conniventia, villosa. Antheræ erectæ, geminæ, laterales.*

PIST. *Germen* minimum, bifidum. *Stylus* cylindricus. *Stigma* capitatum, pentagonum, cui insident *Glandulae* quinque, obovatae, pedicellatae.

PER. *Folliculi* duo, magni, oblongi, ventricosi, uniloculares, univalves.

SEM. plurima, imbricata, coronata Pappo. *Receptaculum* longitudinale, filiforme.

531. PERGULARIA.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquefidum, erectum, acutum, persistens.

COR. monopetala, hypocrateriformis. *Tubus* cylindricus, calyce longior. *Limbus* quinquepartitus, planus: *laciniis* oblongis.

Nectaria quinque, semisagittata, erecta, compressa, attenuata in mucronem, incurva, basi exteriore dente nutante.

STAM. *Filamenta* vix ulla. *Antherae* quinque, corpusculo truncato *stigmatis* immersae.

PIST. *Germine* duo, ovata, acuminata. *Styli* nulli. *Stigmatis* loco corpusculum truncatum.

PER. *Folliculi* bini.

SEM.

OBS. Affinis *Periploca gracæ*.

532. APOCYNUM. * *Tournef.* 20.

CAL. *Perianthium* monophyllum, semiquinquefidum, erectum, acutum, minimum, persistens.

COR. monopetala, campanulata, subrotunda, semiquinquefida: *laciniis* revolutis.

Nectarium corpusculis quinque, glandulosis, ovalibus, germen ambientibus.

STAM. *Filamenta* quinque, brevissima. *Antherae* quinque, oblongae, erectae, acutae, basi bifidae, conniventes.

PIST. *Germine* duo, ovata. *Styli* vix ulli. *Stigma* subrotundum, germinibus fere majus.

PER. *Folliculi* duo, longi, acuminati, univalves, uniloculares.

SEM. numerosa, minima, Pappo longo coronata. *Receptaculum* subulatum, longissimum, asperum, liberum.

533. ASCLEPIAS. * *Tournef.* 22. *Apocynum*
Tournef. 21.

CAL. *Perianthium* quinquefidum, acutum, minimum, persistens.

COR. monopetala plana vel reflexa, quinquepartita: *laciniis* ovato-acuminatis, leviter cum sole flexis.

Nectaria quinque, cingentia genitalia, quorum singula ex ovato oblique extrorsum aurita, e fundo corniculum acutum, versus genitalia inflexum exerunt.

Corpusculum truncatum genitalia tegit, squamis quinque ad latera obvolutum, dehiscens ad latera totidem rimis.

STAM. *Filamenta* vix ulla. *Anthera* quinque, corpusculo truncato nectarii infra squamas insertæ, acutæ.

PIST. *Germina* duo, ovata, acuminata. *Styli* vix ulli. *Stigmata* simplicia.

PER. *Folliculi* duo, magni, oblongi, acuminati, ventricosi, uniloculares, univalves.

SEM. numerosa, imbricata, Pappo coronata. *Receptaculum* membranaceum, liberum.

534. MELODINUS. *Suppl. p.* 23. *Forst. charact. gen. n.* 19.

CAL. *Perianthium* inferum, quinquepartitum, persistens. *Foliola* ovata, margine incumbentia.

COR. monopetala, contorta. *Tubus* cylindricus, calyce triplo longior. *Limbus* rotatus, quinquepartitus. *Lacinia* falcata, crenulata.

Nectarium in medio tubi, stellatum. *Lacinia* quinque, fissæ, laceratæ, ut in Nerio.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, brevissima, in medio tubi. *Anthera* ovata.

PIST. *Germen* globosum, superum. *Stylus* teres, bipartibilis. *Stigmata* conica, acuta.

PER. *Bacca* carnosa, globosa, polysperma. *Dissepimento* carnoso.

SEM. ovata, numerosa, compressa; nidulantia in pulpa.

535. SWERTIA. *

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, planum, persistens: *laciniis* lanceolatis.

COR. monopetala, rotata. *Limbus* planus, quinquepartitus: *laciniis* lanceolatis, calyce majoribus, unguibus connexis.

Nectaria decem, quasi puncta duo in basi singulae laciniae corollae a parte interna, excavata, setis parvis erectis cincta.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, erecto-potentia, corolla breviora. *Antherae* incumbentes.

PIST. *Germen* ovato-oblongum. *Stylus* nullus. *Stigmata* duo, simplicia.

PER. *Capsula* teres, utrinque acuminata, unilocularis, bivalvis.

SEM. numerosa, parva.

OBS. *Species etiam existunt floribus quadrifidis 5, 6.*

Nectaria in una specie subtus prominent corniculis 5.

336. GENTIANA. * Tournef. 40. Centaurium minus Tournef. 43.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, acutum: *laciniis* oblongis, persistentibus.

COR. *Petalum* unicum, inferne tubulatum, imperforatum, superne quinquefidam, planum, marcescens, figura varia.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, corolla breviora. *Antherae* simplices.

PIST. *Germen* oblongum, cylindraceum, longitudine faminum. *Styli* nulli. *Stigmata* duo, ovata.

PER. *Capsula* oblonga, teres, acuminata, apice leviter bifida, unilocularis, bivalvis.

SEM. numerosa, parva. *Receptacula* duo, singula valvulae longitudinaliter adnata.

OBS. *Fructus figura constans est. Floris autem numerus, & figura valde variat in diversis speciebus.*

Species sunt, quae quintam partem numeri in flore excludunt.

Species est, quae tres partes numeri in flore addit.

Species alia corollae collo patente; alia collo villis clausa; alia laciniis corollae ciliatis; alia limbo campanulato, erecto, plicato; alia limbo stellato; lacinulis laciniis interjectis; alia campanulata; alia infundibuliformi gaudet corolla. &c.

337. DICHONDRA. Forst. charact. gen. 20.

CAL. *Perianthium* inferum, quinquepartitum, foliolis lanceolatis, apice patentibus.

COR. monopetala, profunde quinquepartita, subcampanulata, *laciniis* lanceolatis, longitudine calycis.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, corolla breviora. *Antheræ* ovatæ.

PIST. *Germina* duo, pilosa. *Styli* duo, filiformes longitudine staminum, interius e basi germinum orti. *Stigmata* capitato-depressa.

PER. *Capsulæ* duæ, subglobosæ, uniloculares, monospermæ.

SEM. solitaria, subglobosa.

538. CRESSA. † *Anthyllis Magn. char.*

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: *foliolis* ovatis, obtusis, incumbentibus, persistentibus.

COR. monopetala, hypocrateriformis: *Tubus* longitudine calycis, inferne ventricosus. *Limbus* quinquepartitus: *laciniis* ovatis, acutis, patentibus.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, longa, tubo corollæ insidentia. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* ovatum. *Styli* duo, filiformes, longitudine staminum. *Stigmata* simplicia.

PER. *Capsula* ovata, unilocularis, bivalvis, calyce paulo longior.

SEM. unicum, ovato-oblongum.

539. HYDROLEA. *Læst.* 310.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: *foliolis* subulatis, erectis.

COR. monopetala, rotato-campanulata. *Tubus* calyce brevior. *Limbus* quinquepartitus, patens: *laciniis* ovatis, incumbentibus.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, basi cordata. *Antheræ* oblongæ, curvæ, incumbentes.

PIST. *Germen* ovatum. *Styli* duo, filiformes, patentēs. *Stigmata* truncata.

PER. *Capsula* ovata, bivalvis, bilocularis.

SEM. plurima, minuta, imbricata; *Receptaculo* ovato, magno.

540. ROCHEFORTIA. *Swartz prodr.*

CAL. 5-partitus.

COR. infundibuliformis, fauce aperta.

PER. biloculare, polyspermum.

541. STERIS.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum: *laciniis* oblongis, acutis, persisteatibus.

COR. monopetala, rotata, quinquepartita, patens, calyce paulo longior.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, erecta, longitudine calycis. *Antheræ* sagittatæ.

PIST. *Germen* subrotundum. *Styli* duo, filiformes, longitudine staminum. *Stigmata* obtusa.

PER. *Bacca* globosa, unilocularis.

SIM. plurima, oblonga.

Facies *Capfici* minoris.

542. VELEZIA. *

CAL. *Perianthium* monophyllum, filiforme, pentagonum, persistens: ore quinquedentato, acuminato, erecto, minimo.

COR. *Petala* quinque, brevissima, emarginato-bidentata: unguibus filiformibus, longitudine calycis.

STAM. *Filamenta* quinque, sæpe sex, capillaria, vix calycis longitudine. *Antheræ* cordatæ.

PIST. *Germen* cylindricum, breve, receptaculo stylo-
rum terminatum. *Styli* duo, filiformes, longitudine
staminum. *Stigmata* simplicia.

PER. *Capsula* cylindrica, testæ, unilocularis.

SEM. plurima, simplici serie imposita.

Obs. *Stamina* sæpe sex, sed naturali statu quinque, uti posteriores observationes demonstrarunt. *Syst. V. p. 266.*

543. IRESINE. † *Brown.*

* *Mas.*

CAL. *Perianthium* diphyllum, minimum, acutum, nitidum.

COR. *Petala* quinque, sessilia, lanceolata, erecta.
Nectarium squamis 5, staminibus interpositis.

STAM. *Filamenta* quinque, erecta. *Antheræ* subrotundæ.

* *Femina.*

CAL. ut in *Mare.*

COR. ut in *Mare.*

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* nullus. *Stigmata* duo, subrotunda.

PER. *Capsula* oblongo - ovata.

SEM. aliquot, tomentosa.

544. LINCONIA. †

CAL. *Perianthium* inferum, tetraphyllum: foliolis ovatis, persistentibus: opposito pari inferiore brevior.

COR. *Petala* quinque, lanceolata, sessilia, erecta.

Nect. foveola insculpta basi petali, inferne cincta margine.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, marginata, erecta, mediocria. *Antheræ* obtusæ, sagittatæ auriculis nutantibus, dehiscentibus.

PIST. *Germen* semi-inferum corollæ (respectu calycis superum). *Styli* duo, filiformes, striati. *Stigmata* simplicia.

PER. *Capsula* bilocularis.

SEM. duo?

OBS. *Perianthium* forte pro *Bracteis* sumi posset: dum flos omnino superus.

545. NAMA. †

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: foliolis lanceolatis, rectis, patulis, persistentibus.

COR. *Petala* quinque, ovata, calyce breviora, patentia.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, longitudine corollæ. *Antheræ* oblongiusculæ.

PIST. *Germen* ovatum. *Styli* duo, capillares, erecti, longitudine staminum. *Stigmata* obtusa, patentia.

PER. *Capsula* ovalis, bivalvis, unilocularis, longitudine calycis.

SEM. numerosa, minima: *Receptaculo* ovali, basi affixo.

OBS. *Corollam* quinquepartitam esse *Syst. Veg.* p. 265.

546. HEUCHERA. *

CAL. *Perianthium* monophyllum, semiquinquesidum, rotundatum, angustum: *laciniiis* obtusis.

COR. *Petala* quinque, calycis margini inserta, ovali-linearia, longitudine calycis.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, erecta, calyce duplo longiora. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* subrotundum, femibifidum, desinens in *Stylos* duos, rectos, longitudine staminum. *Stigmata* obtusa.

PER. *Capsula* ovata, acuminata, femibifida, birostris, bilocularis, rostris reflexis.

SEM. multa, parva.

547. BUMALDA. *Thunb. diff. nov. gen. p. 62.*
Flor. jap. p. 8.

CAL. *Perianthium* monophyllum, ad basin fere quinquepartitum: *lacinia* ovata, obtusa, concava, ferrugineo-alba, corolla paulo breviores.

COR. pentapetala, alba. *Petala* lineari-obovata, germini inserta.

STAM. *Filamenta* quinque, unguibus petalorum inserta, filiformia, erecta, hirta, longitudine fere corollae. *Anthera* dorso inserta, ovata, didyma.

PIST. *Germen* superum, conicum, villosum. *Styli* duo, erecti, villosi, longitudine filamentorum. *Stigmata* simplicia, capitata, truncata.

PER. *Capsula* bilocularis?

548. ANABASIS. †

CAL. *Perianthium* triphyllum: *folioli* subrotundis, concavis, obtusis, patentibus.

COR. *Petala* quinque, ovata, aequalia, calyce minora, persistentia.

STAM. *Filamenta* quinque, filiformia, corolla longiora. *Anthera* subrotunda.

PIST. *Germen* subrotundum, acuminatum, desinens in *Stylos* duos. *Stigmata* obtusa.

PER. *Bacca* subrotunda, calyce dilatato cincta.

SEM. unicum, cochleatum.

OBS. A. spinosissima saepius $\frac{1}{2}$ numeri partem addit.

549. MICROTEA. *Swartz prodr.*

CAL. 5-phyllus; patens.

COR. nulla.

Drupa sicca, echinata.

550. SALSOLA. * Kali Tournef. 128.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum : *laciniis* ovatis, concavis, persistentibus.

COR. nulla : nisi *calycem* dicas corollam.

STAM. *Filamenta* quinque, brevissima, *laciniis* calycis inserta.

PIST. *Germen* globosum. *Stylus* tri- s. bipartitus, brevis. *Stigmata* recurva.

PER. *Capsula* ovata, calyce obvoluta, unilocularis.

SEM. unicum maximum, cochleæ instar spirale.

OBS. *Species quædam tribus stylis gaudent.*

551. HUMULUS. * Lupulus Tournef. 309.

* *Mas.*

CAL. *Perianthium* pentaphyllum : *foliolis* oblongis, concavis, obtusis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, brevissima. *Anthera* oblongæ.

* *Femina.*

CAL. *Involucrum universale* quadrifidum, acutum : *partiale* tetraphyllum, ovatum, octiflorum, cujus singuli floris.

Perianthium monophyllum, ovatum, maximum, extrorsum hinc planum, basi connivens.

COR. nulla.

PIST. *Germen* minimum. *Styli* duo, subulati, reflexo-patuli. *Stigmata* acuta.

PER. nullum. *Calyx* basi semen includens.

SEM. subrotundum, tunica obtectum.

552. CHENOPODIUM. * Tournef. 288. Atriplex. Edit. VII. 1260. Tournef. 286.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum, concavum, persistens : *laciniis* ovatis, concavis, margine membranaceis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, calycis foliis opposita, eorumque longitudine, aut paulo longiora. *Anthera* subrotundæ, didymæ.

PIST. *Germen* orbiculatum. *Stylus* bipartitus, brevis. *Stigmata* reflexa, obtusa.

PER. nullum. *Calyx* clausus, pentagonus, quinque-angularis, angulis compressis, deciduus.

SEM. unicum, lenticulare, superum, compressum.

OBS. *Tanta Chenopodii & Atriplicis adfinitas, ut juxta assumta principia amplius separari nequeant. In quibusdam speciebus Stylus trifidus observatur.*

553. BETA. * *Tournef.* 268.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum, concavum, persistens: laciniis ovato-oblongis, obtusis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, calycis foliis opposita, eorumque longitudine. *Anthera* subrotundæ.

PIST. *Germen* quodammodo infra receptaculum. *Styli* duo, brevissimi, erecti. *Stigmata* acuta.

PER. *Capsula* intra fundum calycis, unilocularis, decidua.

SEM. unicum, reniforme, compressum, calyce involutum.

554. HERNIARIA. * *Tournef.* 288.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum, acutum, patens, interne coloratum, persistens.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, minuta, intra calycis lacinias. *Anthera* simplices.

Filamenta alia quinque, calyci alterna, sterilia.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* vix ullus. *Stigmata* duo, acuminata, longitudine styli.

PER. *Capsula* parva, in fundo calycis, tecta, vix dehiscens.

SEM. solitarium, ovato-acuminatum, nitidum.

OBS. *H. fruticosa* deponit quintam partem numeri in calyce & flaminibus.

H. lenticulata a congeneribus charactere paulum diversa.

555. GOMPHRENA. * *Amaranthoides Tournef.* 423. *Caraxeron Vaill. A. G.* 1722.

CAL. *Perianthium* coloratum: exterius triphyllum: foliolis duobus, conniventibus, carinatis.

COR. quinquepetala, erecta: *Petalis* subulatis, persistentibus, rudibus, villosis.

Nectarium tubus cylindraceus, longitudine corollæ: ore quinquedentato, patulo.

STAM. *Filamenta* quinque, vix notabilia, intra os nectarii. *Antheræ* os nectarii claudentes, erectæ.

PIST. *Germen* ovatum cum acumine. *Stylus* semibifidus, filiformis. *Stigmata* simplicia, longitudinae staminum.

PER. *Capsula* subrotunda, circumscissa.

SEM. unicum, magnum, subrotundum, apice obliquo,

OBS. G. arborescens a congeneribus non nihil differt.

556. STAAVIA. Dahl. diff.

CAL. *Perianthium* commune hemisphæricum: *foliis* plurimis imbricatis linearibus. *Proprium* monophyllum, quinquepartitum: laciniis lineari-subulatis, erectis.

COR. *Communis* convexiuscula: *propria* pentapetala: *petalis* oblongis, obtusis, erecto-patentibus.

STAM. *Filamenta* quinque subulata, basi perianthii inserta. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* inferum, turbinatum. *Styli* duo coaliti. *Stigma* didymum.

PER. Nullum. *Receptaculum* commune planum, paleaceum vel pilosum.

SEM. Solitaria, ovata.

OBS. Brunias, radiatam & glutinosam L. hac revocat *Illust.* novi generis autor.

557. BOSEA.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum, æquale: *foliis* subrotundis, concavis, erectis, margine tenuioribus.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, calyce longiora. *Antheræ* simplices.

PIST. *Germen* ovato-oblongum, cuspidatum. *Stylus* nullus. *Stigmata* duo.

PER. *Bacca* globosa, unilocularis.

SEM. unicum, rotundum, acuminatum.

OBS. Summa itaque generis affinitas cum Celtide & Ulmo.

558. ULMUS. * *Tournef.* 372.

CAL. *Perianthium* monophyllum, turbinatum, rugosum, *Limbus* quinquesidus, erectus, interne coloratus, persistens.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, calyce duplo longiora. *Anthera* quadrifurcata, erecta, breves.

PIST. *Germen* orbiculatum, erectum. *Styli* duo, staminibus breviores, reflexi. *Stigmata* pubescentia.

PER. *Bacca* ovalis, magna, exsucca, compressio-membranacea.

SEM. unicum, subrotundum, leviter compressum.

559. CELTIS. *Tournef.* 383.

* *Hermaphroditi* flores solitarii superiores.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum: *laciniis* ovatis, patulis, marcescentibus.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quinque, brevissima, ab initio occultata antheris, farina excusa longiora. *Anthera* oblonga, crassiuscula, quadrangulares, quadrifurcata.

PIST. *Germen* ovatum, acuminatum, longitudine calycis. *Styli* duo, patentes, varie inflexi, subulati, undique pubescentes, longissimi. *Stigmata* simplicia.

PER. *Drupa* globosa, unilocularis.

SEM. *Nux* subrotunda.

* *Masculi* flores in eadem planta, inferiores.

CAL. *Perianthium* sexpartitum, reliqua ut in *Hermaphroditis*.

COR. nulla.

STAM. sex, reliqua ut in *Hermaphroditis*.

560. NEPHELIUM.

* *Masculi* flores in racemo spicato.

CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum, quinque-dentatum.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, calyce longiora. *Anthera* obtusa, basi bipartita.

* *Feminei* Flores in eodem racemo.

CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum, quadridentatum dentibus duobus oppositis remotioribus; marcescens.

COR. nulla.

PIST. *Germina* duo, subrotunda, muricata, calyce majora. *Styli* bini, filiformes, recurvi, inter germina enati. *Stigmata* crassiuscula, obtusa.

PER. *Drupæ* siccæ, binæ, ovatæ, monospermæ, testæ fetis subulatis.

SEM. solitaria, subrotunda.

561. CANNABIS. * *Tournef.* 308.

* *Mas.*

CAL. *Perianthium* quinquepartitum : *foliis* oblongis, acuminato-obtusis, concavis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, brevissima. *Antheræ* oblongæ, tetragonæ.

* *Femina.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, oblongum, acuminatum, latere altero longitudinaliter dehiscens, persistens.

COR. nulla.

PIST. *Germen* minimum. *Styli* duo, subulati, longi. *Stigmata* acuta.

PER. minimum. *Calyx* arcte clausus.

SEM. *Nux* globofo-depressa, bivalvis.

562. VAHLIA. *Thunb. diss. nov. gen. p.* 36. *Ruffelia. Syst. veg. ed.* 14. *p.* 270.

CAL. *Perianthium* quinquephyllum : *Foliola* lanceolata, acuta, concava, patentia, lineam longa.

COR. pentapetala, lutea. *Petala* ovata, concava, patentia, calyce duplo breviora.

STAM. *Filamenta* quinque, filiformia, inter petala inserta, erecta, longitudine calycis, flava. *Antheræ* oblongæ, quadrifurcatae, flavæ.

PIST. *Germen* inferum. *Styli* duo, filiformes, erecto-patuli, latei staminibus longiores. *Stigmata* simplicia, obtusa.

PER. *Capsula* ovata, truncata, lineis quinque elevatis exarata, calyce persistente coronata, bivalvis, unilocularis.

SEM. plurima, minuta.

563. PHYLLIS. * *Bupleuroides Bærh.*

CAL. *Umbella* nulla, (sed *panicula*).

Perianthium minimum, superum, diphyllum, obsoletum.

COR. *Petala* quinque, lanceolata, obtusa, revoluta, vix basi connexa.

STAM. *Filamenta* quinque, corolla breviora, capillaria, flaccida. *Antheræ* simplices, oblongæ.

PIST. *Germen* inferum. *Stylus* nullus. *Stigmata* duo, subulata, pubescentia, reflexa.

PER. nullum. *Fructus* turbinato-oblongus, obtusus, angulatus.

SEM. duo, parallela, hinc convexa angulata, inde plana, superne latiora.

OBS. *Stigmata ut in Graminibus, Ulmo, Tetrageia.*

564. COPROSMA. *Suppl. p. 24. Forst. charact. gen. n. 69.*

* *Flos hermaphroditus.*

CAL. *Perianthium* inferum, monophyllum, breve, quinquepartitum, persistens. *Lacinie* acutæ, patentes.

COR. monopetala, infundibuliformis, calyce multo major. *Limbus* quinque-ad septempartitus. *Lacinie* acutæ, erectæ.

STAM. *Filamenta* quinque, sex, septem, capillaria. *Antheræ* subulatæ, basi cordato-emarginatæ, subincurvatæ.

PIST. *Germen* superum, oblongum. *Styli* duo, filiformes, basi cohærentes, corolla longiores, divaricati. *Stigma* simplicissimum

PER. *Bacca* ovato-globosa, disperma.

SEM. duo, ovata in pulpa remota, latere interiori plana, exteriori convexa.

* *Flores Feminei & Masculi similes Hermaphroditiz.*

565. PANAX. * *Araliastrum Vaill. 6. Aureliana Lefit. Ninf. Breyn. diff. Panacea Mitch. 26.*

* *Hermaphrodita in distincta planta.*

CAL. *Umbella* simplex, æqualis, conferta.

- Involucrum* polyphyllum, subulatum, minimum, persistens.
- Perianthium* proprium; minimum, quinquedentatum, persistens.
- COR. Universalis* uniformis. *Propria* Petalis quinque, oblongis, æqualibus, recurvis.
- STAM. Filamenta* quinque, brevissima, caduca. *Anthera* simplices.
- PIST. Germen* subrotundum, inferum. *Styli* duo, parvi, erecti. *Stigmata* simplicia.
- PER. Bacca* cordata, umbilicata, bilocularis.
- SEM. solitaria.* cordata, acuta, convexo-plana.
- + *Masculi* flores in diversa planta.
- CAL. Umbella* simplex, globosa: radiis plurimis, æqualibus, coloratis.
- Involucrum* foliolis numero radiorum externorum; lanceolatis, sessilibus.
- Perianthium* turbinatum, integerrimum, coloratum.
- COR. Petali* quinque, oblonga, obtusa, angusta, reflexa, perianthio insidentia.
- STAM. Filamenta* quinque, filiformia, longiora, perianthio inserta. *Anthera* simplices.

566. ERYNGIUM. *Tournef.* 173.

- CAL. Receptaculum* commune conicum, paleis flosculos sessiles distinguentibus.
- Involucrum receptaculi* polyphyllum, planum, flosculos superans.
- Perianthium proprium* pentaphyllum, erectum, acutum, corollam superans, germini insidens.
- COR. universalis* uniformis, subrotunda: *Flosculi* omnes fertiles.
- Propria* pentapetala: *Petali* quinque, oblonga, apicibus ad basin inflexis, linea longitudine constricta.
- STAM. Filamenta* quinque, capillaria, recta, flosculos superantia. *Anthera* oblongæ.
- PIST. Germen* hispidum, inferum. *Styli* duo, filiformes, recti, longitudine staminum. *Stigmata* simplicia.
- PER. Fructus* ovatus, bifariam divisibilis.
- SEM. oblonga, teretia.*
- OBS. In aliis speciebus Semina e crusta pericarpium deponuntur, in aliis inclusa persistunt.*

567. HYDROCOTYLE. * *Tournef.* 173.

CAL. *Umbella simplex.*

Involucrum sæpius tetraphyllum, parvum.

Perianthium vix ullum.

COR. *universalis* uniformis figura, non situ: *Flosculi* omnes fertiles.

Propria pentapetala: *Petalis* ovatis, acutis, patentibus, integris.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, corollæ breviora.

Antheræ minimæ.

PIST. *Germen* erectum, compressum, orbiculatum, inferum proprium, peltatum. *Styli* duo subulati, brevissimi. *Stigmata* simplicia.

PER. nullum. *Fruſtus* orbiculatus, compressus, transverse bipartibilis.

SEM. duo, semiorbiculata, compressa.

568. SPANANTHE. *Jacq. Collect. Vol. 3.*

CAL. *Umbella universalis* ex radiis a tribus ad octo, irregularis. *Partialis* ex radiis plus minus tribus, irregularis.

Involucrum universale subpentaphyllum; foliolis linearilanceolatis, acutis, patentissimis, concavis, brevibus. *Partiale* subtriphyllum, simile.

Perianthium pentaphyllum, superum, parvum, persistens; foliolis ovatis, acutulis, erectis.

COR. *universalis* uniformis. *Flosculi* omnes fertiles.

Propria petalis quinque, lanceolatis, obtusis, planis, æqualibus, patentissimis, nec inflexis.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, erectiuscula, fere longitudine corollæ. *Antheræ* didymæ.

PIST. *Germen* inferum, compressulum, bifidum, apice bifidum. *Styli* duo, subulati, patuli, staminibus breviores. *Stigmata* simplicia.

PER. nullum. *Fruſtus* ovalis, compressus, ad oras dehiscens, separabilis in duo femina.

SEM. duo, ovalia, compresso-plana, in dorso tribus striis notata.

569. SANICULA. * *Tournef.* 173.

CAL. *Umbella universalis* radiis paucissimis (quatuor sæpe): *partialis* plurimis, confertis, subcapitatis.

Involucrum universale dimidiatum, extrorsum situm :
partiale undique ambiens, flosculis brevius.

Perianthium vix notabile.

COR. *universalis* uniformis. *Flosculi* disci abortivi.

Propria petalis quinque, compressis, inflexis, florem
 claudentibus.

STAM. *Filamenta* quinque, simplicia, corollulis duplo
 longiora, erecta. *Antherae* subrotundae.

PIST. *Germen* hispidum, inferum. *Styli* duo, subulati,
 reflexi. *Stigmata* acuta.

PER. nullum. *Fructus* ovato-acutus, scaber, biparti-
 bilis.

SEM. duo, hinc convexa, muricata, inde plana.

OBS. *Flores* *misculi mixti hermaphroditis* in *S. marilandica*.

570. ASTRANTIA. Tournef. 166.

CAL. *Umbella universalis* radiis paucissimis (tribus sæ-
 pe); *partialis* numerosissimis.

Involucrum universale foliolis ad radios duplicatis. *Par-*
tiale foliolis circiter viginti, lanceolatis, patentibus,
 æqualibus, coloratis, umbellula longioribus.

Perianthium proprium quinquedentatum, acutum, ere-
 ctum, persistens.

COR. *universalis* uniformis. *Flosculi* radii abortivi.

Propria Petalis quinque, erectis, inflexo-bifidis.

STAM. *Filamenta* quinque, simplicia, longitudine corol-
 lulae. *Antherae* simplices.

PIST. *Germen* oblongum, inferum. *Styli* duo, erecti,
 filiformes. *Stigmata* simplicia, patentia.

PER. *Fructus* ovatus, obtusus, coronatus, striatus, bi-
 partibilis.

SEM. duo, ovato-oblonga, pericarpium crusta tecta, ru-
 gosa.

571. HERACLEUM. * Sphondylium. Tour- nef. 170.

CAL: *Umbella universalis* multiplex, maxima: *Partialis*
 plana.

Involucrum universale polyphyllum, caducum: *Partiale*
 extrorsum dimidiatum: *foliolis* tribus ad septem,
 lineari-lanceolatis, *exterioribus* longioribus.

Perianthium obsoletum.

COR. *universalis* difformis, radiata. *Flosculi* fertiles plerumque omnes.

Propria disci æqualis, pentapetala: *Petalis* inflexo-uncinatis, emarginatis.

Propr. radii inæqualis, pentapetala. *Petalis* exterioribus majoribus, magisque bifidis, oblongis, uncinatis.

STAM. *Filamenta* quinque, corollulis longiora. *Anthera* parvæ.

PIST. *Germen* subovatum, inferum. *Styli* duo, approximati, breves. *Stigmata* simplicia.

PER. nullum. *Fructus* ellipticus, compressus, emarginatus, in medio utrinque striatus, marginatus.

SEM. duo, ovata, compresso-foliacea.

U.S. *Heraclei speciebus aliis flosculi* radiantes feminei fertiles sunt; *disci masculi abortientes, stigmatibus destituti.*

Sphondylium T. 1, 2, *hermaphroditum est ubique, & involucrium interdum deficit omne.*

H. angustifolium flores uniformes gerit.

572. OENANTHE. * Tournef. 166.

CAL. *Umbella universalis* radiis paucioribus: *Partialis* congesta radiis pluribus, brevissimis, ut sæpe nullis.

Involucrum universale polyphyllum, simplex, umbella brevius: *Partiale* polyphyllum, parvum.

Perianthium proprium quinquedentatum, subulatum, persistens.

COR. *universalis* difformis, radiata: *Flosculi radii abortivi.*

Propria disci hermaphrodita, *Petalis* quinque, inflexo-cordatis, subæqualibus.

Propr. radii mascula, *Petalis* quinque, maximis, inæqualibus, inflexo-bifidis.

STAM. *Filamenta* quinque, simplicia. *Anthera* subrotundæ.

PIST. *Germen* inferum. *Styli* duo, subulati, persistentes. *Stigmata* obtusa.

PER. nullum. *Fructus* subovatus, perianthio & pistillo coronatus. bipartibilis.

SEM. duo, subovata, hinc convexa, striata, inde plana, apice dentato.

OBS. Perianthium in hoc genere magis, quam in reliquis manifestum.

OBS. Oe. globosulæ fructus globosi.

573. ECHINOPHORA. † Tournef. 423.

CAL. Umbella universalis radiis plurimis: intermediis brevioribus. Partialis flosculis sessilibus, pluribus: centrali sessili: germina intra pedicellos recipiens.

Involucrum universale radiis nonnullis acutis. Partiale turbinatum, monophyllum, sexfidum, acutum, inæquale.

Perianthium proprium quinquedentatum, persistens, minimum.

COR. universalis difformis, radiata. Flosculi masculi abortivi. Femineo centrali umbellæ.

Propria pentapetala: Petalis inæqualibus, patulis.

STAM. Filamenta quinque, simplicia. Antheræ subrotundæ.

PIST. Germen oblongum, inferum, involucello vestitum.

Styli duo, simplices. Stigmata simplicia.

PER. nullum, cujus loco Involucrum induratum; mucronatum.

SEM. unicum, ovato-oblongum.

574. CAUCALIS. * Tournef. 171.

CAL. Umbella universalis inæqualis, radiorum paucissimorum.

Partialis inæqualis, radiis copiosior, quorum quinque exteriores majores.

Involucrum universale foliolis numero radiorum, indivisis, lanceolatis, margine membranaceis, ovatis, brevibus: Partiale foliolis consimilibus, radiis longioribus, sæpius quinis.

Perianthium proprium quinquedentatum, exsertum.

COR. universalis difformis, radiata. Flosculi disci abortivi.

Propria disci mas: parva. Petalis quinque, inflexo-cordatis, æqualibus. Propria radii hermaphrodita: Petalis quinque, inflexo-cordatis, inæqualibus: extimo maximo, bifido.

STAM. omnibus Filamenta quinque, capillaria. Antheræ parvæ.

PIST. *radii Germen* oblongum, scabrum, inferum. *Styli* duo, subulati. *Stigmata* duo, patentia, obtusa.

PER. *Fructus* ovato-oblongus, striis longitudinalibus, setulis rigidis hispidus.

SEM. duo, oblonga, hinc convexa, subulatis acuminibus secundum strias armata, inde plana.

Obs. *Involucrum universale in quibusdam deficit.*

575. ARTEDIA. *

CAL. *Umbella universalis* patens, plana, multiplex. *Partialis* parva, consimilis.

Involucrum universale decaphyllum circiter: *foliis* ovato-oblongis, apice trifetis, longitudine fere umbellæ: *Partiale* bi-tri-phyllum, extrorsum vergens: *foliis* linearibus, pinnatis, umbellula longioribus.

COR. *universalis* difformis, radiata. *Flosculi* Disci abortivi.

Propria disci mas: Petalis quinque, inflexo-cordatis erectis.

Prop. radii hermaphrodita, petalis consimilibus, sed extimo majore.

STAM. omnibus *Filamenta* quinque, capillaria. *Antherae* simplices, subrotundæ.

PIST. *radii Germen* parvum, inferum. *Styli* duo, reflexi. *Stigmata* simplicia.

PER. nullum. *Fructus* subrotundus, compressus, per marginem foliaceo-squamosus, bipartibilis.

SEM. duo, oblonga, per marginem squamis subrotundis patentibus adspersa.

576. DAUCUS. * Tournef. 161.

CAL. *Umbella universalis* multiplex, florens plana, fructifera concavo-connivens. *Partialis* multiplex, consimilis.

Involucrum universale polyphyllum, longitudine umbellæ: *foliis* linearibus, pinnatifidis. *Partiale* simplicius, longitudine umbellulæ.

Perianthium proprium vix manifestum.

COR. *universalis* difformis, subradiata: *Flosculi* disci abortivi.

Propria Petalis quinque, inflexo-cordatis, exterius majoribus.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria. *Antheræ* simplices.
 PIST. *Germen* inferum parvum. *Styli* duo, reflexi. *Stigmata* obtusa.

PER. nullum. *Fructus* ovatus, sæpe undique pilis rigidis hispidus, bipartibilis.

SEM. duo, subovata, hinc convexa, hispida, inde plana.

577. ARCTOPUS. †

* *Mas.*

CAL. *Umbella universalis* longa, inæqualis.

partialis brevior, copiosior.

involucrum universale pentaphyllum, breve.

partiale pentaphyllum, longitudine umbellulæ.

Perianthium quinquepartitum, minimum.

COR. *universalis* uniformis.

Propria Petalis quinque, integris, oblongis.

STAM. *Filamenta* quinque, setacea, corolla longiora.

Antheræ simplices.

PIST. *Germen* nullum. *Styli* duo, setacei, staminibus longiores. *Stigmata* simplicia.

PER. abortiens.

* *Femina* in distincta planta.

CAL. *Umbella partialis* flosculis sessilibus.

Involucrum partiale monophyllum, quadripartitum, patens, margine spinosum, multiflorum, maximum.

COR. *proprie disci* masculæ, plures, ut in mare.

radii femineæ, quatuor, pentapetalæ.

STAM. *masculis disci* ut in mare.

PIST. *Femineis* *Germen* subulatum, hispidum, sub receptaculo flosculi. *Styli* duo reflexi, persistentes.

Stigmata simplicia.

PER. nullum. *Involucrum* spinis connivens.

SEM. *Femineis* solitaria, cordata acuminata, extrorsum flexa, superne hispida. bilocularia, magnitudine involucri.

578. TORDYLIUM. * *Tournef.* 170.

CAL. *Umbella universalis* inæqualis, multiplex. *Partialis* inæqualis, multiplex, brevissima, plana.

Involucrum universale foliolis tenuibus, indivisis, longitudine sæpius umbellæ. *Partiale* dimidiatum, extrorsum umbellula longius.

Perianthium proprium quinquedentatum.

COR. *universalis* difformis, radiata. *Flosculi* omnes fertiles.

Propria disci petalis quinque, inflexo-cordatis, æqualibus.

Propria radii consimilis, sed extimo petalo maximo, bipartito.

STAM. omnibus *Filamenta* quinque, capillaria. *Antherae* simplices.

PIST. omnibus *Germen* subrotundum, inferum. *Styli* duo, parvi. *Stigmata* obtusa.

PER. *Fruſtus* suborbiculatus, compressus, margine crenulatus, bipartibilis.

SEM. duo, subrotunda, fere plana: margine elevato crenulato.

579. LASERPITIUM. * *Tournef.* 172.

CAL. *Umbella universalis* maxima, radiorum viginti ad quadraginta: *Partialis* radiis plurimis, plana.

Involucrum universale polyphyllum, parvum: *Partiale* polyphyllum, parvum.

Perianthium proprium quinquedentatum, obsoletum.

COR. *universalis* uniformis: *Flosculi* omnes fertiles.

Propria Petalis quinque, inflexo-emarginatis, subæqualibus, patentibus.

STAM. *Filamenta* quinque, fetosa, longitudine corollæ. *Antherae* simplices.

PIST. *Germen* subrotundum, inferum. *Styli* duo, crassiusculi, acuminati, distantes. *Stigmata* obtusa, patentia.

PER. nullum. *Fruſtus* oblongus, octo membranis longitudinalibus angulatus, bipartibilis.

SEM. duo, maxima, oblonga, semi-cylindracea, hinc plana, inde margine & dorso membranis (simul quatuor) instructa.

OBS. L. *Sileris femina* *fulcata* absque membranulis.

580. PEUCEDANUM. * *Tournef.* 169.

CAL. *Umbella universalis* multiplex, longissima, tenuis: *partialis* patens.

Involucrum universale polyphyllum, lineare, parvum, reflexum: *partiale* minus.

- Perianthium proprium* quinquedentatum, minimum.
 COR. *universalis* uniformis: *Flosculi* disci abortivi.
Propria Petalis quinque, aequalibus, oblongis, incurvis, integris.
 STAM. *Filamenta* quinque, capillaria. *Antheræ* simplices.
 PIST. *Germen* oblongum, inferum. *Styli* duo, parvi. *Stigmata* obtusa.
 PER. nullum. *Fructus* ovatus, ala cinctus, utrinque striatus, bipartibilis.
 SEM. duo, ovato-oblonga, compressa, hinc convexiora, striis tribus elevatis notata, margine membrana lata integra cincta, apice emarginata.

581. AMMI. * *Tournef.* 159.

- CAL. *Umbella universalis* multiplex, sæpe quinquaginta radiorum. *Partialis* brevis, conferta.
Involucrum universale foliolis pluribus, linearibus, pinatifidis, acutis, longitudine vix umbellæ. *Partiale* polyphyllum: foliolis linearibus, acutis, simplicibus, umbellula brevioribus.
Perianthium proprium vix manifestum.
 COR. *universalis* uniformis. *Flosculi* omnes fertiles.
Propria Petalis quinque, inflexo cordatis, inæqualis magnitudinis in radio, æqualis fere in disco.
 STAM. *Filamenta* quinque, capillaria. *Antheræ* subrotundæ.
 PIST. *Germen* inferum. *Styli* duo, reflexi. *Stigmata* obtusa.
 PER. nullum. *Fructus* subrotundus, lævis, striatus, parvus, bipartibilis.
 SEM. duo, hinc convexa, striata; inde plana.
 OBS. A. copticum *fructu muricato gaudet.*

582. HASSELQUISTIA. *

- CAL. *Umbella patens*. *Umbellula* decem, quarum quinque in ambitu.
Umbellula centralis rudimentum est Corpusculum emortuum vitiatum, pedicellatum, subtrigonum, carnosum, depressum, atrum, supra canescens villis albis.
Involucrum minimum, pentaphyllum, subulatum, reflexum. *Involucella* dimidiata: exteriorum triphylla, subulata, nutantia, umbellula breviora.

Umbella frustifera connivens.

COR. *Flores* radiati, etiam umbellularum interiorum. *Flosculi* radii hermaphroditi; petalis inæqualibus, incurvato-bifidis; petalo extimo laciniis duabus & proximo unica magnis (adeoque corollulæ singulæ laciniis 4. magnis & 6. parvis). *Flosculi disci interioris* masculi: petalis subæqualibus, incurvato-bifidis (omnibus laciniis parvis).

STAM. *Filamenta* omnibus flosculis quinque, minoribus petalis longiora. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* inferum. *Styli* filiformes, persistentes. *Stigmata* obtusa.

PER. nullum.

SEM. *extima* geminata, ovalia, glabra, margine crassiore crenulato. *Interiora* foliaria, hemisphærica, cernua, urceolata latere cavo, stylis instructa etiam duobus.

Disci interioris nulla.

583. CONIUM. * *Cicuta*. *Tournef.* 160.

CAL. *Umbella universalis* radiis pluribus patentibus. *Partialis* consimilis.

Involucrum universale polyphyllum, brevissimum, inæquale: *Partiale* dimidiatum, triphyllum.

Perianthium proprium vix notabile.

COR. *universalis* uniformis.

Propria Petalis quinque, inflexo-cordatis, inæqualibus.

STAM. *Filamenta* quinque, simplicia. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* inferum. *Styli* duo, reflexi. *Stigmata* obtusa.

PER. nullum. *Fructus* subglobosus, quinquestriatus, striis crenatus, bipartibilis.

SEM. duo, hinc convexa, fere hemisphærica, striata, inde plana.

OBS. *Flosculi vel hermaphroditi vel masculi.*

C. rigens muricata semina habet.

C. Royeni semina radiato spinosa.

584. BUNIU. † *Bulbocastanum*. *Tournef.* 161.

CAL. *Umbella universalis* multiplex, radiis viginti paucioribus. *Partialis* brevissima, conferta.

Involucrum universale polyphyllum, lineare, breve.

Partiale setaceum, longitudine umbellulæ.

Perianthium proprium vix manifestum.

COR. *universalis* uniformis: *Flosculi* omnes fertiles.

Propria Petalis quinque, inflexo-cordatis, æqualibus.

STAM. *Filamenta* quinque, corolla breviora, simplicia.

Antheræ simplices.

PIST. *Germen* oblongum, inferum. *Styli* duo, reflexi.

Stigmata obtusa.

PER. nullum. *Fruſtus* ovatus, bipartibilis.

SEM. duo, ovata, hinc convexa, inde plana.

585. ATHAMANTA. * *Oreoselinum* Tournef. 169.

CAL. *Umbella universalis* multiplex, patens: *Partialis* parcior.

Involucrum universale polyphyllum, lineare, radiis paulo brevius: *Partiale* lineare, radiis æqualibus.

Perianthium proprium obsoletum.

COR. *universalis* uniformis: *Flosculi* omnes fertiles.

Propria Petalis quinque, inflexo-emarginatis, parum inæqualibus.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, longitudine corollæ. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* inferum. *Styli* duo, distantes. *Stigmata* obtusa.

PER. nullum. *Fruſtus* ovato-oblongus, striatus, bipartibilis.

SEM. duo, ovata, hinc convexa, striata, inde plana.

586. BUPLEURUM. * *Tournef.* 163.

CAL. *Umbella universalis* radiis quam decem paucioribus. *Partialis* radiis vix decem, erecto-patens.

Involucrum universale polyphyllum. *Partiale* pentaphyllum, majus: *foliolis* patentibus, ovatis, acutis.

Perianthium proprium obsoletum.

COR. *universalis* uniformis. *Flosculi* omnes fertiles.

Propria Petalis quinque, involutis, integris, brevissimis.

STAM. *Filamenta* quinque, simplicia. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* inferum. *Styli* duo, reflexi, parvi. *Stigmata* minima.

PER. nullum. *Fruſtus* ſubrotundus compreſſus, ſtriatus, bipartibilis.

SEM. duo, ovato-oblonga, hinc conuexa, ſtriata, inde plana.

OBS. *Speciebus* plerisque *Involucella ſpecioſa corollulam ſæpe ſupermittit*.

Involucra numero foliolorum variant.

587. HERMAS. †.

* *Hermaphrodita umbella terminalis.*

CAL. *Umbella univerſalis* multiradiata, hemiſphærica.

Partialis multiradiata: radio centrali florifero; reliquis absque ſoſculo ullo.

Involucrum univerſale polyphyllum, lanceolatum, breve, perſiſtens.

Partiale ſubdiphyllum, lanceolatum, longitudine umbellulæ.

Perianthium proprium obſoletum, quinquedentatum.

COR. *univerſalis* ſoſculofa.

Propria Petala quinque, oblongo-ovata, erecta, plana, integra, æqualia.

STAM. *Filamenta* quinque, filiformia, petalis breviora.

Anthera ſteriles, oblongæ.

PIST. *Germen* inferum, compreſſum, corolla maius. *Styli* duo, filiformes, erecti, corolla longiores. *Stigmata* obtuſa.

PER. nullum. *Fruſtus* orbiculatus, baſi emarginatus, angulis dehifcens.

SEM. duo, cordato-orbiculata, compreſſo-plana, marginata, notata ſtria unica longitudinali elevata.

* *Maſculæ umbellæ laterales, ſeriores, ejusdem planitæ (a D. Burmanno communicatæ)*

CAL. *Umbella univerſalis* ut *Hermaphroditi*.

Partialis multiradiata: radiis omnibus floriferis.

Involucrum ut *Hermaphroditis*.

Perianthium fere nullum.

COR. uti *Hermaphroditis*.

STAM. *Filamenta* quinque, filiformia, longitudine corollulæ. *Anthera* polliniferæ, ovales, ſubdidymæ.

588. SIUM. * *Tournef.* 162. *Sisarum Tournef.*
163.

CAL. *Umbella universalis* varia in diversis: *Partialis* patens, plana.

Involucrum universale polyphyllum, reflexum, umbella brevius: *foliolis* lanceolatis: *Partiale* polyphyllum, lineare, parvum.

Perianthium proprium vix notabile.

COR. *universalis* uniformis: *Flo. culi* omnes fertiles.

Propria Petalis quinque, inflexo cordatis, æqualibus.

STAM. *Filamenta* quinque, simplicia. *Anthera* simplices.

PIST. *Germen* minimum, inferum. *Styli* duo, reflexi. *Stigmata* obtusa.

PER. nullum. *Fructus* subovatus, striatus, parvus, bipartibilis.

SEM. duo, subovata, hinc convexa striata, inde plana.

589. SELINUM. * *Thysselinum* T.

CAL. *Umbella universalis* multiplex, plano-patens: *Partialis* consimilis.

Involucrum universale polyphyllum: *foliolis* lanceolato-linearibus, reflexis: *Partiale* consimile, patens, longitudine corollulæ.

Perianthium proprium vix notabile.

COR. *universalis* uniformis: *Flo. culi* omnes fertiles.

Propria Petalis quinque, cordatis, æqualibus.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria. *Anthera* subrotundæ.

PIST. *Germen* inferum. *Styli* duo, reflexi. *Stigmata* simplicia.

PER. nullum. *Fructus* compresso-planus, ovali-oblongus, utrinque in medio striatus, bipartibilis.

SEM. duo, ovali-oblonga, utrinque plana, medio striata, lateribus membranaceis.

OBS. *Semina* figura, involucra numero foliorum variant.

590. CUMINUM. * *Tournef.*

CAL. *Umbella universalis* partialesque sæpius quadripartitæ.

Involucrum universale foliolis totidem, longissimis, integerrimis, quibusdam trifidis. *Partiale* consimile.

Perianthium proprium vix manifestum. Flosculi omnes fertiles.

COR. *universalis* uniformis.

Propria Petalis quinque, inflexo-emarginatis, subinaequalibus.

STAM. *Filamenta* quinque et simplicia. *Antherae* simplices.

PIST. *Germen* ovatum, flore majus, inferum. *Styli* duo, minimi. *Stigmata* simplicia.

PER. nullum. *Fructus* ovatus, striatus.

SEM. duo, ovata, hinc convexa striata, inde plana.

591. FERULA. * Tournef. 170.

CAL. *Umbella universalis* multiplex, globosa: *Partialis* consimilis.

Involucrum universale caducum: *Partiale* polyphyllum, lineare, parvum.

Perianthium proprium vix notabile.

COR. *universalis* uniformis: *Flosculi* omnes fertiles.

Propria Petalis quinque, oblongis, rectiusculis, subaequalibus.

STAM. *Filamenta* quinque, longitudine corollae. *Antherae* simplices.

PIST. *Germen* turbinatum, inferum. *Styli* duo, reflexi. *Stigmata* obtusa.

PER. *Fructus* ovalis, plano-compressus, utrinque tribus lineis elevatis notatus, bipartibilis.

SEM. duo, maxima, elliptica, utrinque plana, tribus striis distinctis notata.

OBS. *Pedunculus umbellae primariae pedunculos laterales oppositorum admittit.*

592 CRITHMUM. * Tournef. 169.

CAL. *Umbella universalis* multiplex, hemisphaerica: *Partialis* consimilis.

Involucrum universale polyphyllum: *foliolis* lanceolatis, obtusis, reflexis; *Partiale* lanceolato-lineare, longitudine umbellulae.

Perianthium proprium vix notabile.

COR. *universalis* uniformis: *Flosculi* omnes fertiles.

Propria Petalis quinque, ovatis, inflexis, aequalibus.

STAM. *Filamenta* quinque, simplicia, corolla longiora. *Antherae* subrotundae.

PIST. *Germen inferum. Styli duo, reflexi. Stigmata obtusa.*

PER. nullum. *Fructus ovalis, compressus, bipartibilis.*

SEM. duo, elliptica, compresso plana, hinc striata.

593. BUBON. *

CAL. *Umbella universalis* radiorum circiter decem: *mediis* brevioribus. *Partialis* radiis quindecim, usque ad viginti.

Involucrum universale pentaphyllum: *foliis* lanceolato-acuminatis, patulis, æqualibus, umbella longe brevioribus, persistentibus. *Partiale* foliis paulo pluribus, conformibus, longitudine umbellulæ.

Perianthium proprium quinquedentatum, minimum, persistens.

COR. *universalis* uniformis: *Flosculi* omnes fertiles.

Propria Petalis quinque, lanceolatis, inflexis.

STAM. *Filamenta* quinque, simplicia, longitudine corollulæ. *Antheræ* simplices.

PIST. *Germen* ovatum, inferum. *Styli* duo, setacei, persistentes, longitudine vix corollulæ, reflexo-patentes. *Stigmata* obtusa.

PER. nullum. *Fructus* ovatus, striatus, villosus, bipartibilis, coronatus.

SEM. duo, ovata, inde plana, hinc convexa, striata, villosa.

594. CACHRYS. * *Tournef.* 172.

CAL. *Umbella universalis* multiplex: *Partialis* consimilis.

Involucrum universale polyphyllum, lineari-lanceolatum: *partiale* consimile.

Perianthium proprium vix notabile.

COR. *universalis* uniformis: *Flosculi* omnes fertiles.

Propria Petalis quinque, lanceolatis, erectiusculis, æqualibus, planiusculis.

STAM. *Filamenta* quinque, simplicia, longitudine corollæ. *Antheræ* simplices.

PIST. *Germen* turbinatum, inferum. *Styli* duo, simplices, longitudine corollæ. *Stigmata* capitata.

PER. *Fructus* subovatus, angulatus, obtusus, maximus, suberoso-corticatus, bipartibilis.

SEM. duo, maxima, hinc convexissima, inde plana; fungosa, foeta Nucleis solitariis, ovato-oblongis.

OBS. *Semina in diversis diversa.*

595. LIGUSTICUM. * *Tournef.* 171. *Cicutaria Tournef.* 171.

CAL. *Umbella universalis* multiplex: *Partialis* multiplex
Involucrum universale membranaceum, heptaphyllum, inaequale: *Partiale* vix tetraphyllum, membranaceum.

Perianthium proprium quinquedentatum, obsoletum.

COR. *universalis* uniformis: *Flosculi* omnes fertiles.

Propria Petalis quinque, aequalibus, involutis, planis, integris, introrsum carinatis.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, corolla breviora.
Antherae simplices.

PIST. *Germen inferum.* *Styli* duo, approximati. *Stigmata* simplicia.

PER. nullum. *Fructus* oblongus, angulatus, quinquesulcatus, utrinque bipartibilis.

SEM. duo, oblonga, glabra, hinc striis quinque elevatis notata, inde plana.

OBS. *Flosculi* ♂ & ♀ masculi observantur.

OBS. *Semina ejusdem fructus in L. peloponnesiaco figura diversa.*

596. ANGELICA. *

CAL. *Umbella universalis* multiplex, subrotunda: *Partialis* florens exacte globosa.

Involucrum universale tri-vel pentaphyllum, parvum: *Partiale* parvum, octophyllum.

Perianthium proprium quinquedentatum, vix notabile.

COR. *universalis* uniformis: *Flosculi* omnes fertiles.

Partialis Petalis quinque, aequalibus, lanceolatis, planiusculis, incurvis, caducis.

STAM. *Filamenta* quinque, simplicia, corolla longiora.
Antherae simplices.

PIST. *Germen inferum.* *Styli* duo, reflexi. *Stigmata* obtusa.

PER. nullum. *Fructus* subrotundus, angulatus, solidus, bipartibilis.

SEM. duo, ovata, hinc plana, margine cincta; inde convexa, tribus lineis exarata.

597. SISON. *

CAL. *Umbella universalis* radiis sex paucioribus, inæqualibus. *Partialis* radiis decem paucioribus, inæqualibus.

Involucrum universale subtetraphyllum, inæquale: *Partiale* consimile.

Perianthium vix manifestum.

COR. *universalis* uniformis. *Flosculi* omnes fertiles.

Propria æqualis: Petalis quinque, lanceolatis, inflexis, planiusculis.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, longitudine corollæ. *Antheræ* simplices.

PIST. *Germen* subovatum, inferum. *Styli* duo, reflexi. *Stigmata* obtusa.

PER. nullum. *Fructus* ovatus, striatus, bipartibilis.

SEM. duo, ovata, hinc convexa striata, inde plana.

598. DANAA. *Allion. flor. ped. v. II. p. 34. num. 1392.*

CAL. *Umbella universalis* maxima, patens, radiorum quindecim: *Partialis* radiis circiter viginti.

Involucrum universale polyphyllum: foliolis lanceolatis, acutis, patentibus, brevissimis: *Partiale* nullum. (*Saltem in icone quam coram habeo non expressum.*)

Perianthium proprium parvum, quinquedentatum.

COR. *universalis* uniformis.

Propria Petalis quinque, ovatis, æqualibus, inflexo-emarginatis: ungue brevissimo.

STAM. *Filamenta* quinque, longitudine corollæ. *Antheræ* didymæ.

PIST. *Germen* subglobosum, inferum. *Styli* duo, divergentes.

PER. nullum. *Fructus* globosus, didymus, bipartibilis.

SEM. duo, subrotunda, apice acutiuscula, lævia, nitida, nucleum liberum non continentia.

OBS. *Habitus Laserpitii aquilegifolii, sed fructus diversissimus. Characterem ex Allionii descriptione collata icone ad normam adfinium concinnavi, ab autoptis emendandum.*

599. *ÆTHUSA*. * *Meum* Tournef. 165.

CAL. *Umbella universalis patens, radiis interioribus per gradus brevioribus, intimis brevissimis. Partialis parva, patens.*

Involucrum universale nullum. Partiale dimidiatum, extus positum: foliis tribus s. quinque longissimis, linearibus, pendulis.

Perianthium proprium vix notabile.

COR. *universalis subuniformis. Flosculi omnes fertiles.*

Partialis Petalis quinque, inflexo-cordatis, inæqualibus.

STAM. *Filamenta quinque, simplicia. Anthera subrotundæ.*

PIST. *Germen interum. Styli duo, reflexi. Stigmata obtusa.*

PER. *nullum. Fructus ovato-subrotundus, striatus, bipartibilis.*

SEM. *duo, subrotunda, striata, inde ad tertiam partem plana.*

600. *CORIANDRUM*. * *Tournef.* 168.

CAL. *Umbella universalis radiis paucis: Partialis radiis pluribus.*

Involucrum universale vix monophyllum. Partiale triphyllum, dimidiatum, lineare.

Perianthium proprium quinquedentatum, exsertum.

COR. *universalis difformis, radiata. Flosculi disci abortivi.*

Propria disci hermaphrodita. Petalis quinque, inflexo-emarginatis, æqualibus.

Propria radii hermaphrodita: Petalis quinque inflexo-cordatis, inæqualibus, quorum extimum maximum, bipartitum; lateralia vero proxima lacinia maxima gaudent.

STAM. *Filamenta quinque, simplicia. Anthera subrotundæ.*

PIST. *Germen inferum. Styli duo, distantes. Stigmata radii capitata.*

PER. nullum. *Fructus sphaericus, bipartibilis.*

SEM. duo, hemisphaerica, concava.

OBS. C. testiculatum forte diversi generis planta, cum involucri universale monophyllum, partiale nullum.

Corolla universalis uniformis. Fructus didynus.

601. SCANDIX. * Tournef. 173.

CAL. *Umbella universalis longa, radiis paucis: Partialis copiosior.*

Involucrum universale nullum: Partiale pentaphyllum, longitudine umbellulae.

Perianthium proprium obsoletum.

COR. *universalis difformis, radiata: Flosculi disci abortivi.*

Propria Petalis quinque, inflexo-emarginatis: intimis minoribus; extremo majori.

STAM. *Filamenta quinque, capillaria. Antherae subrotundae*

PIST. *Germen oblongum, inferum. Styli duo, subulati, longitudine minimi petali, distantes, persistentes. Stigmata flosculis radiantibus obtusa.*

PER. nullum. *Fructus longissimus, subulatus, bipartibilis*

SEM. duo, subulata, hinc convexa sulcata, inde plana.

OBS. *Flosculi disci abortiunt in quibusdam.*

Pectini veneris semina filiformia, basi nucleum condentia.

Cerfolio Riv. semina ovato-subulata, striata. Involucrum viride, persistens. Flosculi omnes Herniaphroditici.

Odoratae Semina angulata. Involucrum caducum.

602. CHÆROPHYLLUM. * Chærophylli species Tournef. 166.

CAL. *Umbella universalis patens: Partialis radiorum numero fere par.*

Involucrum universale nullum. Partiale subpentaphyllum: foliolis lanceolatis, concavis, reflexis, longitudine fere umbellulae.

Perianthium proprium obsoletum.

COR. *universalis subuniformis. Flosculi disci abortivi.*

- Propria* Petalis quinque, inflexo-cordatis: mucrone inflexo, planiusculis; *exterioribus* paulo majoribus.
STAM. *Filamenta* quinque, simplicia, longitudine umbellulæ. *Antheræ* subrotundæ.
PIST. *Germen* inferum. *styli* duo, reflexi. *Stigmata* obtusa.
PER. nullum. *Fructus* oblongus, acuminatus, lævis, bipartibilis.
SEM. duo, oblonga, superne attenuata, hinc convexa, inde plana.
OBS. *Semina disci saepe abortiunt.* *Fructus figura variat.*

603. PHELLANDRIUM. * *Tournef.* 161.

- CAL.** *Umbella universalis* multiplex. *Partialis* confimilis. *Involucrum universale* nullum. *Partiale* heptaphyllum: *foliis* acutis, longitudine umbellulæ.
Perianthium proprium, quinquedentatum, persistens.
COR. *universalis* fere uniformis. *Flosculi* omnes fertiles, disci minores.
Propria inæqualis. *Petalis* quinque acuminatis, cordato-inflexis.
STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, corolla longiora. *Antheræ* subrotundæ.
PIST. *Germen* inferum. *styli* duo, subulati, erecti, persistentes. *Stigmata* obtusa.
PER. nullum. *Fructus* ovatus, lævis, coronatus perianthio & pistillis, bipartibilis.
SEM. duo, ovata, glabra.

604. IMPERATORIA. *

- CAL.** *Umbella universalis* expanso-plana: *Partialis* inæqualis.
Involucrum universale nullum: *Partiale* foliolo uno alterove, tenuissimum, longitudine fere umbellulæ.
Perianthium proprium obsoletum.
COR. *universalis* uniformis. *Flosculi* omnes fertiles.
Propria Petalis quinque, inflexo-emarginatis, subæqualibus.
STAM. *Filamenta* quinque, capillaria. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen inferum. Styli duo, reflexi. Stigmata obtusa.*

PER. nullum. *Fruſtus ſubrotundus, compreſſus, medio gibbus, marginatus, bipartibilis.*

SEM. duo, ovata, hinc ſulcis duobus exarata, *marginato cinſta.*

605. SESELI. * *Boerh. i. p. 50.*

CAL. *Umbella univerſalis rigida: Partialis breviffima, multiplex, globosa.*

Involucrum univerſale nullum: Partiale foliolo uno alterove, lineare, acuminatum, longitudine umbellulæ.

Perianthium vix notabile.

COR. *univerſalis uniformis. Floſculi omnes fertiles.*

Propria Petalis quinque, inflexo-cordatis, planiſcula.

STAM. *Filamenta quinque, ſubulata. Antheræ ſimplices.*

PIST. *Germen inferum. Styli duo, diſtantes. Stigmata obtuſa.*

PER. nullum. *Fruſtus ovatus, parvus, ſtriatus, bipartibilis.*

SEM. duo, ovata, hinc convexa ſtriata, inde plana.

606. CICUTA. *

CAL. *Umbella univerſalis ſubrotunda: radiis plurimis, æqualibus. Partialis ſubrotunda, radiis plurimis, æqualibus, ſetaceis.*

Involucrum univerſale nullum. Partiale polyphyllum: foliolis ſetosis, brevibus.

Perianthium proprium vix notabile.

COR. *univerſalis uniformis. Floſculi omnes fertiles.*

Propria Petalis quinque, ovatis, inflexis, ſubæqualibus.

STAM. *Filamenta quinque, capillaria, corolla longiora. Antheræ ſimplices.*

PIST. *Germen inferum. Styli duo, filiformes, corolla longiores, perſiſtentes. Stigmata capitata.*

PER. nullum. *Fruſtus ſubovatus, ſulcatus, bipartibilis.*

SEM. duo, ſubovata, hinc convexa ſtriata, inde plana.

607. SMYRNIUM. * *Tournef.* 168.

CAL. *Umbella universalis* inæqualis, in dies major evadens: *Partialis* erecta.

Involucrum universale nullum: *Partiale* nullum.

Perianthium proprium vix manifestum.

COR. *universalis* uniformis. *Flosculi* disci abortivi.

Propria Petalis quinque, lanceolatis, leviter inflexis, carinatis.

STAM. *Filamenta* quinque, simplicia, longitudine corollæ. *Anthera* simplices.

PIST. *Germen* inferum. *Styli* duo, simplices. *Stigmata* duo, simplicia.

PER. nullum. *Fructus* oblongus, striatus, bipartibilis.

SEM. duo, lunulata, hinc convexa, tribus angulis notata, inde plana.

608. CARUM. Carui *Tournef.* 160.

CAL. *Umbella universalis* longa, radiis decem, sæpius inæqualibus: *Partialis* conferta.

Involucrum universale sæpe monophyllum: *Partiale* nullum.

Perianthium vix manifestum.

COR. *universalis* uniformis. *Flosculi* disci abortivi.

Propria inæqualis: *Petalis* quinque, inæqualibus, obtulis, carinatis, inflexo-emarginatis.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, longitudine corollæ, caduca. *Anthera* subrotundæ, minimæ.

PIST. *Germen* inferum. *Styli* duo, minimi. *Stigmata* simplicia.

PER. nullum. *Fructus* ovato-oblongus, striatus, bipartibilis.

SEM. duo, hinc convexa, ovato-oblonga, striata, inde plana.

OBS. *Flosculi* in disco nonnulli neutri sunt.

609. THAPSIA. * *Tournef.* 171.

CAL. *Umbella universalis* magna, circiter viginti radiorum, longitudinis fere æqualis: *Partialis* radiis totidem, fere æqualibus.

Involucrum universale nullum : *Partiale* nullum.

Perianthium proprium vix notabile.

COR. *universalis* uniformis. *Flosculi* omnes fertiles.

Propria Petalis quinque, lanceolatis, incurvis.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, longitudine corollæ. *Antheræ* simplices.

PIST. *Germen* oblongum, inferum. *Styli* duo, breves. *Stigmata* obtusa.

PER. nullum. *Fructus* oblongus, membrana longitudinaliter cinctus, bipartibilis.

SEM. duo, maxima, oblonga, convexa, utrinque acuminata, margine utrinque plano integro magnoque cincta, qui apice & basi emarginatus est.

OBS. T. trifoliata *fructus Selini caruifoliae* s. Monnieri, sed *Involucra* nulla.

610. PASTINACA. * Tournef. 170.

CAL. *Umbella universalis* multiplex, plana : *Partialis* multiplex.

Involucrum universale nullum : *Partiale* nullum.

Perianthium proprium obsoletum.

COR. *universalis* uniformis. *Flosculi* omnes fertiles.

Propria Petalis quinque, lanceolatis, involutis, integris.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria. *Anthera* subrotunda.

PIST. *Germen* inferum. *Styli* duo, reflexi. *Stigmata* obtusa.

PER. nullum. *Fructus* compresso-planus, ellipticus, bipartibilis.

SEM. duo, elliptica, margine cincta, utrinque fere plana.

611. ANETHUM. * Tournef. 160. Foeniculum. Tournef. 164.

CAL. *Umbella universalis* multiplex : *Partialis* multiplex.

Involucrum universale nullum : *Partiale* nullum.

Perianthium proprium obsoletum.

COR. *universalis* uniformis. *Flosculi* omnes fertiles.

Propria Petalis quinque, involutis, integris, brevissimis.

STAM. Filamenta quinque, capillaria. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* inferum. *styli* duo, approximati, obsoleti. *Stigmata* obtusa.

PER. nullum. *Fruſtus* subovatus, compressus, striatus, bipartibilis.

SEM. duo, subovata, marginata, hinc convexa, striata, inde plana.

OBS. Anethi T. *Semina* margine membranaceo cincta sunt.
Fœniculi T. *Semina* margine membranaceo destituta sunt.

612. ÆGOPodium. *

CAL. *Umbella* universalis multiplex, convexa: *Partialis* confimilis, plana.

Involucrum universale nullum. *Partiale* nullum.

Perianthium proprium vix notabile.

COR. universalis uniformis; *Flosculi* omnes fertiles.

Propria Petalis quinque, obovatis, concavis, inflexis apice, æqualibus.

STAM. Filamenta quinque, simplicia, corolla duplo longiora. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* inferum. *Styli* duo, simplices, erecti, longitudine corollulæ. *Stigmata* capitata.

PER. nullum. *Fruſtus* ovato-oblongus, striatus, bipartibilis.

SEM. duo, ovato-oblonga, hinc convexa, striata, inde plana.

613. APIUM. * Tournef. 163.

CAL. *Umbella* universalis radiis paucioribus: *Partialis* radiis pluribus.

Involucrum universale parvum, unico vel pluribus foliolis: *Partiale* confimile.

Perianthium proprium obsoletum.

COR. universalis uniformis: *Flosculi* omnes fertiles.

Propria Petalis subrotundis, inflexis, æqualibus.

STAM. Filamenta quinque, simplicia. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen inferum. Styli duo, reflexi. Stigmata obtusa.*

PER. nullum. *Fructus ovatus, striatus, bipartibilis.*

SEM. duo, ovata, hinc striata, inde plana.

OBS. A. *Petrofelinum involucellis minutis instructum.*

614. PIMPINELLA. * *Tragofelinum Tournef.*

163.

CAL. *Umbella universalis radiis pluribus: Partialis radiis, adhuc pluribus.*

Involucrum universale nullum: Partiale nullum.

Perianthium proprium vix notabile.

COR. *universalis subuniformis. Flosculi omnes fertiles.*

Propria Petalis quinque, inflexo-cordatis, subæqualibus.

STAM. *Filamenta quinque, simplicia, corollula longiora. Antheræ subrotundæ.*

PIST. *Germen inferum. Styli duo, brevissimi. Stigmata subglobosa.*

PER. nullum. *Fructus ovato-oblongus, bipartibilis.*

SEM. duo, oblonga, versus apicem angustiora, hinc convexa striata, inde plana.

OBS. P. *dichotomæ fructus subglobosus.*

P. *dioica (olim Seseli pumilum) petala non emarginata gerit.*

615. CUSSONIA. *Suppl. p. 25. Thunb. diff. nov. gen. p. 10.*

CAL. *Perianthium: Margo receptaculi dilatatus, subin-
quedentatus, persistens.*

COR. *Petala quinque, trigona, acuta, sessilia.*

STAM. *Filamenta quinque.*

PIST. *Germen inferum, turbinatum, coronatum. Styli
duo, filiformes, erecti, dein expansi. Stigmata sim-
plicia.*

PER. *subrotundum, biloculare, s. bicoccum.*

SEM. *solitaria.*

III. TRIGYNIA.

616. VIBURNUM. * *Tournef.* 377. *Vaill. A.*
G. 1722. *Tinus. Tournef.* 377. *Vaill.*
A. G. 1722. *Opulus. Tournef.* 376. *Vaill.*
A. G. 1722.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, superum, minimum, persistens.

COR. monopetala, campanulata, quinquefida: *laciniis* obtusis, reflexis.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, corollæ longitudine. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* inferum, subrotundum. *Stylus* nullus, cujus loco Glandula turbinata. *Stigmata* tria.

PER. *Bacca* subrotunda, unilocularis.

SEM. unicum, osseum, subrotundum.

617. SAMBUCUS. * *Tournef.* 376. *Vaill. A.*
G. 1722.

CAL. *Perianthium* monophyllum, superum, quinquepartitum, minimum, persistens.

COR. monopetala, rotato-concava, quinquefida, obtusa: *laciniis* reflexis.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, longitudine corollæ. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* inferum, ovatum, obtusum. *Stylus* nullus, cujus loco Glandula ventricosa. *Stigmata* tria, obtusa.

PER. *Bacca* subrotunda, unilocularis.

SEM. tria, hinc convexa, inde angulata.

618. ZANONIA. †

* *Mas.*

CAL. *Perianthium* triphyllum: *foliolis* ovatis, patulis, corolla brevioribus.

COR. monopetala, quinquepartita, patens: *laciniis* acuminatis, inflexis, æqualibus.

STAM. *Filamenta* quinque, patentia, longitudine calycis. *Antheræ* simplices.

* *Femina* in distincta planta.

CAL. *Perianthium* ut in mare, germini insidens.

COR. ut in mare.

PIST. *Germen* oblongum, inferum. *Styli* tres, patentes, conici, reflexi, persistentes. *Stigmata* bifida, crispa.

PER. *Bacca* longa, maxima, truncata, basi attenuata, futura crispa versus apicem cincta, trilocularis.

SEM. bina, oblongo-rotunda, plana, in centro squamæ lanceolata.

619. *GRISELINIA*. *Forst. prodr. p. 75.* *Scopolia. Forst. charact. gen. 70.*

* *Flos* hermaphroditus.

CAL. *Perianthium* superum, minutum, quinquedentatum.

COR. }
STAM. } jam decidua.

PIST. *Germen* inferum, oblongum. *Styli* tres, cylindrici, brevissimi. *Stigmata* simplicia.

PER. *Germen* an monospermum?

SEM. —

* *Flos* Masculus.

CAL. ut in hermaphrodito.

COR. *Petala* quinque, lanceolata, horizontaliter patentia.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata. *Anthera* subrotunda.

620. *SEMECARPUS*. *Suppl. p. 25.*

CAL. *Perianthium* inferum, monophyllum, campanulatum, semiquinquesidum. *Laciniae* cordatae, acutae.

COR. *Petala* quinque, lanceolata, marginata, obtusa, calyce majora.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, corolla breviora, receptaculo inserta. *Anthera* oblonga, parva.

PIST. *Germen* superum, depresso-globosum. *Styli* tres, recurvati, germini incumbentes & breviores. *Stigmata* clavata, retusa.

PER. *Drupa* cordato-oblonga, compressiuscula, inaequalis, glabra.

Pulpa cellulosa, succosa.

SEM. *Nux* unica.

621. RHUS. * *Tournef.* 381. *Toxicodendron*
Tournef. 381. *Cotinus Tournef.* 320.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, inferum, erectum, persistens.

COR. *Petala* quinque, ovata, erecto-patentia.

STAM. *Filamenta* quinque, brevissima. *Antheræ* parvæ, corolla breviores.

PIST. *Germen* superum, subrotundum, magnitudine corollæ. *Styli* vix ulli. *Stigmata* tria, cordata, parva.

PER. *Bacca* subrotunda, unilocularis.

SEM. unicum, subrotundum, osseum.

OBS. *Rhus T. Bacca villosa, nucleo globoso.*

Toxicodendron. Bacca glabra, striata: nucleo compresso sulcata.

R. Vernix, radicans & Toxicodendron sunt planta dioica.

622. CASSINE. * *Maurocenia edit.* I.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, inferum: minimum, obtusum, persistens.

COR. quinquepartita, patens: laciniis subovatis, obtusis, calyce majoribus.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, patentia. *Antheræ* simplices.

PIST. *Germen* superum, conicum. *Stylus* nullus. *Stigmata* tria, reflexa, obtusa.

PER. *Bacca* subrotunda, trilocularis, stigmatibus umbilicata.

SEM. solitaria, subovata.

OBS. *Corollam pentapetalam esse S. V. 295.*

OBS. *In C. capenli flores frequentius quadriidi.*

623. SPATHELIA. *Spathe Brown.*

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: *foliolis* oblongis, coloratis.

COR. *Petala* quinque, oblonga, æqualia.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, adscendentia, basi dente notata. *Antheræ* ovatæ.

PIST. *Germen* ovatum, staminibus brevius. *Stylus* nullus. *Stigmata* tria, subrotunda.

PER.

PER. *Capsula* oblonga, trigona, trilocularis.

SEM. solitaria, oblonga, triquetra.

624. STAPHYLEA. * *Staphylodendron Tournef.* 386.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, concavum, subrotundum, coloratum, magnitudine ferme corollæ.

COR. *Petala* quinque, oblonga, erecta, calyci similia. *Nectarium* e receptaculo fructificationis, in fundo floris, concavum, urceolatum.

STAM. *Filamenta* quinque, oblonga, erecta, longitudine calycis. *Antheræ* simplices.

PIST. *Germen* crassiusculum, tripartitum. *Styli* tres, simplices, staminibus paulo longiores. *Stigmata* obtusa, contigua.

PER. *Capsulæ* tres, inflatæ, flaccidæ, longitudinaliter sutura coalitæ, apicibus acuminatis introrsum dehiscen-
tibus.

SEM. bina, ossea, globosa, acumine obliquo & fovea orbiculata ad latus apicis.

OBS. S. pinnatæ numerus ternarius *Pisilli* & *Pericarpii* evadit binarius.

625. SCHREBERA. *Curtisia. Schreb.*

CAL. *Perianthinum* quinquesidum, minimum, persistens: laciniis ovatis, acutis, patulis.

COR. *Petala* quinque, ovata, reflexa, obtusiuscula, infra apicem excavata, crassiuscula margine tenuiore cincta.

Nectarium Glandula annularis, subtriloba, carnosæ.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, inferius planiuscula, erecta, corolla paulo longiora. *Antheræ* subrotundæ, incumbentes.

PIST. *Germine* tria nectario insidentia, extrorsum gibba. *Styli* breves. *Stigmata* simplicia.

PER. *Capsulæ* ? tres, approximatae, subglobosæ, introrsum compressæ, nectarii nunc majoris, trilobi lobis insidentes, uniloculares, interne dehiscen-
tes?

SEM. bina, hinc convexa, inde compresso-angulata.

626. THAMARIX. * *Tamariscus*. *Tournef.*

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, obtusum, erectum, persistens, corolla dimidio brevius.

COR. *Petala* quinque, ovata, concava, obtusa, patentia.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* acuminatum. *Stylus* nullus. *Stigmata* tria, oblonga, revoluta, plumosa.

PER. *Capsula* oblonga, acuminata, triquetra, calyce longior, unilocularis, trivalvis.

SEM. plurima, minima, papposa.

OBS. *T. germanica* *staminibus* decem, quorum alterna exteriora breviora; omnia basi connata.

627. DRYPIS. † *Mich.* 23. *Mygind.* *Jacq.* vind. 304.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulosum, ore quinque-dentato, persistens.

COR. *Petala* quinque. *Ungues* longitudine calycis, angusti. *Limbus* planus: *Laminis* bipartitis: *laciniis* linearibus, obtusis. *Faux* coronata denticulis duobus cujusvis petali.

STAM. *Filamenta* quinque, longitudine corollæ. *Antheræ* simplices, oblongæ, incumbentes.

PIST. *Germen* obovatum, compressum. *Styli* tres, simplices, patuli. *Stigmata* simplicia.

PER. *Capsula* subrotunda, tecta calyce, unilocularis, parva, circumscissa.

SEM. unicum, reniforme, nitidum.

628. TURNERA. * *Flum.* 12.

CAL. *Perianthium* monophyllum, infundibuliforme, deciduum. *Tubus* oblongus, erectus, cylindraceo-angulatus. *Limbus* erectus, quinquepartitus: *laciniis* lanceolatis, longitudine tubi.

COR. *Petala* quinque, obcordata, acuminata, plana, erecto-patentia: *unguibus* angustis, tubo calycis insertis.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, corolla breviora, tubo calycis inserta. *Antheræ* acuminatæ, erectæ.

PIST. *Germen* conicum. *Styli* tres, filiformes, longitudine staminum. *Stigmata* capillaceo-multifida.

PER. *Capsula* ovata, unilocularis, trivalvis. *Receptacula* longitudinaliter valvis annexa, linearia.

SEM. plurima, oblonga, obtusa.

629. SAROTHRÆ. †

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum, erectum, persistens: *laciniis* linearibus, acutis.

COR. *Petala* quinque (sæpius), lanceolato-linearia, obtusa, patula, calyce paulo longiora, decidua.

STAM. *Filamenta* quinque, filiformia, longitudine corollæ. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* ovatum. *Styli* tres, filiformes, longitudine germinis. *Stigmata* simplicia.

PER. *Capsula* oblonga, acuta, unilocularis, trivalvis, colorata.

SEM. plurima, reniformia, minima.

630. ALSINE. *

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: *foliolis* concavis, oblongis, acuminatis.

COR. *Petala* quinque, æqualia, calyce longiora.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* subovatum. *Styli* tres, filiformes. *Stigmata* obtusa.

PER. *Capsula* ovata, unilocularis, trivalvis, calyce tecta.

SEM. plurima, subrotunda.

631. TELEPHIUM. * Tournef. 123.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: *foliolis* oblongis, obtusis, concavis, carinatis, longitudine corollæ, persistentibus.

COR. *Petala* quinque, oblonga, obtusa, inferne angustiora, erecta, receptaculo inserta.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, corolla breviora. *Antheræ* incumbentes.

PIST. *Germen* triquetrum, acutum. *Stylus* nullus. *Stigmata* tria, acuta, patentia.

PER. *Capsula* brevis, triquetra, trivalvis, unilocularis. *Receptaculum* liberum, capsula dimidio brevius.

SEM. plurima, subrotunda.

632. ASTRONIUM. *Jacq. amer. 261.** *Mas.*CAL. *Perianthium* pentaphyllum, coloratum, parvum: *foliolis* ovatis, concavis, obtusis, patulis.COR. *Petala* quinque, ovata, obtusissima, plana, patentissima.*Nectarium* Glandulis quinque, subrotundis, minimis, in disco floris.STAM. *Filamenta* quinque, subulata, patentia, longitudine corollæ. *Antheræ* oblongæ, incumbentes.* *Femina.*CAL. *Perianthium* pentaphyllum, coloratum: *foliolis* oblongis, concavis, obtulis, conniventibus.COR. *Petala* quinque, subovata, obtusa, concava, erecta, calyce minora, persistentia.PIST. *Germen* ovatum, obtusum. *Styli* tres, breves, reflexi. *Stigmata* subcapitata.PER. nullum. *Calyx* incretus, coloratus, primum foliolis suis in pendulam stellam expansis, demum dimittens.

SEM. unicum, ovale, longitudine calycis, lactescens.

633. CORRIGIOLA. * *Polygonifolia Dill. gen. 3.*CAL. *Perianthium* pentaphyllum: *foliolis* ovatis, concavis, patentibus, magnitudine corollæ, margine membranaceis, persistentibus.COR. *Petala* quinque, ovata, patentia, vix calyce majora.STAM. *Filamenta* quinque, subulata, parva. *Antheræ* simplices.PIST. *Germen* ovatum, trigonum. *Stylus* nullus. *Stigmata* tria, obtusa.PER. nullum. *Calyx* connivens.

SEM. unicum, ovatum, triquetrum.

634. PHARNACEUM. *

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: *foliolis* subovatis, concavis, patentibus, æqualibus, persistentibus, intus coloratis, margine tenui.

COR. nulla; hinc *calycis* margo tenuis & calyx interne coloratus.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, longitudine calycis. *Antheræ* basi bifidæ.

PIST. *Germen* ovatum, trigonum. *Styli* tres, filiformes, longitudine staminum. *Stigmata* obtusa.

PER. *Capsula* ovata, obsolete trigona, tecta, trilocularis, trivalvis.

SEM. numerosa, nitida, orbiculata, depressa, margine acuto cincta.

635. XYLOPHYLLA. † *Phyllanthus Brown. jam. 188.*

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, coloratum: laciniis ovatis.

COR. nulla (*nisi calyx dicatur*).

STAM. *Filamenta* quinque, brevissima. *Antheræ* flore breviores.

PIST. *Germen* subrotundum. *Styli* tres, breves. *Stigmata* lacera.

PER. *Capsula* subrotunda, trilocularis.

SEM. bina.

OBS. *An sexus in his separatio? ipse flores non vidi.*

636. REICHELIA *Schreb. Sagona Aubl. 111.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum: laciniis lanceolatis, acutis.

COR. monopetala, campanulata, calyce brevior, quinquefida: laciniis, latis, acutis, patulis.

STAM. *Filamenta* quinque, setacea, corollæ basi inserta, eoque paulo longiora. *Antheræ* lineares, utrinque bifidæ, & recurvæ, incumbentes.

PIST. *Germen* ovatum, superum. *Styli* tres, setacei. *Stigmata* capitata.

PER. *Capsula* subtrigona, trilocularis, circumscissa.

SEM. plurima, minuta. Receptaculum globosum, maximum.

637. SALMASIA. *Schreb. Tachibota Aubl. 112.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum: laciniis oblongis, acutis, persistentibus.

COR. *Petala* quinque, oblonga, unguiculata, receptaculo inserta, longitudine calycis.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, longitudine corollæ, receptaculo inserta. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* trigonum, superum. *Stylus* nullus. *Stigmata* tria.

PER. *Capitula* trigona, trilocularis, trivalvis. *Dissepimenta* valvulis contraria.

SEM. plurima, minuta.

638. BASELLA. *

CAL. nullus.

COR. septemfida, urceolata: laciniis duabus exterioribus latioribus, una intra reliquas, superne connivens, basi carnosa.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, æqualia, corollæ adnata, eaque paulo breviora. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* subglobosum. *Styli* tres, filiformes, longitudine staminum. *Stigmata* oblonga, a latere altero apicem stylorum.

PER. *Corolla* persistens, clausa, carnosa, baccam mentiens.

SEM. unicum, subrotundum.

639. PISTACIA. * *Terebinthus Tournef.* 345.

* *Mas.*

CAL. *Amentum* laxum, sparsum, constans squamulis parvis, unifloris.

Perianthium proprium, quinquesidum, minimum.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quinque, minima. *Antheræ* ovata, tetragonæ, erectæ, patulæ, magnæ.

* *Femina.*

CAL. *Amentum* nullum.

Perianthium trifidum, minimum.

COR. nulla.

PIST. *Germen* ovatum, calyce majus. *Styli* tres, reflexi. *Stigmata* crassiuscula, hispida.

PER. *Drupa* sicca, ovata.

SEM. *Nux* ovata, glabra.

OBS. *Terebinthus T.* gaudet foliis pinnatis cum impari. *Lentiscus T.* gaudet foliis pinnatis absque impari.

IV. TETRAGYNIA.

640. PARNASSIA. * *Tournef.*

CAL. *Perianthium* quinquenpartitum : *laciniis* oblongis, acutis, patentibus, persistentibus.

COR. *Petala* quinque, subrotunda, emarginata, striata, concava, patentia.

Nectarta quinque : *singulum* squama cordata, concava, *stylis* 13 per marginem gradatim altioribus instructa, quibus singulis globus insidet.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, longitudine corollæ. *Antheræ* depressæ, incumbentes.

PIST. *Germen* ovatum, magnum. *Stylus* nullus, cujus loco foramen. *Stigmata* quatuor, obtusa, persistentia, in fructu majora.

PER. *Capsula* tetragono-ovata, unilocularis, quadrivalvis. *Receptaculum* quadruplex, valvulis adnatum.

SEM. plurima, oblonga.

OBS. *Essentialis* character e *Nectario* facillime colligitur.

641. EVOLVULUS. *

CAL. *Perianthium* pentaphyllum : *foliis* lanceolatis, acutis, persistentibus.

COR. monopetala, rotata, quinquefida.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, patentia, longitudine fere corollæ. *Antheræ* oblongiusculæ.

PIST. *Germen* subglobosum. *Styli* quatuor, capillares, divergentes, longitudine staminum. *Stigmata* simplicia

PER. *Capsula* subglobosa, quadrilocularis, quadrivalvis.

OBS. *Convolvuli Affinis.*

E. linifolius characterem præbuit.

642. SPINACIA. * *Tournef.* 308.

* *Mas.*

CAL. *Perianthium* quinquepartitum : *laciniis* concavis, oblongis, obtusis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, calyce longiora. *Antheræ* oblongæ, didymæ.

* *Femina.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, quadrifidum, acutum :
lacinis duabus oppositis minimis, persistens.

COR. nullum.

PIST. *Germen* rotundo-compressum. *Styli* quatuor, ca-
 pillares. *Stigmata* simplicia.

PER. nullum. *Calyx* coalescit, induratur.

SEM. unicum, subrotandum, tectum.

OBS. *Fructus* nunc rotundus, nunc bicornis, nunc quadricor-
 nis est.

V. PENTAGYNIA.

643. FEVILLEA. † Nhandiroba Plum. 27.

* *Mas.*

CAL. *Perianthium* campanulatum, monophyllum, semi-
 quinquefidum, inferne rotundatum, superne patens.

COR. monopetala, rotata. *Limbo* semiquinquefido : *la-*
ciniis convexis, rotundatis; umbilico clauso, *stellula*
 duplici, motum solis respiciente, radiisque alternis
 longioribus.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata. *Antherae* didymæ,
 subrotundæ.

Nectarium filamentis quinque, compressis, incurvis,
 staminibus alternantibus.

* *Femina.*

CAL. *Perianthium* ut in masculo flore, sed basi germine
 fœtum.

COR. ut in masculo flore : umbilici *stella* ex quinque
 lamellis cordatis instructa.

PIST. *Germen* inferum. *Styli* quinque, filiformes. *Str-*
igmata cordata.

PER. *Bacca* maxima, cornosa, cortice duro, ovata,
 obtusa, trilocularis, calyce cincta.

SEM. compressa, orbicularia.

644. ARALIA. * Tournef. 154.

CAL. *Involucrum* minimum umbellulæ globosæ.

Perianthium quinquedentatum, minimum, superum.

COR. *Petala* quinque, ovata, acuta, sessilia, reflexa.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, longitudine co-
 rollæ. *Antherae* subrotundæ.

PIST. *Germen* subrotundum, inferum, *Styli* quinque, brevissimi, persistentes. *Stigmata* simplicia.

PER. *Bacca* subrotunda, striata, coronata, quinquelocularis.

SEM. solitaria, dura, oblonga.

645. GLOSSOPETALUM Schreb. Goupia Aubl. 116.

CAL. *Perianthium* monophyllum, minimum, quinque-dentatum, persistens.

COR. *Petala* quinque, lanceolata, patentia, acuta; singulo petalo apice adnexa est *ligula* lineari-lanceolata, truncata, fere longitudine petali, eidemque incumbens.

STAM. *Filamenta* quinque, brevissima. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* subrotundum, cinctum *glandula*, petala, & stamina proferente *Stylus* nullus. *Stigmata* quinque, acuta

PER. *Bacca* subrotunda, quinquefulcata, unilocularis.

SEM. quinque, angulata.

646. CRASSULA. * Dill. elth. 96.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: *foliis* lanceolatis, canaliculato-concavis, erectis, acutis, conniventibus in tubum, persistentibus.

COR. *Petala* quinque, *unguibus* longis, linearibus, rectis, conniventibus, basi connexis bracteis limbi ovatis, reflexo-patentibus.

Nectaria quinque: *singulum* squamula minima, emarginata, basi germinis extrorsum annexa.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, longitudine tubi, *unguibus* corollæ inserta. *Antheræ* simplices.

PIST. *Germina* quinque, oblonga, acuminata, definentia in *Stylos* subulatos, longitudine staminum. *Stigmata* obtusa.

PER. *Capsulæ* quinque, oblongæ, acuminatæ, rectæ, compressæ, longitudinaliter introrsum dehiscentes.

SEM. plura, parva.

Obs. *Sedo affinis, sed diversa numero staminum.*

647. GISECKIA. * Koelreutera. *Murray. Comment. nou. Goett. tom. 3. t. 2. f. 1.*

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: *foliis* ovatis, concavis, obtusis, margine scariosis, persistentibus.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, basi ovata, brevissima. *Anthera* subrotunda.

PIST. *Germen* superum, subrotundum, retusum, quinquepartitum. *Styli* quinque, breves, recurvati. *Stigmata* obtusa.

PER. *Capsula* quinque, subrotunda, compressiuscula, scabra, obtusa, approximata.

SEM. solitaria, ovata, glabra.

648. LINUM. * *Tournef. 176. Radiola Dill. gen. 7. Chamælinum. Vaill. B. P. 4. f. 6. Linocarpon Mich. 21.*

CAL. *Perianthium* pentaphyllum, lanceolatum, erectum, parvum, persistens.

COR. infundibuliformis. *Petala* quinque, oblonga, superne sensim latiora, obtusa, patentiora, magna.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, erecta, longitudine calycis. (rudimenta insuper 5 alternantia). *Anthera* simplices, sagittata.

PIST. *Germen* ovatum. *Styli* quinque, filiformes, erecti, longitudine staminum. *Stigmata* simplicia, reflexa.

PER. *Capsula* globosa, rude pentagona, decemlocularis, quinquevalvis.

SEM. solitaria, ovato-planiuscula, acuminata, glabra.

Obs. Radiolæ unica quinta pars numeri eximitur.

649. ALDROVANDA. † *Mont. A. Bonon.*

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, erectum, æquale, persistens.

COR. *Petala* quinque, oblonga, acuminata, longitudine calycis, persistentia.

STAM. *Filamenta* quinque, longitudine floris. *Anthera* simplices.

PIST. *Germen* globosum. *Styli* quinque, brevissimi. *Stigmata* obtusa.

PER. *Capsula* globosa, obsolete pentagona, quinquevalvis - unilocularis.

SEM. decem, oblongiuscula, interno pericarpium parieti affixa.

650. DROSER A. * *Ros Solis Tournef.* 127.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquefidum, acutum, erectum, persistens.

COR. infundibuliformis. *Petala* quinque, subovata, obtusa, calyce paulo majora.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, longitudine calycis. *Antheræ* parvæ.

PIST. *Germen* subrotundum. *Styli* quinque, simplices, longitudine staminum. *Stigmata* simplicia.

PER. *Capsula* subovata, unilocularis, apice quinquevalvis.

SEM. plurima, minima, subovata.

OBS. D. lusitanicæ decem stamina sunt.

651. COMMERSONIA. *Suppl. p. 26. Forst.*
charact. gen. n. 22.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum, corolliferum. *Laciniae* ovatae, acutæ.

COR. pentapetala. *Petala* linearia, basi utrinque lobo inflexo dilatata, patentia.

Nectarium quinquepartitum, intra stamina. *Laciniae* lanceolatae, erectae, petalis breviores. *Corpuscula* filiformia, quinque, villosa, ex divisuris nectararii emissa.

STAM. *Filamenta* quinque, brevissima ad bases petalorum. *Antheræ* subrotundae, didymae.

PIST. *Germen* globosum, villosum: *terculis* quinque. *Styli* quinque, filiformes, approximati, breves. *Stigmata* globosa.

PER. *Capsula* globosa, quinquelocularis, echinata: *setis* longis pilosis. *Laculamenta* disperma.

SEM. ovata.

652. SIBBALDIA. * *Fl. Lapp.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, semi-decemfidum, ba-

si erecta: laciniis semilanceolatis, æqualibus, patentibus, alternis angustioribus, persistentibus.

COR. Petala quinque, ovata, calyci inserta.

STAM. Filamenta quinque, capillaria, corolla breviora, calyci inserta. Antheræ parvæ, obtusæ.

PIST. Germina quinque, ovata, brevissima. Styli e medio latere germinum, longitudine staminum. Stigmata capitata.

PER. nullum. Calyx connivens, in sinu semina condens.

SEM. quinque, oblongiuscula.

OBS. Pistillus valde raro duplicatis luxuriat in una eademque cum quinis planta.

653. STATICE. * Tournef. 177. Limonium Tournef. 177.

CAL. Perianthium commune diversæ in diversis structuræ.

Perianthium proprium monophyllum, infundibuliforme:

Tube angustato: Limbo integro, plicato, scarioso.

COR. infundibuliformis. Petala quinque, inferne angustata, superne latiora, obtusa, patentia.

STAM. Filamenta quinque, subulata, corolla breviora, unguibus corollæ inserta. Antheræ incumbentes.

PIST. Germen minutissimum. Styli quinque, filiformes, distantes. Stigmata acuta.

PER. nullum. Calyx proprius collo coarctatus, limbo expansus, semen fovens.

SEM. unicum, minimum, subrotundum, calyce proprio coronatum.

OBS. Statice auctorum calyce communi triplici; florẽm subrotundum componit.

Limonium auctorum calyce communi imbricato flosculos serie oblonga exhibet.

S. monopetala genere distingui non debet, cum in pentapetalis filamenta staminum ipsis unguibus petalorum inserta sunt.

654. ACNIDA. † Acnide Mitch.

* Mas.

CAL. Perianthium pentaphyllum: foliolis ovatis, concavis, acutis, margine membranaceis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, brevissima. *Anthera* versatiles, biloculares, utrinque furcatae.

* *Femina* in distincta planta.

CAL. *Involucrum* polyphyllum, lineare, deciduum.

Perianthium diphyllum, lineare, minimum, persistens.

COR. nulla.

PIST. *Germen* ovatum. *Styli* quinque, longi, reflexi, pubescentes. *Stigmata* simplicia.

PER. *Fructus* ovatus, compressus, multangulatus, sulcatus, tectus calyce succulento.

SEM. solitarium, rotundum, compressum.

655. ANTIDESMA. † *Burm.*

* *Mas.*

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: *foliis* oblongiusculis, concavis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, calyce longiora, æqualia. *Anthera* subrotundæ, semibifidæ.

* *Femina* in distincto individuo.

CAL ut in *Mare*, persistens.

COR. nulla.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* nullus. *Stigmata* quinque, obtusa.

PER. *Bacca* cylindrica, unilocularis, stigmatibus coronata.

SEM. unum.

656. ZANTHOXYLUM. † *Colden. Fagara.* *du Hamel.*

* *Mas.*

CAL. *Perianthium* quinquepartitum: *foliis* ovalibus, erectis, coloratis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* sæpius quinque, sabulata, erecta, calyce longiora. *Anthera* didymæ, subrotundæ, sulcata.

* *Femina.*

CAL. ut in mare.

COR. nulla.

PIST. *Germen* subrotundum, desinens in *Stylum* subulatum, calyce longiorem. *Stigma* obtusum.PER. *Capsula* oblonga, unilocularis, bivalvis.

SEM. unicum, subrotundum, glabrum.

OBS. *Pistillum* & *Fructum* a *Dubamelio* mutuatus sum, at *pistilla* 4-6, *basi* pedicello munita commemorat *Colden*.CAL. 5-fidus, coloratus, minimus. *Petala* 5, ovata. *Stamina* 5, longitudine *petalorum*.PIST. *Germen* didymum, subrotundum. *Styli* 2, minimi.*Stigmata* acuta. *Gron. virg.* 47. *Determinent Autoptæ.**In Syst. Veg.* p. 884. *Pistilla* quinque & *Capsulæ* 5, *monospermæ* nunc generi adscribuntur. *Browneus* etiam aliter *characterem* depingit.

VI. POLYGYNIA.

657. MYOSURUS. *Myosuros* Dill. gen. 4.CAL. *Perianthium* pentaphyllum: *foliis* semilanceolatis, obtusis, reflexis, supra *basin* annexis, coloratis, deciduis.COR. *Petala* quinque, calyce breviora, minutissima, *basi* tubulata, oblique introrsum aperta.STAM. *Filamenta* quinque, (vel plura) longitudine calycis. *Antheræ* oblongæ, erectæ.PIST. *Germina* numerosa, receptaculo in formam conico-oblongam insidentia. *Styli* nulli. *Stigmata* simplicia.PER. nullum. *Receptaculum* longissimum, styliforme, *feminibus* imbricatim dispositis tectum.

SEM. numerosa, oblonga, acuminata.

OBS. Numerus *staminum* in hocce genere valde variat.*Myosuri summa est affinitas cum Ranunculo.*OBS. *Petala* nunc pro *Nectariis* sumit eaque lingulata, *petaliformia* definit *Autor.* vid. *Syst. Veg.* p. 308.658. SCHEFFLERA. *Forst. charact. gen.* 23.CAL. *Perianthium* minimum, quinquedentatum, *germen* umbilicans, persistens: *laciniis* subulatis.

COR. *Petala* quinque, parva, inter calycis dentes, decidua, acuta.

STAM. *Filamenta* quinque, filiformia, patentia, petalis vix longiora. *Anthera* subrotundæ.

PIST. *Germen* globoso depressum. *Styli* octo seu decem, teretes, breves, persistentes. *Stigmata* simplicia.

PER. *Capsula* globoso-depressa, infera, octo-seu decemlocularis.

SEM. solitaria, semicircularia, compressa.

Classis VI.

HEXANDRIA.

I. MONOGYNIA.

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 659. <i>Bastris.</i> | 687. <i>Narcissus.</i> |
| 660. <i>Musa.</i> | 688. <i>Amaryllis.</i> |
| 661. <i>Chamaerops.</i> | 689. <i>Crinum.</i> |
| 662. <i>Corypha.</i> | 690. <i>Agapanthus.</i> |
| 663. <i>Licuala.</i> | 691. <i>Pontederia.</i> |
| 664. <i>Bromelia.</i> | 692. <i>Bulbocodium.</i> |
| 665. <i>Tillandsia.</i> | 693. <i>Tulbagia.</i> |
| 666. <i>Hepetis.</i> | 694. <i>Allium.</i> |
| 667. <i>Burmannia.</i> | 695. <i>Aphyllanthes.</i> |
| 668. <i>Tradescantia.</i> | 696. <i>Hypoxis.</i> |
| 669. <i>Mnasiaum.</i> | 697. <i>Alstroemeria.</i> |
| 670. <i>Bursera.</i> | 698. <i>Gethyllis.</i> |
| 671. <i>Gleditschia.</i> | 699. <i>Hemerocallis.</i> |
| 672. <i>Frankenia.</i> | 700. <i>Agave.</i> |
| 673. <i>Loranthus.</i> | 701. <i>Aloe.</i> |
| 674. <i>Hillia.</i> | 702. <i>Aletris.</i> |
| 675. <i>Richardia.</i> | 703. <i>Polianthes.</i> |
| 676. <i>Berberis.</i> | 704. <i>Capura.</i> |
| 677. <i>Leontice.</i> | 705. <i>Convallaria.</i> |
| 678. <i>Pometia.</i> | 706. <i>Hyacinthus.</i> |
| 679. <i>Prinos.</i> | 707. <i>Lachenalia.</i> |
| 680. <i>Tetsona.</i> | 708. <i>Lanaria.</i> |
| 681. <i>Duroia.</i> | 709. <i>Phormium.</i> |
| 682. <i>Nandina.</i> | 710. <i>Asphodelus.</i> |
| 683. <i>Achras.</i> | 711. <i>Anthericum.</i> |
| 684. <i>Haemanthus.</i> | 712. <i>Ornithogalum.</i> |
| 685. <i>Leucojum.</i> | 713. <i>Scilla.</i> |
| 686. <i>Galanthus.</i> | 714. <i>Cyanella.</i> |

715. *Dracaena*.
 716. *Polliā*.
 717. *Asparagus*.
 718. *Gloriosa*.
 719. *Erythronium*.
 720. *Uvularia*.
 721. *Fritillaria*.
 722. *Lilium*.
 723. *Tulipa*.
 724. *Tucca*.
 725. *Albuca*.

726. *Lindera*.
 727. *Massōnia*.
 728. *Orontium*.
 729. *Thrinax*.
 730. *Acorus*.
 731. *Calamus*.
 731. *Ehrharta*.
 733. *Pharus*.
 734. *Juncus*.
 735. *Tamus*.
 736. *Peplis*.

II. DIGYNIA.

737. *Falckia*.
 738. *Atraphaxis*.
 739. *Gahnia*.
 740. *Oryza*.

741. *Zizania*.
 742. *Bambos*.
 743. *Nestris*.

III. TRIGYNIA.

744. *Borassus*.
 745. *Elaeis*.
 746. *Cocos*.
 747. *Colchicum*.
 748. *Melanthium*.
 749. *Veratrum*.
 750. *Medeola*.
 751. *Helonias*.
 752. *Trillium*.

753. *Triglochin*.
 754. *Rumex*.
 755. *Scheuchzeria*.
 756. *Dioscorea*.
 757. *Smilax*.
 758. *Wurmbea*.
 759. *Rajania*.
 760. *Flagellaria*.

IV. TETRAGYNIA.

761. *Petiveria*.

V. POLYGYNIA.

762. *Aristolochia*.
 763. *Alisma*.

764. *Mauritia*.

HEXANDRIA.

I. MONOGYNIA.

659. BACTRIS. Jacq. amer. p. 279.

* *Masculi flores.*

CAL. *Spatha* universalis, monophylla, ovato-acuminata, concava, magna, patens, dorso aculeata, univalvis persistens. *Spadix* ramosus, longitudine *Spathæ*. *Perianthium* monophyllum, profunde-tripartitum, corollæ concolor: *laciniis* lanceolatis, acuminatis, concavis, patulis, longitudine fere tubi corollæ.

COR. monopetala, obovata, triquetra: *laciniis* semi-ovatis, planis, acutis, erectis, tubo paulo longioribus.

STAM. *Filamenta* sex, subulata, erecta, longitudine fere corollæ, cujus in media parte tubi orta. *Anthere* oblongæ, incumbentes.

* *Feminei flores* pauci in eodem spadice maribus intermixti.

CAL. *Spatha* eadem cum maribus.

Perianthium monophyllum, campanulatum, minimum, corollæ concolor, margine tridentato, persistens: *denticulis* acuminatis, minimis, remotis

COR. monopetala, ovata, erecta, longitudine germinis, idemque strictè amplexens, apice tridentato, persistens.

PIST. *Germen* ovatum, magnum. *Stylus* brevissimus. *Stigma* capitato-obtusum, obsolete trifidum.

PER. *Drupa* subrotunda, depressiuscula, succulenta, fibrosa, stylo acuminata: cortice coriaceo.

SEM. *Nux* subrotunda, utrinque depressa, notata tribus foraminibus lateralibus obsoletis, quorum duo magis approximata tertio opposita. *Nucleus* ejusdem figuræ, cartilagineus, solidus, in locis, quæ foraminibus nucis correspondent, excavatus tribus foveis.

660. MUSA. * *Mus. cliff.* 2. *Plum.* 34. *Garc.*
A. A. 415. t. 2.

* *Hermaphroditi Feminei flores* plures versus basin *Spadicis* simplicis, *Spathis* alternis distincti.

CAL. *Spatha* partialis ovato-oblonga, plano-concava, magna, multiflora.

COR. inæqualis, ringens; petalo constituyente labium superius, nectario vero labium inferius.

Petalum erectum, ligulatum, truncatum, quinquedentatum, basi antice connivens.

Nectarium monophyllum, cordatum, naviculare, compressum, acuminatum, extrorsum patens, petalo brevius, intra sinum petali insertum.

STAM. *Filamenta* sex, subulata, quorum quinque intra petalum, erecta, petalo dimidio breviora: sextum vero intra nectarium, patens, reliquis duplo longius. *Anthera* in filamento sexto linearis, a medio ad apicem filamento adnata; reliquis nullæ sunt *Antheræ*.

PIST. *Germen* infra receptaculum floris, omnium maximum, obtuse triquetrum, longissimum. *Stylus* cylindraceus, erectus, longitudine petali. *Stigma* capitatum, subrotundum, obsolete sexfidum.

PER. *Bacca* carnosa, corio testæ, longissima, obsolete triquetra, pulpa trifariam, absque dissipatione, divisa, ad utrumque apicem contracta, hinc gibba.

SEM. - - -

* *Hermaphroditis Masculi flores* in eodem *Spadice*, supra femineos flores, *Spathis* alternis plurimis multifloris distincti.

CAL. *Spatha* ut in femineo.

COR. *Petalum* ut in femineo.

Nectarium ut in femineo.

STAM. *Filamenta* ut in femineo: at omnia æqualia, erecta. *Antheræ* uti in femineo, at solum in quinque istis intra petalum positæ filamentis: in sexto rariæ ulla.

PIST. *Germen* ut in femineo, at minus. *Stylus* & *Stigma* ut in femineo, at minora, obsoletiora.

PER. abortit.

SEM.

OBS. M. *Troglodytarum fructus polyspermus est.*

661. CHAMÆEROPS. * *Mus. Cliff.* 10. *Chamæripes Pont.* 10.* *Hermaphroditus.*CAL. *Spatha* universalis, compressa, bifida. *Spadix* ramosus.*Perianthium* proprium tripartitum, minimum.COR. tripartita. *Petala* ovata, coriacea, erecta, acuta, apice inflexa.STAM. *Filamenta* sex: subulato compressa, basi parum cohærentia. *Anthera* lineares, didymæ, adnatæ interiori parieti filamentorum.PIST. *Germina* tria, subrotunda. *Styli* totidem distincti, persistentes. *Stigmata* acuta.PER. *Drupa* tres, globosæ, uniloculares.

SEM. solitaria, globosa.

* *Mas* in distincta planta, eodem modo florens.CAL. *Spatha* ut in hermaphrodito.*Perianthium* ut in hermaphrodito.

COR. ut in hermaphrodito.

STAM. *Receptaculum* gibbum, desinens in *Filamenta* sex non perforato - distincta.*Cætera* ut in hermaphrodito.662. CORYPHA. *Mus. Cliff.* 11. *Codda panna II. M. II.* 12.CAL. *Spatha* universalis composita. *Spadix* ramosus.COR. tripartita. *Petala* ovata, obtusa, patentia.STAM. *Filamenta* sex, subulata, corolla longiora. *Anthera* adnatæ.PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* subulatus, brevis. *Stigma* simplex.PER. *Bacca* globosa, magna, unilocularis.

SEM. unicum, osseum, magnum, globosum.

OBS. Browne *Corypham* suam aliter desinit; an itaque distincti generis?CAL. *Spadix* simpliciter ramosus, imbricatus spathis propriis.*Perianthium* nullum.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* sex, breviora, germinis lateribus innata. *Anthera* oblonga.

PIST. *Germen* globosum, parvum. *Stylus* simplex, brevis. *Stigma* capitatum, subinfundibuliforme.

PER. *Drupa* unilocularis.

SEM. *Nux* Arillo osseo.

663. **LICUALA.** *Thunb. in Act. Stockholm.*
1782. p. 284. *Diff. nov. gen. plant.* p. 70.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tripartitum, extus pilosum.

COR. ad basin fere tripartita: *Lacinia* ovata, acuta, concava.

Nectarium fertiforme, truncatum, corolla duplo brevius.

STAM. *Filamenta* sex, nectario inserta, erecta, brevissima, alba. *Anthera* oblonga, didyma, flavæ.

PIST. *Germen* superum, convexum, sulcatum, tripartitum, glabrum. *Stylus* unicus, simplex. *Stigmata* duo.

PER. *Drupa* globosa, vel parum oblonga, unilocularis, magnitudine pisi. *Nux* dura.

664. **BROMELIA.** * *Plum.* 8. *Pinguin.* *Dill. elt.*
240. *Ananas Tournef.* 426. 427. 428.
Karatas Plum. 33.

CAL. *Perianthium* trigonum, parvum, superum, persistens: *laciniis* tribus, ovatis.

COR. *Petala* tria, angusto-lanceolata, erecta, calyce longiora. *Nectarium* supra basin singulo petalo adnatum, connivens.

STAM. *Filamenta* sex, subulata, corolla breviora, receptaculo inserta. *Anthera* erecta, sagittata.

PIST. *Germen* inferum. *Stylus* simplex, filiformis, longitudine staminum. *Stigma* obtusum, trifidum.

PER. *Bacca* subrotunda, umbilicata, trilocularis.

SEM. numerosa, incumbentia, oblongiuscula, obtusa.

B. Pinguin *baccam unilocularem, seminaque pauca habere.*
Jacq. amer. p. 91.

665. **TILLANDSIA.** † *Caraguata Plum.* 33.
Renealmia Plum. 38.

CAL. *Perianthium* monophyllum, trifidum, oblongum,

erectum, persistens: *laciniis* oblongo-lanceolatis, acuminatis.

COR. tubulata, monopetala. *Tubus* longus, ventricosus. *Limbus* trifidus, obtusus, erectus, parvus.

STAM. *Filamenta* sex, longitudine tubi corollæ. *Antheræ* acutæ, in collo corollæ, incumbentes.

PIST. *Germen* oblongum, utrinque acuminatum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* trifidum, obtusum.

PER. *Capſula* longa, obtuse trigona, acuminata, subunilocularis, trivalvis.

SEM. plura, pappo capillari longissimo affixa.

Caraguata Pl. corolla trifida, 1, 2, 3, 8.

Renealmia Pl. corolla tripartita 4, 5, 6, 7.

666. HEPETIS. Swartz prodr.

CAL. 3 - partitus.

COR. 3 - petala.

Capſula semisupera, 3 - locularis.

SEM. mutica,

667. BURMANNIA. †

CAL. *Prianthium* longum, monophyllum, prismaticum, coloratum, angulis membranaceis tribus longitudinalibus: ore trifido parvo.

COR. *Petala* tria, ovata, oblonga, minima, in ore calycis posita, minutissima.

STAM. *Filamenta* sex, brevissima. *Antheræ* in ore calycis, brevissimæ, binæ ubique simul, mucrone reflexo distinctæ.

PIST. *Germen* cylindraceum, calyce dimidio brevius. *Stylus* filiformis, longitudine corollæ. *Stigmata* tria, obtusa, concava.

PER. *Capſula* calyce obteſta, cylindraceo-trigona, trilocularis, trivalvis, angulis dehiscens.

SEM. numerosa, minima.

668. TRADESCANTIA. *Ephemerum Tournef. 193.

CAL. *Prianthium* triphyllum: *foliis* ovatis, concavis, patentibus, persistentibus.

COR. *Petala* tria, orbiculata, plana, patentissima, magna, aequalia.

STAM. *Filamenta* sex, filiformia, longitudine calycis, erecta, villosa: villis articulatis. *Antheræ* reniformes.

PIST. *Germen* ovatum, obtuse trigonum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* trigonum, tubulosum.

PER. *Capsula* ovata, calyce tecta, trilocularis, trivalvis.

SEM. pauca, angulosa.

OBS. *Figura styli variat.*

669. MNASIUM Schreb. Rapatea Aubl. 118.

CAL. *Spatha* bivalvis: valvulis ovatis; foliolo lineari, patulo terminatis.

Perianthium monophyllum, tripartitum: *laciniis* lanceolatis, concavis, acutis, marginatis.

COR. monopetala. *Tubus* brevissimus, *Limbus* tripartitus: *laciniis* lanceolatis, concavis, acutis.

STAM. *Filamenta* sex, brevissima, tubo inserta. *Antheræ* longæ, tetragonæ, folio ovato, excavato, acuto terminatæ.

PIST. *Germen* trilobum. *Stylus* longus, striatus. *Stigmata* tria, in spiram convoluta,

PER. . . .

SEM. . . .

670. BURSERA. Jacq. amer. 94.

CAL. *Perianthium* triphyllum: *foliolis* subrotundis, concavis, patulis, parvis, deciduis.

COR. *Petala* tria, ovata, plana, acuminata, patentissima.

STAM. *Filamenta* sex, subulata, erecta, longitudine calycis. *Antheræ* oblongæ, erectæ.

PIST. *Germen* ovatum, longitudine staminum. *Stylus* brevissimus. *Stigma* capitatum.

PER. *Capsula* ovata, obsolete triangularis, unilocularis, trivalvis: valvulis carnosis, succulentis.

SEM. unicum, baccatum, compressum, subcordatum.

OBS. *Variare calyce quinquesido, petalis quinque, staminibus octo, stigmate trifido & polygamam fore?* Syst. Veget. pag. 342.

671. GLEDITSCHIA. Clayton. Melilobus
Mitch. XV.

* *Mas* Amentum longum, compactum, cylindricum.
CAL. Perianthium proprium triphyllum: foliolis patulis,
parvis, acutis.

Co Petala tria, subrotunda, sessilia, patula, calyci-
formia.

Nectarium turbinatum, cujus oræ fructificationis re-
liquæ partes accretæ.

STAM. Filamenta sex, filiformia, corolla longiora. An-
theræ incumbentes, oblongæ, compressæ, didymæ.

* *Hermaphroditus* in eodem amento cum masculis flo-
ribus, plerumque terminalis.

CAL. Perianthium quadrifidum, ut in masculis.

COR. Petala quatuor, ut in masculis.

Nectarium ut in masculis.

STAM. ut in masculis.

PIST. ut in femina.

PER. ut in femina.

SEM. ut in femina.

* *Femina* Amentum laxum, in diversa planta.

CAL. Perianthium proprium ut in mare, sed pentaphyl-
lum.

COR. Petala quinque, longa, acuta, erecto-patentia.
Nectarium duo, brevia, instar filamentorum.

PIST. Germen latum, compressum, corolla longius. Sty-
lus brevis, reflexus. Stigma crassum, longitudine
styli, cui adnatum, superius pubescens.

PER. Legumen maximum, latum, compressissimum, dif-
sepimentis plurimis transversis: isthmis pulpa reple-
tis.

SEM. solitaria, subrotunda, dura nitida.

672. FRANKENIA. * Franca. Mich. 22.

CAL. Perianthium monophyllum, subcylindricum, deca-
gonum, persistens: ore quinquedentato, acuto, pa-
tulo.

COR. Petala quinque: ungues longitudine calycis. Lim-
bus planus: lamina subrotundis, patentibus.

Nectarium ungue canaliculato, unguibus singulis
petalorum inserto.

STAM. *Filamenta* sex, longitudine calycis. *Anthera* subrotundæ, didymæ.

PIST. *Germen* oblongum, superum. *Stylus* simplex, longitudine staminum. *Stigmata* tria, oblonga, erecta, obtusa.

PER. *Capsula* ovalis, unilocularis, trivalvis.

SEM. plurima, ovata, minima.

OBS. *Stigma* sexpartitum esse. *Syst. Veg.* p. 344.

673. LORANTHUS. † *Vaill. act.* 1720. *Jacq. amer.* 97.

CAL. *Perianthium* *Fructus* inferum: margo integer concavus. *Perianth. floris* superum f, margo integer concavus.

COR. *Petala* sex, oblonga, revoluta, æqualia.

STAM. *Filamenta* sex, subulata, adnata basibus petalorum, longitudine corollæ. *Anthera* oblongæ.

PIST. *Germen* oblongum inter utrumque calycem, f. inferum. *Stylus* simplex, longitudine staminum. *Stigma* obtusum.

PER. *Bacca* oblonga, unilocularis.

SEM. oblongum.

OBS. *L. europæus* floribus dioicis; *L. pentandrus* floribus pentandris quinquesidis & *L. tetrapetalus* floribus tetrapetalis ab hoc charactere differunt. Aliis denique flores æquales, aliis inæquales aut irregulares.

674. HILLIA. *Jacq. amer.* 96.

CAL. *Perianthium* hexaphyllum, superum: foliolis oblongis, acutis, erectis.

COR. monopetala. *Tubus* cylindricus, sexsulcatus, longissimus. *Limbus* sexfidus: laciniis oblongis, planis.

STAM. *Filamenta* sex, brevissima. *Anthera* oblongæ, erectæ, intra faucem corollæ.

PIST. *Germen* inferum, oblongum, obsolete hexagonum. *Stylus* filiformis, longitudine tubi. *Stigma* capitatum.

PER. oblongum, compressum, biloculare.

SEM. numerosa, minima.

675. RICHARDIA. † Houst. A. A.

CAL. *Perianthium* monophyllum, sexpartitum, erectum, acuminatum, corolla dimidio brevius.

COR. monopetala, cylindraceo-infundibuliformis. *Limbus* sexfidus, acutus, erectus.

STAM. *Filamenta* sex, brevissima. *Anthera* subrotunda, parva, ad incisuras corollæ.

PIST. *Germen* inferum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum, superne tripartitus. *Stigmata* obtusa.

PER. nullum.

SEM. tria, hinc rotunda, inde angulata, superne latiora, gibba.

OBS. *Ordine naturali Stellatis associanda.*

676. BERBERIS. * *Tournef.* 385.

CAL. *Perianthium* hexaphyllum, patulum: *foliis* ovatis, basi angustiore, concavis, alternis minoribus, coloratis, deciduis.

COR. *Petala* sex, subrotunda, concava, erecto-patentia, calyce vix majora.

Nectarium corpuscula duo, subrotunda, colorata, basi singuli petali adnata.

STAM. *Filamenta* sex, erecta, compressa, obtusa. *Anthera* duæ, filamentorum apici utrinque adnata.

PIST. *Germen* cylindraceum, longitudine staminum. *Stylus* nullus. *Stigma* orbiculatum, germine latius, margine acuto cinctum.

PER. *Bacca* cylindracea, obtusa, puncto umbilicata, unilocularis.

SEM. duo, oblonga, cylindracea, obtusa.

OBS. B. cretica tria semina habet.

677. LEONTICE. † *Leontopetalon, Tournef.* 484.

CAL. *Perianthium* hexaphyllum, caducum: *foliis* linearibus, patentibus: alternis minoribus.

COR. *Petala* sex, ovata, acuta, calyce duplo longiora. *Nectarium* squamis sex, semiovatis, patentibus, pedicellatis, petalorum unguibus insertis, æqualibus.

STAM. *Filamenta* sex, filiformia, brevissima. *Anthera* erecta, biloculares, bivalves, basi dehiscetes.

PIST. *Germen* oblongo - ovatum. *Stylus* brevis, teretiusculus, oblique germini infertus. *Stigma* simplex.
PER. *Bacca* cava, globoso - acuminata, inflata, unilocularis, subsucculenta.
SEM. pauca, globosa.

678. POMETIA. *Forst. charact. gen.* 55.

* *Flores Masculi.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, sexfidum, brevissimum, rotatum, laciniis rotundatis.

COR. *Petala* sex, orbiculata, erecta, calyce paullo longiora.

Nectarium, seu receptaculum elevatum, torulis sex notatum.

STAM. *Filamenta* sex, subulata, erecta, corolla triplo longiora, in margine nectarii. *Antheræ* parabolicæ, basi bifidæ.

PIST. Rudimentum in centro floris.

* *Flores Feminei* in eodem racemo cum Masculis.

CAL. }
COR. } ut in Masc.

PIST. *Germen* obcordato didymum. *Stylus* filiformis, corolla quadruplo longior. *Stigma* simplex, compressum

PER. *Bacca* globosa, carnosa, monosperma, supera.

SEM. unicum, ovatum in centro baccae.

OBS. Rudimenta staminum interdum in floribus femineis observantur. Germinis alterum loculamentum in fructu maturo omnino deficit, nec ejus ullum vestigium reperitur.

679. PRINOS. †

CAL. *Perianthium* monophyllum, semisexfidum, planum, minimum, persistens.

COR. monopetala, rotata. *Tubus* nullus. *Limbus* sexpartitus, planus: laciniis ovatis.

STAM. *Filamenta* sex, subulata, erecta, corolla breviora. *Antheræ* oblongæ, obtusæ.

PIST. *Germen* ovatum, desinens in *Stylum* staminibus breviora, *Stigmate* obtuso.

PER. *Bacca* subrotunda, sexlocularis, calyce longe major,

300 HEXANDRIA MONOGYNIA.

SEM. solitaria, ossea, obtusa, hinc convexa, inde angulata.
OBS. Numero præsertim ab *Ilice* differt.

Interdum unicam sextam partem numeri excludit.

680. TECTONA. *Thunb. diff. nov. gen. p. 71. Linn. suppl. p. 20.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, sexpartitum, persistens, extus tomentosum, intus glabrum: *lacinia* ovata, erecto-patula.

COR. monopetala, rotata, sexpartita: *lacinia* ovata, patula, extus tomentosa, intus glabra, longitudine laciniarum calycis.

STAM. *Filamenta* sex, ori tubi corollæ inserta, brevissima. *Anthera* rotunda, didyma, subexserta, altero latere brunnea, altero flavæ.

PIST. *Germen* superum, ovatum, cinereo-villosum, calyce tectum. *Stylus* filiformis, erectus, calyce paullo longior. *Stigmata* duo, revoluta, obtusa.

PER. *Drupa* ovata, calyce tecta, cinereo-villosa, quadrivalvis, quadrilocularis, magnitudine *Avellanæ*.

SEM. minuta.

681. DUROIA. *Suppl. p. 30.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, cylindricum, truncatum, arctum, brevissimum, superum.

COR. monopetala. *Tubus* cylindricus. *Limbus* longitudine tubi, sexpartitus. *Lacinia* ovata, patentes.

STAM. *Filamenta* nulla. *Anthera* sex intra tubum, oblonga.

PIST. *Germen* inferum. *Stylus* filiformis, longitudine tubi. *Stigmata* duo.

PER. *Pomum* globosum, umbilicatum, pilosissimum. *Pili* erecti.

SEM. plurima, nidulantia, ovalia, plana, glaberrima, duplici serie incumbentia.

OBS. *Abortiunt sæpe flores; etiam flores sunt mere masculi, qui carent germine.*

682. NANDINA. *Thunb. diff. nov. gen. p. 14. Flor. jap. p. 9.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, sexfariam imbricatum: squamis circiter sex singula serie, ovatis, acutis, glabris, albo incarnatis, caducis.

COR. hexapetala, alba, membranacea, caduca. *Petala* oblonga, concava, acuta, calyce longiora, sesquilineam longa.

STAM. *Filamenta* sex, brevissima. *Antheræ* oblongæ, erectæ, flavæ linea atra, longitudine corollæ.

PIST. *Germen* superum, ovatum, bruneum, glabrum. *Stylus* trigonus, brevissimus. *Stigma* trigonum.

PER. *Bacca* exsucca, globosa, glabra, extus rubra, intus alba, disperma, magnitudine pisi.

SEM. hemisphærica, glabra.

RECEPT. globosum album, glabrum, impresso-punctatum.

683. ACHRAS. † *Læfing. Jacq. amer. 56.*
Brown. Sapota. Plum. 4. †.

CAL. *Pervianthium* hexaphyllum: *foliolis* ovatis, concavis, erectis: exterioribus latioribus, brevioribus; interioribus coloratis.

COR. monopetala, ovata: altitudine calycis. *Limbus* sexfidus: *laciniis* subovatis, planis.

Squamæ ad faucem corollæ, *laciniis* ejusdem æquales, angustiores, patulæ, emarginatæ.

STAM. *Filamenta* sex, brevissima, subulata, ad fauces corollæ, ejusdem cum *laciniis* alternantia, inflexa. *Antheræ* acutæ.

PIST. *Germen* subrotundum, depressum. *Stylus* subulatus, corolla longior. *Stigma* obtusum.

PER. *Pomum* globosum, 10-loculare, carne molissima.

SEM. solitaria, ovata, nitida margine longitudinali hilo, apice unguiculato; basi acuminata.

OBS. A. mammosa demit unicam sextam partem numeri.

684. HÆMANTHUS. * *Tournef. 433. Dracunculoides. Bærh. II. 226.*

CAL. *Involucrum* hexaphyllum, maximum, umbelluliferum: *foliolis* erectis, oblongis, persistentibus.

COR. monopetala, erecta, sexpartita: *laciniis* erectis, linearibus; *Tubo* brevissimo, angulato.

STAM. *Filamenta* sex, subulata, tubo corollæ inserta, corolla longiora. *Antheræ* incumbentes, oblongæ.

PIST. *Germen* inferum. *Stylus* simplex, longitudine staminum. *Stigma* simplex.

PER. *Bacca* subrotunda, trilocularis.

SEM. solitaria, triquetra.

685. LEUCOJUM. * *Narcisso-Leucojum Tournef.* 208. A. C. D. E. F.

CAL. *Spatha* oblonga, obtusa, compressa, latere plano dehiscens, marcescens.

COR. campaniformi-patens. *Petala* sex, ovata, plana, basi coalita: apicibus crassiusculis, strictioribus.

STAM. *Filamenta* sex, setacea, brevissima. *Anthera* oblonga, obtusa, quadrangulares, erecta, distantes.

PIST. *Germen* subrotundum, inferum. *Stylus* clavatus, obtusus. *Stigma* setaceum, erectum, acutum, staminibus longius.

PER. *Capsula* turbinata, trilocularis, trivalvis.

SEM. plura, subrotunda.

ORS. *Stylo filiformi gaudet L. autumnale. Lin.*

686. GALANTHUS. *

CAL. *Spatha* oblonga, obtusa, compressa, latere plano dehiscens, marcescens.

COR. *Petala* tria, oblonga, obtusa, concava, laxa, patula, aequalia.

Nectarium cylindraceum, triphyllum, petalis dimidio brevius: *foliis* petaloideis, parallelis, emarginatis, obtusis.

STAM. *Filamenta* sex, capillaria, brevissima. *Anthera* oblonga, acuminata, in setam desinentes, conniventes.

PIST. *Germen* globosum, inferum. *Stylus* filiformis, staminibus longior. *Stigma* simplex.

PER. *Capsula* ovali-globosa, obtuse trigona, trilocularis, trivalvis.

SEM. plura, globosa.

687. NARCISSUS. * *Tournef.* 125.

CAL. *Spatha* oblonga, obtusa, compressa, latere plano dehiscens, marcescens.

COR. *Petala* sex, ovata, acuminata, plana, aequalia, tubo nectarii externe supra basin inserta.

Nectarium monophyllum, cylindraceo-infundibuliforme, limbo coloratum.

STAM. *Filamenta* sex, subulata, tubo nectarii affixa, nectario breviora. *Antheræ* oblongiusculæ.

PIST. *Germen* subrotundum, obtuse triquetrum, inferum. *Stylus* filiformis, staminibus longior. *Stigma* trifidum, concavum, obtusum.

PER. *Capsula* subrotunda, obtuse trigona, trilocularis, trivalvis.

SEM. plura, globosa, appendiculata.

OBS. *Nectarium* in diversis diversissimum, rotatum, campanulatum, conicum, turbinatum &c.

688. AMARYLLIS. * Lilio - Narcissus Tournef. 207.

CAL. *Spatha* oblonga, obtusa, compressa, emarginata, latere plano dehiscens, marcescens.

COR. *Petala* sex, lanceolata.

Nectarium squamis sex, extra basin filamentorum, brevissimis

STAM. *Filamenta* sex, subulata. *Antheræ* oblongæ, incumbentes, assurgentes.

PIST. *Germen* subrotundum, sulcatum, inferum. *Stylus* filiformis, longitudine ferme & situ staminum. *Stigma* trifidum, tenue.

PER. *Capsula* subovata, trilocularis, trivalvis.

SEM. plura.

OBS. *Inflexio* petalorum, staminum & pistilli in hoc genere admodum diversa est.

OBS. *Corolla* regulares aut irregulares, patula aut revoluta.

689. CRINUM.

CAL. *Involucrum* spathæ forme, bifolium, oblongum, umbelluliferum, post dehiscentiam reflexum.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* oblongus, cylindraceus, inflexus. *Limbus* sexpartitus: laciniis lanceolato-linearibus, obtusis, concavis, reflexis, quarum tres alterne appendiculo uncinato distinctæ.

STAM. *Filamenta* sex, subulata, e basi limbi, longitudine limbi, conniventia. *Antheræ* oblongæ, lineares, assurgentes, incumbentes.

PIST. *Germen* inferum. *Stylus* filiformis, longitudine floris. *Stigma* trifidum, minimum.

PER. *Capsula* subovata, trilocularis.

SEM. plurā.

OBS. C. angustifolio corollæ cylindricæ, aliis campanulatæ.

690. AGAPANTHUS. Ait. Kew. Mauhlia
Dahl obs. bot. 25.

CAL. *Spatha* communis latere dehiscens.

COR. monopetala, infundibuliformis, regularis. *Tubus* angulatus (quasi ex unguibus compositus). *Limbus* sexpartitus: *lacinia* oblongæ, patentes.

STAM. *Filamenta* sex, fauci tubi inserta, corolla breviora, declinata. *Antheræ* reniformes, incumbentes.

PIST. *Germen* superum, oblongum, trigonum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum, declinatus. *Stigma* simplex.

PER. *Capsula* oblonga, triquetra, trilocularis, trivalvis: *valvulae* naviculares interne dehiscences secundum carinam centralem.

SEM. numerosa, oblonga, compressa, membrana aucta.

691. PONTEDERIA. † Michelia. Houst.
A. A.

CAL. *Spatha* communis oblonga, latere dehiscens.

COR. monopetala, bipartita, tubulosa. *Labium* superius rectum, tripartitum: exterius æquale. *Lab. inferius* reflexum, tripartitum: *lacinis* æqualibus.

STAM. *Filamenta* sex, corollæ inserta, quorum tria subulata, longiora, ori. tubi corollæ: tria reliqua basi ejusdem tubi inserta. *Antheræ* erectæ, oblongæ

PIST. *Germen* oblongum, inferum. *Stylus* simplex, declinatus. *Stigma* crassiusculum.

PER. *Capsula* carnosa, conica, apice lato inflexo, trilocularis, triangularis, trifurca.

SEM. subrotunda, plurima.

OBS. P. vaginalis petala 6, *stylus* clavatum & *germen* superum habet.

P. hastata *germen* etiam superum & corolla hexapetala, æqualis est.

692. BULBOCODIUM. *

CAL. nullus.

COR. hexapetala, infundibuliformis. *Ungues* longissimi, lineares. *Faux* connectens petala. *Limbus* erectus: petalis lanceolatis, concavis.

STAM. *Filamenta* sex, subulata, petalorum unguibus inserta. *Antere* incumbentes.

PIST. *Germen* ovato-subulatum, obtuse trigonum, superum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigmata* tria, oblonga, erecta, canaliculata.

PER. *Capsula* triangularis, acuminata, angulis obsoletis, trilocularis.

SEM. numerosa.

693. TULBAGIA. †

CAL. *Spatha* umbellifera, bivalvis, oblonga, membranacea: *floribus* pedunculatis.

COR. monopetala, infundibuliformis, tubulosa, basi gibba: *limbo* sexpartito vel sexfido: *laciniis* lanceolatis, patulis, obtusis, longitudine tubi.

Neclarium ori tubi impositum, monophyllum, sexpartitum aut triphyllum: foliolis bifidis, obtusis, crassis, patulis, longitudine limbi.

STAM. *Filamenta* sex, brevissima, fere nulla. *Anthera* ovata, didyma: *tres superiores* alternæ, sub apice neclarii: *tres inferiores* intra tubum.

PIST. *Germen* ovatum, superum. *Stylus* cylindricus, brevis. *Stigma* turbinatum, cavum.

PER. *Capsula* ovata, supera, triangularis, obtusa, trilocularis, trivalvis.

SEM. nonnulla, compressa, subtriangularia.

OBS. *Narcissis adlociari nequit, ob germen superum. Hyacintho, similior corolla.*

694. ALLIUM. * *Tournef.* 206. *Hall.* *Cepa*
Tournef. 205. *Porrum* *Tournef.* 204.
Scorodopratum *Mich.* 24. *Moly* *Boehr.*
 2. p. 146.

CAL. *Spatha* communis, subrotunda, marcescens, multiflora.

LINEE GEN. PL. VOL. I.

U

COR. *Petala sex, oblonga.*

STAM. *Filamenta sex, subulata, longitudine sæpe corollæ. Antheræ oblongæ, erectæ.*

PIST. *Germen superum, breve, subtrigonum, angulis lineâ insculptis. Stylus simplex. Stigma acutum.*

PER. *Capsula brevissima, lata, triloba, trilocularis, trivalvis.*

SEM. *plura, subrotunda.*

OES. *Stamina alterna tria in quibusdam speciebus lata, bifurcata anthera intermedia.*

695. APHYLLANTHES. † Tournef. 430.

CAL. *Glumæ univalves, lanceolatae, plures, imbricatæ.*

COR. *Petala sex, ovata, limbo patentia. Ungues tennes, erecti, in tubum convergentes.*

STAM. *Filamenta sex, setacea, corolla breviora, fauci corollæ inserta. Antheræ oblongæ.*

PIST. *Germen superum, trigonum, turbinatum. Stylus filiformis, longitudine staminum. Stigmata tria, oblonga.*

PER. *Capsula turbinata, triangularis, trilocularis.*

SEM. *ovata.*

OBS. *Differt a Junco sola corolla.*

696. HYPOXIS. †

CAL. *Glumæ bivalvis.*

COR. *monopetala, supera: Limbus sexpartitus: laciniis ovato-oblongis, patentibus; persistens.*

STAM. *Filamenta sex, brevissima, capillaria. Antheræ oblongæ, petalis breviores.*

PIST. *Germen inferum, turbinatum. Stylus filiformis, longitudine staminum. Stigma obtusiusculum.*

PER. *Capsula oblongiuscula, basi angustior, coronata corolla persistente, trilocularis, trivalvis.*

SEM. *plurima, subrotunda.*

697. ALSTROEMERIA.* *Amæn. Acad. VI. p. 247. Alstrœmeriæ monographia.*

CAL. *nullus.*

COR. hexapetala, subbilabiata. *Petala Exteriora* tria cuneiformia, retusa, mucronata; *Interiora* alterna lanceolata: duobus his inferioribus basi tubulosis.

STAM. *Filamenta* sex, subulata, declinata, inæqualia: *Anthera* oblongæ.

PIST. *Germen* inferum, sexangulare, truncatum. *Stylus* declinatus, filiformis, longitudine staminum. *Stigmata* tria, oblonga, bifida.

PER. *Capſula* subrotunda, sexangularis, mucronata, trilocularis, trivalvis: valvulis concavis, dissepimento contrariis.

SEM. plurima, globosa, punctis elevatis tecta, apice subumbilicata.

698. GETHYLLIS. *Papiria Suppl. p. 27.*
Thunb. diff. nov. gen. p. 13.

CAL. nullus.

COR. monopetala. *Tubus* cylindricus, radicalis. *Limbus* sexpartitus, patens.

STAM. *Filamenta* sex, ori tubi inserta, sæpius divisa. *Anthera* spirales.

PIST. *Germen* inferum. *Stylus* simplex. *Stigma* clavatum.

PER. *Bacca* clavata, radicalis, unilocularis.

SEM. nidulantia, globosa.

699. HEMEROCALLIS. * *Lilio - Asphodelus Tournef. 179.*

CAL. nullus.

COR. sexpartita, infundibuliformi - campanulata. *Tubus* brevis. *Limbus* patens, superne magis reflexus.

STAM. *Filamenta* sex, subulata, longitudine corollæ, declinata: *superiora* breviora. *Anthera* oblongæ, incumbentes, assurgentes.

PIST. *Germen* subrotundum, sulcatum, superum. *Stylus* filiformis, longitudine & situ staminum. *Stigma* obtuse trigonum, assurgens.

PER. *Capſula* ovato - triloba, trigona, trilocularis, trivalvis.

SEM. plurima, subrotunda.

700. AGAVE. *

CAL. nullus.

COR. monopetala, infundibuliformis: *Limbo* sexpartito, æquali: *laciniis* lanceolatis, erectis.STAM. *Filamenta* sex, filiformia, erecta, corolla longiora. *Antheræ* lineares, filamentis breviores, verifutiles.PIST. *Germen* oblongum, utrinque attenuatum, inferum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum, trigonus. *Stigma* capitatum, trigonum.PER. *Capsula* oblonga, triangularis, utrinque attenuata, trilocularis, trivalvis.

SEM. numerosa.

701. ALOE * *Tournef.* 190.

CAL. nullus.

COR. monopetala, erecta, sexfida, oblonga. *Tubus* gibbus. *Limbus* patulus, parvus: fundo nectarifero.STAM. *Filamenta* sex, subulata, longitudine corollam fere superantia, receptaculo inserta. *Antheræ* oblongæ, incumbentes.PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* simplex, longitudine staminum. *Stigma* obtusum, trifidum.PER. *Capsula* oblonga, trifurca, trilocularis, trivalvis.

SEM. plura, angulata.

OBS. A. *variegata simplici est stigmate, & staminibus declinatis.*

702. ALETRIS.

CAL. nullus.

COR. monopetala, infundibuliformis, sexangularis, rugosissima, semisextida: *Limbi laciniis* lanceolatis, acuminatis, patentibus, erectis; persistens.STAM. *Filamenta* sex, subulata, longitudine corollæ, inserta basi laciniarum corollæ. *Antheræ* oblongæ, erectæ.PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* subulatus, longitudine staminum. *Stigma* trifidum.PER. *Capsula* ovata, triquetra, acuminata, trilocularis.

SEM. plurima.

OBS. Stamina non alternantia cum corollæ segmentis, sed
iisdem opposita, ut ♂ Corolla rugosissima & fere farina-
cea, distinctissimum reddunt genus.

OBS. Fructus A. guineensis bacca est.

703. POLIANTHES. *

CAL. nullus.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus incurvus, oblongus. Limbus patulus: laciniis sex, ovatis.*

STAM. *Filamenta sex, crassa, obtusa, ad faucem corollæ Antheræ lineares, filamentis longiores.*

PIST. *Germen subrotundum, in fundo corollæ. Stylus filiformis, corolla fere brevior. Stigma trifidum, crassiusculum, melliferum.*

PER. *Capsula subrotunda, obtuse trigona, basi corollæ obvoluta, trilocularis, trivalvis,*

SEM. plurima, plana, gemino ordine incumbentia, semiorbiculata.

704. CAPURA. †

CAL. nullus.

COR. monopetala, tubulosa. *Tubus cylindricus: Limbus sexfidus: laciniis rotundatis; exterioribus alternis angustioribus.*

STAM. *Filamenta vix ulla. Antheræ sex, oblongæ, intra tubum: alternis superioribus.*

PIST. *Germen superum, trigono-subrotundum, truncatum. Stylus cylindricus, brevissimus. Stigma subglobofum.*

PER. *Bacca?*

SEM.

705. CONVALLARIA. * a. *Lilium convallium. Tournef. 14.* b. *Polygonatum Tournef. 41.* c. *Unifolium Dill. gen. 7.*

CAL. nullus.

COR. monopetala, campanulata, glabra: *Limbus sexfidus, obtusus, patenti-reflexus.*

STAM. *Filamenta* sex, subulata, petalo inserta, corolla breviora. *Anthera* oblonga, erecta.

PIST. *Germen* globosum. *Stylus* filiformis, staminibus longior. *Stigma* obtusum, trigonum.

PER. *Bacca* globosa, trilocularis, ante maturitatem maculata.

SEM. solitaria, subrotunda.

US. *Bacca* immaturata maculata notam præbet omnibus communem.

a. quum corolla globoso-campanulata, patens sit. 1.

b. quum corolla tubulato-campanulata sit. 4. 5. 6. 7.

c. quum unica tertia pars numeri in partibus fructificationis execta sit. 11.

d. quum corolla sexpartita patens, acutissima sit. 3. 9. 10.

706. HYACINTHUS. * Tournef. 180. Muscari Tournef. 180.

CAL. nullus.

COR. monopetala, campanulata. *Limbus* sexfidus, reflexus.

Neclarium : pori tres melliferi, ad apicem germinis.

STAM. *Filamenta* sex, subulata, breviora. *Anthera* conniventes.

PIST. rotundo-trigonum, trisulcum. *Stylus* simplex, corolla brevior. *Sigma* obtusum.

PER. *Capitulum* subrotunda, triquetra, trilocularis, trivalvis.

SEM. bina (sapius), subrotunda.

US. *Gnus* hocce naturale in plura non naturalia distribuant.

a *Hyacinthus* T. quum *Tubus* corollæ sit tubulatus, oblongus.

b *Muscari* T. quum corolla sit fere globosa.

c *Alii* corollæ sexpartita gaudent: alii corolla infundibuliformi, campanulata, ovata, globosa, etiam angulato-cylindrica.

707. LACHENALIA. Jacq. jun. in *Act. helv.* vol. I. pag. 38. c. fig.

CAL. *Perianthium* inferum, coloratum, corolla duplo

brevius, erectum, obtuse trigonum, monophyllum, basi supra utraque pedunculum globosum, profunde trifidum: *laciniis* late ovatis, obtusis, corollæ arcte accumbentibus: *extima* carinata & ad apicem callo depresso instructa: reliquis concavis.

COR. *Petala* tria, (aut si *Perianthium* corollæ partibus adnumeretur) sex, erecta, ex receptaculo communi orta, cuneiformi-oblonga, emarginata, conniventia simul in tubum, cum limbo brevi patuloque.

STAM. *Filamenta* sex, subulata, æqualia, erecta, fere longitudine corollæ, tria ad basin petalorum, quibuscum avelluntur una, tria cum petalis alternantia. *Anthere* oblongæ, incumbentes.

PIST. *Germen* superum, triquetrum-subrotundum, parvum. *Stylus* filiformis, erectus, longitudine staminum. *Stigma* simplex.

PER. *Capsula* obtusa.

SEM. —

OBS. *Hujus generis Hyacinthus orchioides* Jacq. hort. v. c. t. 178? *S. Phormium Hyacinthoides*. Suppl. p. 204. nec non *Phormium alooides*, Suppl. p. 205. Vide Dahl. dissert. botan. l. c.

708. LANARIA. Ait. Kew.

CAL. nullus.

COR. monopetala, subcampanulata, extus plumosolanata. *Tubus* brevis. *Limbus* sexpartitus: *laciniæ* lineari-lanceolatae, subpatulae.

STAM. *Filamenta* sex, basi laciniarum corollæ inserta, filiformia, corolla breviora. *Anthere* ovatae, subincumbentes.

PIST. *Germen* inferum, turbinatum, extus lanatum. *Stylus* filiformis, erectus, longitudine staminum. *Stigma* trifidum.

PER. *Capsula* ovata, trilocularis.

SEM. pauca.

709. PHORMIUM. Suppl. 23. Forst. gen. n. 24.

CAL. nullus.

COR. *Petala* sex, campanulata, seu cylindrica.

Tria exteriora breviora: *Tria interiora* longiora, apice patula, obtusa.

STAM. *Filamenta* sex, filiformia, adscendentia, corolla longiora. *Antheræ* erectæ, subtriquetræ.

PIST. *Germen* superum, triquetrum. *Stylus* filiformis, adscendens, longitudine corollæ. *Stigma* simplex.

PER. *Capsula* longa, triquetra, acuminata, trilocularis, trivalvis.

SEM. plurima, oblonga, depressa.

710. ASPHODELUS. * Tournef. 178.

CAL. nullus.

COR. monopetala, sexpartita: *laciniis* lanceolatis, planis, patentibus.

Nectarium valvulis sex, minimis, conniventibus in globum, basi corollæ insertis.

STAM. *Filamenta* sex, subulata, valvulis nectararii inserta, arcuata: *alterna* breviora. *Antheræ* oblongæ, incumbentes, assurgentes.

PIST. *Germen* subrotundum, intra nectarium. *Stylus* subulatus, situ staminum. *Stigma* truncatum.

PER. *Capsula* globosa, carnosæ, triloba, trilocularis.

SEM. plura, triangularia, hinc gibba.

OBS. *Filamenta* in aliis declinata, in aliis extrorsum arcuata sunt.

711. ANTHERICUM. * Phalangium Tournef. 193. Bulbine, edit. prior. 269.

CAL. nullus.

COR. *Petala* sex, oblonga, obtusa, patentissima.

STAM. *Filamenta* sex, subulata, erecta. *Antheræ* parvæ, incumbentes, quadrifulcæ.

PIST. *Germen* obsolete trigonum. *Stylus* simplex, longitudine staminum. *Stigma* obtusum, trigonum.

PER. *Capsula* ovata, glabra, trifulca, trilocularis, trivalvis.

SEM. numerosa, angulata.

OBS. *Species variae* filamentis lanatis gaudent; in aliis petala non decidunt. *Liliastrum* T. corolla campanulata A.

calyculatum calyce tridentato & stigmatibus tribus absque stylo distinctis. Character Generis difficillime eruitur.

712. ORNITHOGALUM * Tournef. 203.

A. D. H. I. K. Stellaris Dill. gen.

110.

CAL. nullus.

COR. Petala sex, lanceolata, infra medium erecta, supra medium patentia, persistencia, colorem demittentia.

STAM. Filamenta sex, erecta, alterna basi dilatata, corolla breviora. Antheræ simplices.

PIST. Germen angulatum. Stylus subulatus, persistens. stigma obtusum.

PER. Capsula subrotunda, angulata, trilocularis, trivalvis.

SEM. plura, subrotunda.

OBS. Filamenta in aliis plana, erecta, alterna apice trifido, media lacinia antheram sustinente; in aliis alterna simplicia.

713. SCILLA. * Lilio - Hyacinthus Tournef.

196. B. F. G. Hyacinthus stellaris

Raj. meth. 119.

CAL. nullus.

COR. Petala sex, ovata, patentissima, decidua.

STAM. Filamenta sex, subulata, corolla dimidio breviora. Antheræ oblongæ, incumbentes.

PIST. Germen subrotundum. Stylus simplex, longitudine staminum, deciduus. stigma simplex.

PER. Capsula subovata, glabra, trifurca, trilocularis, trivalvis.

SEM. plura, subrotunda.

714. CYANELLA. † Royen.

CAL. nullus.

COR. Petala sex, unguibus coherencia, oblonga, concava, patula: tribus inferioribus propendentibus.

314 HEXANDRIA MONOGYNIA.

STAM. *Filamenta* sex, basi contigua, brevissima, patentiuscula: infimo declinato, duplo longiore. *Anthera* oblonga, erecta, apice dehiscentes dentibus quatuor obtusis.

PIST. *Germen* trigonum, obtusum. *Stylus* filiformis, declinatus, longitudine infimi staminis. *Stigma* acutiusculum.

PER. *Capsula* subrotunda, trifurcata, trilocularis, trivalvis.

SEM. plura, oblonga.

715. DRACÆNA. *Auth. Vandellio. Oederia & Stœrckia Crantz.*

CAL. nullus.

COR. *Petala* sex, oblonga, erectiuscula, aequalia, unguibus coherentia.

STAM. *Filamenta* sex, unguibus inserta, subulata, medio crassiora, basi membranacea, longitudine vix corollæ. *Anthera* oblonga, incumbentes.

PIST. *Germen* ovatum, sexstriatum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* trifidum, trigonum.

PER. *Bacca* ovata, sexfurcata, trilocularis.

SEM. solitaria, ovato-oblonga, apice incurvata.

Obs. *Chusater* fere *Asparagi*, *habitus diversus*.

716. POLLIA. *Thunb. diff. nov. gen. p. 11. Flor. jap. p. 8.*

CAL. nullus.

COR. hexapetala. *Petala* tria exteriora, ovata, concava, majora, obtusa, cum exterioribus alternantia: tria interiora reflexa, nervosa, tenuissima, bractea paulo breviora.

STAM. *Filamenta* sex, receptaculo inserta, capillaria, apice incurva. *Anthera* rotunda, didyma, flava.

PIST. *Germen* superum, globosum. *Stylus* filiformis-fimbriatus, incurvatus, albus, bractea vix longior. *Stigma* simplex, obtusum.

PER. *Bacca* globosa, bractea, corollaque reflexa persistentibus cincta, glaberrima magnitudine piperis, immatura alba, matura carulea.

SEM. angulata, plurima, usque viginti, fusca.

717. ASPARAGUS. * *Tournef.* 154.

CAL. nullus.

COR. *Petala* sex, unguibus cohærentia, oblonga, in tubum erecta; interiora tria alterna, apice reflexa, persistentia.

STAM. *Filamenta* sex, filiformia, petalis inserta, erecta, corolla breviora. *Anthera* subrotundæ.

PIST. *Germen* turbinatum, trigonum. *Stylus* brevissimus. *Stigma* punctum prominens.

PER. *Barca* globosa, puncto umbilicata, trilocularis.

SEM. bina, rotunda, introrsum angulata, glabra.

OBS. Qui *florem* dicit *monopetalum*, salvo jure possit.

Corollæ figura differens est in diversis: aliis erecta, aliis plana, aliis revoluta; Flos pendulus pistillo licet brevissimo.

A. declinatus, quem habeo, mas est ex Cap. b. spei.

718. GLORIOSA. * *Methonica Tournef.* A. G. 1706.

CAL. nullus.

COR. *Petala* sex, oblongo-lanceolata, undulata, longissima, totaliter reflexa.

STAM. *Filamenta* sex, subulata, corolla breviora, recto-patula. *Anthera* incumbentes.

PIST. *Germen* globosum. *Stylus* filiformis, staminibus longior, inclinatus. *Stigma* triplex, obtusum.

FER. *Capsula* ovalis, pellucida, trilocularis, trivalvis.

SEM. plura, globosa, duplici serie disposita.

OBS. *Agnis Erythronio.*

719. ERYTHRONIUM * *Dens canis Tournef.* 202.

CAL. nullus.

COR. *Petala* sex, oblongo-lanceolata, acuminata, versus basin alternatim incumbencia, sensim patentiora, a medio reflexa.

Nectaria: Tubercula duo, obtusa, callosa, singulo petalo alterno & interiori juxta basin adnata.

STAM. *Filamenta* sex, subulata, brevissima. *Anthera* oblongæ.

PIS. *Germen* turbinatum. *Stylus* simplex, corolla brevior, rectus. *Stigma* triplex, patens, obtusum.

PER. *Capsula* subglobosa, ad basin angustior, trilocularis, trivalvis.

SEM. plurima, ovata, acuminata.

720. UVULARIA. *

CAL. nullus.

COR. *Petala* sex, oblongo-lanceolata, acuta, erecta, longissima.

Nectarium: fovea oblonga basi singuli petali insculpta.

STAM. *Filamenta* sex, brevissima, latiuscula. *Antheræ* longæ, erectæ, corolla dimidio breviores.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* unicus, semitrifidus, filiformis, staminibus longior. *Stigmata* simplicia, reflexa.

PER. *Capsula* ovato-oblonga, triangularis, trilocularis, acuta.

SEM. plura, subrotunda, compressa.

721. FRITILLARIA. * Tournef. 201. Petilium ed. prim. 259. Corona imperialis Tournef. 197. 198.

CAL. nullus.

COR. hexapetala, campanulata, basi patens. *Petala* oblonga, parallela.

Nectarium: fovea in basi singuli petali excavata.

STAM. *Filamenta* sex, subulata, stylo approximata, longitudine corollæ. *Antheræ* quadrangulæ, oblongæ, erectæ.

PIST. *Germen* oblongum, trigonum, obtusum. *Stylus* simplex, staminibus longior. *Stigma* triplex, patens, obtusum.

PER. *Capsula* oblonga, obtusa, triloba, trilocularis, trivalvis.

SEM. plurima, plana, extrorsum semiorbiculata, gemino ordine collocata.

ORS. *Fritillaria* T. *Nectario* oblongo. *Pericarpio* lævi. *Imperialis* T. *Nectario* hemisphærico. *Pericarpio* marginibus acuto.

722. LILIUM. * *Torrnef.* 195. *Lirium Roy.* 30.

CAL. nullus.

COR. hexapetala, campanulata, inferne angustata: *Petalis erecta, incumbencia, dorso obtuse carinata, sensim patentiora, latiora: apicibus obtusis, crassis, reflexis.*

Nectarium: linea longitudinalis, tubulosa, petalis singulis a basi ad medium insculpta.

STAM. *Filamenta sex, subulata, erecta, corolla breviora. Antheræ oblongæ, incumbentes.*

PIST. *Germen oblongum, cylindraceum, sex sulcis striatum. Stylus cylindraceus, longitudine corollæ. Stigma crassiusculum, triangulare.*

PER. *Capsula oblonga, sexsulcata, apice cavo, trigono, obtuso; trilocularis, trivalvis: valvulis pilo cancellatim intertexto connexis.*

SEM. numerosa, gemino ordine incumbencia, plana, extrorsum semi-orbiculata.

OBS. *Nectarium in aliis barbata est, in aliis imberbe. Petala in aliis totaliter revoluta, in aliis non item.*

723. TULIPA. * *Tournef.* 199. 200.

CAL. nullus.

COR. campanulata. *Petala sex, ovato-oblonga, concava, erecta.*

STAM. *Filamenta sex, subulata, brevissima. Antheræ quadrangulæ, oblongæ, erectæ, distantes.*

PIST. *Germen magnum, oblongum, trigono-teres. Stylus nullus. Stigma trilobum, triangulare: angulis protuberantibus, bifidis; persistens.*

PER. *Capsula triquetra, trilocularis, trivalvis: valvulis margine ciliatis, ovatis.*

SEM. plurima, plana, gemino ordine incumbencia, semiarcularia, floccis conformibus distincta.

724. YUCCA. * *Dill. gen.* 5. *Cordyline Roy. lugd.* 22.

CAL. nullus.

COR. campanulata, sexpartita, unguibus cohærens: *laciniis ovatis, maximis, patentibus.*

STAM. *Filamenta* sex, brevissima, superne crassiora, reflexa. *Antheræ* minimæ.

PIST. *Germen* oblongum, obtuse triquetrum, staminibus longius. *Stylus* nullus. *Stigma* trifidum, obtusum, laciniis bifidis, pervium.

PER. *Capsula* oblonga, trifida, obtuse triangularis, trilocularis, trivalvis.

SEM. plurima, gemino ordine incumbentia.

725. ALBUCA.

CAL. nullus.

COR. *Petala* sex, ovali-oblonga, persistentia: tria exteriora patula; tria interiora conniventia, apice crassiusculo, reniformi, emarginata.

STAM. *Filamenta* sex, longitudine corollæ, triquetra: horum *Fertilia* tria, linearia, basi latiora, supra basin lateribus plicata. *Antheræ* versatiles. *Sterilia* tria, alterna, crassiora, longiora. *Antheræ* nullæ.

Nectarium ex Germinis sulcis basi latioribus, desinentibus mucronibus duobus lateralibus, inclusis a basi latiore filamentorum fertilium approximata.

PIST. *Germen* oblongum, triquetrum, subpedicellatum. *Stylus* triqueter, superne latior. *Stigma* intermedium triquetrum-pyramidatum; cui circumstant tria alia minora, subulata, patula.

PER. *Capsula* oblonga, obtusa, triangularis, trilocularis, trivalvis.

SEM. numerosa, plana, incumbentia, extrorsum latiora.

726. LINDERA. Thunb. *diff. nov. gen.* p. 64. *Flor. jap.* p. 9.

CAL. nullus.

COR. hexapetala. *Petala* ovata, obtusa, flavescentia, femilineam longa.

STAM. *Filamenta* sex, germiini inserta, corolla multoties breviora. *Antheræ* minutæ.

PIST. *Germen* superum, ovatum, glabrum. *Stylus* unicu-
sus, erectus, corolla paulo brevior. *Stigmata* duo,
reflexa.

PER. *Capsula* bilocularis.

727. MASSONIA. *Suppl. p. 27. Thunb. diff. nov. gen. p. 39.*

CAL. nullus.

COR. hexapetala. *Petala* nectario extus imposita, lanceolata, patentia, erecta.

Nectarium inferum, cylindricum, sexstriatum, membranaceum, sexdentatum.

STAM. *Filamenta* sex, nectarii dentibus inserta, filiformia, incurvata. *Antherae* incumbentes, oblongae.

PIST. *Germen* superum, (respectu nectarii). *Stylus* subulatus, declinatus, longitudine staminum. *Stigma* simplex, acutum.

PER. *Capsula* triquetra, obtusa, glabra, trivalvis, trilocularis, angulis longitudinaliter dehiscens.

SEM. plurima, globosa, glabra.

In memoriam Francisci Masson, Peregrinatoris Botanici celeberrimi.

728. ORONTIUM. † Aronia. *Mich. 1.*

CAL. *Spadix* cylindricus, simplicissimus, tectus flosculis. *Spatha* nulla

Perianthium nullum (nisi corollam velis).

COR. *Petala* sex, peltata, subrotundo-angulata, persistentia.

STAM. *Filamenta* sex, brevissima, ensiformia, intra *Petala* singula. *Antherae* didymae, oblongae.

PIST. *Germen* subrotundum, depressum. *Stylus* nullus. *Stigma* subrotundum, bifidum.

PER. *Folliculus* tenuis, cum corolla immerfus spadici.

SEM. unicum, rotundum, fungosum.

729. THRINAX. *Swartz. prodr.*

CAL. 6-dentatus.

COR. nulla.

Stigma emarginatum.

Bacca 1-sperma.

730. ACORUS. * Calamus Aromaticus *Petit. gen. Mich. 31.*

CAL. *Spadix* cylindricus, simplicissimus, flosculis tectus. *Spatha* nulla.

Perianthium nullum (*nisi calycem dicas*).

COR. *Petala* sex, obtusa, concava, laxa, superne crassiflora, & fere truncata.

STAM. *Filamenta* sex, crassiuscula, corolla paulo longiora. *Antheræ* crassiusculæ, didymæ, terminales, adnatae.

PIST. *Germen* gibbum, oblongiusculum, longitudine staminum. *Stylus* nullus. *Stigma* punctum prominens.

PER. *Capfuli* brevis, triangula, utrinque attenuata, obtusa, trilocularis.

SEM. plurima, ovato-oblonga.

731. CALAMUS. †

CAL. *Perianthium* hexaphyllum, persistens: *foliis* tribus exterioribus brevioribus, latioribus; interioribus tribus longioribus, angustioribus, acuminatis.

COR. nulla. (*nisi calycem dicas*).

STAM. *Filamenti* sex, capillaria, calyce longiora. *Antheræ* rotundæ.

PIST. *Germen* subrotundum, superum. *Stylus* trifidus, teres, spiralis, filiformis. *Stigmata* simplicia.

PER. membranaceum, globosum, tectum squamis retrorsum imbricatis, obtusis, uniloculare, primum pulposum, dein exsuccum.

SEM. unicum, globosum, carnosum.

732. EHRHARTIA. Suppl. p. 28. Thunb. diff. nov. gen. p. 16.

CAL. *Gluma* abbreviata, uniflora, bivalvis. *Valvula* subovata, acuta, concavo-canaliculata, patentiusculæ, glaberrimæ, subinaequales: *exterior* minor, ovato-lanceolata, interiorem basi amplexans: *interior* major, lato-ovata, longitudinaliter striata.

COR. *Gluma* duplex, mutica, calyce duplo longior: *exterior* non expansa, acinaciformis, bivalvis.

Valvula oblonga, obtusa, complicata, compressa, amplexantes, hispida, transversaliter rugosa, basi excisa, inaequales.

Exterior obovata, ante florescentiam maximam partem interioris obvolvens, vix longior, sed latior, carinata, dorso recurvata, inferne rugosa, basi duobus fasciculis villorum munita.

Fusci-

Fasciculus inferior in ala valvulæ calycinæ interioris; *superior* inferiori oppositus.

Villi in quovis fasciculo viginti ad triginta, calyce breviores.

Interior angustior, linearis, incurvata, tota rugosa, ad basin dorsii in utroque latere fasciculo villorum ornata.

Rugæ transversæ, fasciatæ, elevatae.

Interior anceps, bivalvis.

Valvula membranacea, complicata, glaberrima, inæquales

exterior ovata, striata, apice emarginata, basi carinata.

interior angustior, subulata, falcata.

Nectarium Membranulæ duæ, minimæ, tenuissimæ, lacerato-ciliatæ, genitalia obvolventes.

STAM. *Filamenta* sex, brevissima, in linea parallela receptaculo compresso inserta. *Antheræ* erectæ, lineares, apice bifidæ, basi emarginatæ.

PIST. *Germen* ovatum, compressiusculum, minimum, glabrum. *Stylus* compressus, brevissimus, glaber. *Stigma* simplex, longum, compressum, quadrijubatum, apice lacerum: *juba* longitudine stigmatis, cruciatim oppositæ.

PER. nullum.

SEM. unicum, ovatum, glabrum.

733. PHARUS. †

* *Masculi* pedunculati.

CAL. *Gluma* bivalvis, acuta, minima, uniflora.

COR. *Gluma* bivalvis, longior, acuta, altera angustiore.

STAM. *Filamenta* sex, brevissima. *Antheræ* oblongæ.

* *Feminei* sessiles in eadem panicula.

CAL. *Gluma* bivalvis, longitudine corollæ, uniflora.

COR. *Gluma* bivalvis: valvula exterior ovale-oblonga, rigidiore; inferiore lineari.

PIST. *Germen* lineare. *Stylus* simplex. *Stigmata* tria, acuta.

PER. *Gluma* corollæ semen obvolvens.

SEM. oblongum.

734. JUNCUS * Tournef. 127.

CAL. *Gluma* bivalvis.

LINNE GEN. PL. VOL. I.

X

Perianthium hexaphyllum: *foliis* oblongis, acumina-
tis, persistentibus.

COR. nulla (*nisi Perianthium coloratum recens corollam dic-
cas*).

STAM. *Filamenta* sex, capillaria, brevissima. *Antheræ*
oblongæ, erectæ; longitudine perianthii.

PIST. *Germen* triquetrum, acuminatum. *Stylus* brevis,
filiformis. *Stigmata* tria, longa, filiformia, villosa,
inflexa.

PER. *Capsula* testâ, triquetra, unilocularis, trivalvis.

SEM. nonnulla, subrotunda.

OBS. J. bufonius Linn. & J. Halleri num. 1320. *floribus*
triandris gaudent.

735. TAMUS. * Tamnus Tournef. 28.

* *Mas.*

CAL. *Perianthium* sexpartitum: *foliis* ovato-lanceolatis,
superne patentioribus.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* sex, simplicia, calyce breviora. *An-
theræ* erectæ.

* *Femina.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, sexpartitum, campa-
nulatum, patens: *laciniis* lanceolatis; superum, deci-
duum.

COR. *Petala* nulla.

Nectaria: Punctum oblongum, singulæ lacinie caly-
cinæ ad basin interne adnatum.

PIST. *Germen* ovato-oblongum, magnum, glabrum, in-
ferum. *Stylus* cylindraceus longitudine calycis. *Stig-
mata* tria, reflexa, emarginata, acuta.

PER. *Bacca* ovata, trilocularis.

SEM. bina, globosa.

736. PEPLIS. * Portula Dill. gen. 7. Glaucoides Mich. 18.

CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum, persi-
stens, maximum, ore duodecimfido: denticulis alter-
nis reflexis.

COR. *Petala* sex, ovata, minutissima, calycis faucibus in-
serta.

STAM. *Filamenta* sex, subulata, brevia. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* brevissimus. *Stigma* orbiculatum.

PER. *Capsula* cordata, bilocularis, dissepimento opposito.

SEM. plurima, triquetra, minima.

OBS. *In plurimis unius ejusdemque plantæ flosculis omnino deficit corolla.*

P. tetrandræ $\frac{1}{2}$ pars demitur partibus fructificationis.

II. DIGYNIA.

737. FALCKIA. *Suppl. p. 30. Thunb. diff. nov. gen. p. 17.*

CAL. *Perianthium* inferum, monophyllum, infundibuliforme, quinquepartitum, persistens. *Dentes* lanceolati.

COR. monopetala, campanulata. *Limbus* ampliatus, crenatus, decempartitus.

STAM. *Filamenta* sex, filiformia, tubo inserta, erecta, inæqualia, corolla breviora. *Antheræ* ovatæ.

PIST. *Germina* quatuor, supera, glabra. *Styli* duo, capillares, divaricati. *Stigmata* capitata, obtusa.

PER. nullum.

SEM. in fundo calycis, quatuor, globosa.

OBS. *Convolutis adfinis.*

738. ATRAPHAXIS. *

CAL. *Perianthium* diphyllum: *foliolis* oppositis, lanceolatis, coloratis, persistentibus.

COR. *Petala* duo, subrotunda, sinuata, calyce majora, persistentia.

STAM. *Filamenta* sex, capillaria, longitudine calycis. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* compressum. *Stylus* nullus. *Stigmata* duo, capitata.

PER. nullum. *Calyx* clausus, includens semen.

SEM. unicum, subrotundum, compressum.

OBS. A. undulata calyce 4-partito: laciniis ovatis concavis; corolla nulla, staminibus lanceolatis; stylo bipido, semine subrotundo differt.

739. GAHNIA. Suppl. p. 31. Forst. charact. gen. n. 26.

CAL. Gluma irregularis, bivalvis. Valvula lanceolata, canaliculata, acuminata, inæquales: exterior longior, latior.

COR. Gluma bivalvis, figura glumæ calycinæ, at brevior.

Nectarium hyalinum, bivalve, filamenta involvens. Valvula exterior major, cuneiformis, cum acumine: interior minor, ovata.

STAM. Filamenta sex, brevissima, glabra, sub florescentia elongata. Antheræ lineares, erectæ, acuminatæ.

PIST. Germen oblongum, glabrum. Stylus filiformis, erectus, apice bifidus. Stigmata bifida, simplicia, glaberrima, recurvata.

PER. nullum.

SEM. unicum, oblongum, subangulatum, glabrum, cinctum filamentis persistentibus, elongatis, flosculis duplo longioribus, pendentibus.

OBS. Magnam similitudinem cum Schæno habet hoc genus.

740. ORYZA. * Tournef. 296. Mich. 81. B. B.

CAL. Gluma uniflora, bivalvis, minima, acuminata, subæqualis.

COR. bivalvis: valvulis navicularibus, concavis, compressis: majore quinquangulati, aristati.

Nectarium (Petala Michelio) diphyllum, planum, ad latus alterum germinis, minimum: foliolis basi angustis, apice truncatis, caducis.

STAM. Filamenta sex, capillaria, longitudine corollæ. Antheræ basi bifidæ.

PIST. Germen turbinatum. Styli duo, capillares, reflexi. Stigmata clavata, plumosa.

PER. nullum. Corolla femini adnata, ovali-oblonga,

compressa, marginibus tenuibus, lateribus striis utrinque duabus.

SEM. unicum, magnum, oblongum, obtusum, compressum, utrinque bistriatum.

OBS. *An Flos ex flosculis duobus conflatus? D. Aymer.*

741. ZIZANIA. † Gronou. Elymus Mitch. 7.

* *Masculi Flores infra femineos.*

CAL. nullus.

COR. Gluma bivalvis; foliolis lanceolatis, muticis, æqualibus, amplexantibus.

STAM. Filamenta sex, minima. Antheræ oblongæ, simplices, longitudine corollæ.

* *Feminei flores in superiori parte paniculæ.*

CAL. nullus.

COR. Gluma bivalvis, clausa, supra germen tantum hians: valvula exterior majore, cava, longa, recta, utrinque interiorem amplexa, in Aristam longam desinente. V. interiore minore, lanceolata, plana.

PIST. Germen oblongum. Styli duo, minimi. Stigmata plumosa, eminentia.

PER. nullum. Gluma clausa, plicata, persistens.

SEM. unicum, oblongum, æquale, nitens, nudum.

742. BAMBOS. Retz. fasc. IV. obs. bot.
p. 24.

CAL. Squamæ plures, breves, inæquales, concavæ.

COR. Valvula exterior oblonga, mucronata, convexa, marginibus ad basin nonnihil inflexis, enerviæ; interior planiuscula, lanceolata, marginibus ad angulum acutum inflexis. Anguli pilosi.

STAM. Filamenta sex, brevissima: Antheræ lineares. (Plures sæpe antheræ in eodem filamento.)

PIST. Germen minimum. Styli breves duo, etiam unicus. Stigmata longa, longitudinaliter plumosa.

Inflorescentia. Spica disticha multiflora.

743. NECTRIS Schreb. Cabomba Aubl. 124.

CAL. Perianthium monophyllum, sexpartitum: laciniis tribus exterioribus ovatis, acutis, intus coloratis;

tribus alternis interioribus, ovatis, obtusis, minoribus, utrinque coloratis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* sex, capillaria, basi laciniarum calycis inserta. *Antheræ* ovatæ.

PIST. *Germina* duo, supera, oblonga. *Styli* breves. *Stigmata* obtusa.

PER. *Capsulæ* duæ, ovatæ, subcarnosæ, stylis persistentibus coronatæ, uniloculares.

SEM. numerosa, minima.

III. TRIGYNIA.

744. BORASSUS *Mus. Cliff.* 13. *Ampana*
H. M. l. 10. *Carim-pana* *H. M. l.* 9.

* *Mas.* *Ampana*.

CAL. *Spatha* universalis, composita. *Spadix* amentaceus, imbricatus.

COR. tripartita. *Petala* ovata, concava.

STAM. *Filamenta* sex, crassiuscula. *Antheræ* crassiores, striatæ.

* *Femina* *Carim-pana*: in distincta planta.

CAL. *Spatha* & *Spadix* ut in mare.

COR. tripartita. *Petala* subrotunda, parva, persistentia.

PIST. *Germen* subrotundum. *Styli* tres, parvi. *Stigmata* simplicia.

PER. *Bacca* (*Drupa*) subrotunda, obtusa, rigida, unilocularis.

SEM. tria, subovata, compressa, distincta, filamentosa.

745. ELAIS. *Jacq. amer.* 280.

* *Mas.*

CAL. *Perianthium* hexaphyllum: *foliolis* concavis, erectis.

COR. Monopetala, sexfida, erecta, acuta longitudine calycis.

STAM. *Filamenta* sex, subulata, longitudine corollæ. *Antheræ* oblongæ, acutæ.

* *Femina.*

CAL. ut in mare.

COR. hexapetala.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* crassiusculus. *Stigmata* tria, reflexa.

PER. *Drupa* fibrosa, ovata, subangulata, oleosa.

SEM. *Nux* ovata, subtrigona, foraminibus tribus, trivalvis, unilocularis.

746. COCOS. † *Mus. Cliff.* II. Tenga H.
M. I. t. I - 4 *Brown.* 341.

* *Masculi Flores* in eodem cum femineis spadice.

CAL. *Spatha* universalis univalvis. *Spadix* ramosus.

Perianthium tripartitum, minimum: *laciniis* subtrique-
tris, concavis, coloratis.

COR. *Petala* tria, ovata, acuta, patula.

STAM. *Filamenta* sex: simplicia, longitudine corollæ.

Anthæa sagittatæ.

PIST. *Germen* vix manifestum. *Styli* tres, breves. *Stigma* obsoletum.

PER. abortiens.

* *Feminei* in eodem cum masculis spadice.

CAL. *Spatha* communis cum hermaphroditis ut & *Spadix*.

Perianthium tripartitum: *laciniis* subrotundis, concavis,
conniventibus, coloratis, persistentibus.

COR. *Petala* tria, persistentia, calyci similia, sed paulo
majora.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* nullus. *Stigma* trilobum.

PER. *Drupa* coriacea maxima, subrotunda, obsolete tri-
gona.

SEM. *Nux* maxima, subovata, acuminata, trilocularis
(*Brown.*), trivalvis, obtuse trigona, basi tribus fo-
raminibus pervia. *Nucleo* cavo.

747. COLCHICUM. *Tournef.* 181, 182.

CAL. nullus (*nisi Spatha vaga.*)

COR. sexpartita. *Tubus* angulatus, radicans: *Limb* la-
ciniis lanceolato-ovatis, concavis, erectis.

STAM. *Filamenta* sex, subulata, corolla breviora. *Anthæa*
oblongæ, quadrivalves, incumbentes.

PIST. *Germen* intra radicem sepultum. *Styli* tres, filiformes, longitudine stamineum. *Stigmata* reflexa, canaliculata.

PER. *Capsula* triloba, introrsum futura connexa, obtusa, trilocularis, futuris dehiscens introrsum.

SEM. plura, subglobosa, rugosa.

748. MELANTHIUM. † *Clayt.*

CAL. nullus (*nisi corollam dicas*).

COR. *Petala* sex, ovato-oblonga, patentia, unguibus linearibus longioribus, persistentia.

STAM. *Filamenta* sex, filiformia, erecta, longitudine corollæ, cui inserta supra ungues. *Anthera* globosæ.

PIST. *Germen* conicum, striatum. *Styli* tres, distincti, curvi. *Stigmata* obtusa.

PER. *Capsula* ovata, trigona, trifulca, trilocularis, ex capsulis tribus introrsum unitis.

SEM. plurima, compressa, semiovata.

OBS. *M. fibirico petala sessilia*: *M. monopetalo corolla monopetala*.

749. VERATRUM. * *Tournef.* 145.

* *Hermaphroditus*.

CAL. nullus, nisi corollam dicas.

COR. *Petala* sex, oblonga, lanceolata, margine tenuiora, serrata, persistentia.

STAM. *Filamenta* sex, subulata, germina prementia, apicibus patentiora, corolla dimidio breviora. *Antheræ* quadrangulæ.

PIST. *Germina* tria, erecta, oblonga, desinentia in *Stylos* vix manifestos. *Stigmatibus* simplicibus, patulis.

PER. *Capsulæ* tres, oblongæ, erectæ, compressæ, uniloculares, univalves, introrsum dehiscens.

SEM. plura, oblonga, altera extremitate obtusiora, compressa, membranacea.

* *Masculus flos* in eadem planta; infra femineos.

CAL. ut in masculo.

COR. ut in masculo.

STAM. ut in masculo.

PIST. rudimentum obsoletum, vanum.

Obs. *Affinitas summa cum Melanthio: non ausim tamen omnes Veratri species ad Melanthium referre, etsi de Veratro luteo dubium nullum supersit.*

750. MEDEOLA. *

CAL. nullus (*nisi corollam velis calycem*).

COR. *Petala sex, ovato-oblonga, æqualia, spætentia, revoluta.*

STAM. *Filamenta sex, subulata, longitudine corollæ. Antheræ incumbentes.*

PIST. *Germina tria, corniculata, in Stylos desinentia. Stigmata recurva, crassiuscula.*

PER. *Bacca subrotunda, trifida, trilocularis.*

SEM. *solitaria, cordata.*

Obs. *In M. virginiana, quam a Clarissimo D. Gronovio habuimus, tantum quatuor petala observavimus.*

751. HELONIAS. †

CAL. nullus.

COR. *Petala sex, oblonga, æqualia, decidua.*

STAM. *Filamenta sex, subulata, corolla paulo longiora. Antheræ incumbentes.*

PIST. *Germen subrotundum, trigonum. Styli tres, breves, reflexi. Stigmata obtusa.*

PER. *Capsula subrotunda, trilocularis.*

SEM. *subrotunda.*

752. TRILLIUM. †

CAL. *Perianthium triphyllum, patens: foliolis ovatis, persistentibus.*

COR. *Petala tria, subovata, calyce paulo majora.*

STAM. *Filamenta sex, subulata, calyce breviora, erecta. Antheræ terminales, oblongæ, longitudine filamentorum.*

PIST. *Germen subrotundum. Styli filiformes, recurvi. Stigmata simplicia.*

PER. *Bacca subrotunda, triloeularis.*

SEM. *plura, subrotunda.*

753. TRIGLOCHIN. * *Juncago Tournef.*
142. *Mich.* 31.

CAL. *Perianthium* triphyllum: *foliolis* subrotundis, obtusis, concavis, deciduis.

COR. *Petala* tria, ovata, concava, obtusa, calyci similia.

STAM. *Filamenta* sex, brevissima. *Antheræ* totidem, corolla breviores.

PIST. *Germen* magnum. *styli* nulli. *Stigmata* tria vel duplo plura, reflexa, plumosa.

PER. *Capula* ovato-oblonga, obtusa; *loculi* tot quot stigmata, basi dehiscentibus, valvulis acutis.

SEM. solitaria, oblonga.

754. RUMEX. * *Lapathum & Acetosa. Tournef.* 287.

CAL. *Perianthium* triphyllum: *foliolis* obtusis, reflexis, persistentibus.

COR. *Petala* tria, ovata, calyce majora, eique similia, conniventia, persistentia.

STAM. *Filamenta* sex, capillaria, brevissima. *Antheræ* erectæ, didimæ.

PIST. *Germen* turbinato-triquetrum. *Styli* tres, capillares, reflexi, inter rimas petalorum conniventium exserti. *Stigmata* magna, laciniata.

PER. nullum. *Corolla* connivens, triquetra, includens semen.

SEM. unicum, triquetrum.

OBS. R. digynus unicum tertiam partem numeri excludit in omnibus partibus fructificationis, exceptis staminibus.

Acetosa in Dioecia mares & feminas seorsim exhibent.

R. spinosus in Monoecia, flores utriusque sexus, cum perianthiis femineis uncinatis.

R. alpinus est polygamus.

In quibusdam speciebus granum callosum valvulis Petalorum externe adnascitur.

755. SCHEVCHZERIA. *Fl. Lapp.* X. 1.

CAL. *Perianthium* sexpartitum: *foliolis* oblongis, acutis, reflexo-patentibus, rudibus, persistentibus.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* sex, capillaria, brevissima, flaccida. *Antheræ* erectæ, obtusæ, longissimæ, compressæ.

PIST. *Germina* tria, ovata, compressa, magnitudine calycis. *Styli* nulli. *Stigmata* oblonga, superne obtusa, extrosum germini adnata.

PER. *Capsula* tot quot germina, subrotundæ, compressæ, induræ, reflexo-distantes, bivalves.

SEM. solitaria, oblonga.

OBS. *Numerus germinis & capsularum variat a tribus ad sex, naturalissimus est ternarius.*

756. DIOSCOREA. * *Plum. gen.* 26.

* *Mas.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum, sex-partitum: *laciniis* lanceolatis. superne patentibus.

COR. nulla: nisi Calycem velis.

STAM. *Filamenta* sex, capillaria, brevissima. *Antheræ* simplices.

* *Femina.*

CAL. *Perianthium* ut in mare.

COR. nulla.

PIST. *Germen* minimum, trigonum. *Styli* tres, simplices. *Stigmata* simplicia.

PER. *Capsula* magna, triangularis, trilocularis, trivalvis.

SEM. bina, compressa, margine membranaceo magno cincta.

757. SMILAX. * *Tournef.* 421.

* *Mas.*

CAL. *Perianthium* hexaphyllum, campanulato-patens: *foliolis* oblongis, basi approximatis, apice reflexis, patulis.

COR. nulla: nisi Calycem sumas.

STAM. *Filamenta* sex, simplicia. *Antheræ* oblongæ.

* *Femina.*

CAL. ut in mare, deciduus.

COR. nulla.

PIST. *Germen* ovatum. *Styli* tres, minimi. *Stigmata* oblonga, reflexa, pubescentia.

PER. *Bacca* globosa, trilocularis.

SEM. bina, globosa.

758. WURMBEA. *Thunb. diff. nov. gen. p.*
18.

CAL. monophyllus, tubulosus, sexangulatus, glaber, semi-sexpartitus: *laciniis* lanceolatis, acutis, erectis, patentibus.

COR. nulla.

PIST. *Germen* superum, triquetrum, sulcatum, glabrum. *Styli* tres, triquetri, subulati, longitudine staminum. *Stigmata* obtusa.

PER. *Capsula* oblonga, triquetra, trifulca, glabra, trilocularis, a medio tripartita e stylis tribus coalita.

SEM. rotunda, plurima.

OBS. *Melanthio adfinis*, & fors *Wurmbea capensis cum Melanthio monopetalo una eademque planta?* Vide *Dahl. diff. l. c.*

759. RAJANIA. † *Jan-Raja Plum. 29.*

* *Mas*

CAL. *Perianthium* sexpartitum, campanulatum: *foliolis* oblongis, acuminatis, superne patentioribus.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* sex, setacea, calyce breviora. *Anthera* simplices.

* *Femina.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, sexpartitum, campanulatum, germi*ni* insidens, persistens, marcescens.

COR. nulla.

PIST. *Germen inferum*, compressum, latere altero margine prominente auctum. *Styli* tres, longitudine calycis. *Stigmata* obtusa.

PER. *Fructus* subrotundus, auctus *ala* maxima, obtusa, ab uno latere affixa, at inflexa ut totum fructum fere ambiat.

SEM. solitaria, subrotunda.

760. FLAGELLARIA.

CAL. *Perianthium* hexaphyllum, æquale: *foliolis* ovatis, persistentibus: exterioribus acutioribus.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* sex, filiformia, longitudine fere calycis. *Anthera* oblongæ.

PIST. *Germen* ovatum, minimum. *Stylus* longitudine staminum, trifidus. *Stigmata* simplicia, planiuscula, persistentia.

PER. *Drupa* (*Bacca Syst. Veg.* 286.) subrotunda, unilocularis, coronata flore.

SEM. *Nucleus* subrotundus.

IV. TETRAGYNIA.

761. PETIVERIA. * *Plum.* 39.

CAL. *Perianthium* tetraphyllum: *foliolis* linearibus, obtusis, æqualibus, erectis, persistentibus.

COR. nulla (*nisi Calyx coloratus*).

STAM. *Filamenta* sex, subulata, erecta, æqualia, longitudine calycis. *Anthera* simplices.

PIST. *Germen* compressum, oblongum. *Styli* quatuor, subulati, in linea recta positi. *Stigmata* obtusa, persistentia.

PER. nullum, nisi *Crustam seminis* velis.

SEM. unicum, oblongum; inferne angustius, teretiusculum; superne latius, compressum, emarginatum; *Stylis* extrorsum reflexis, rigidis, acutis, intermediis longioribus.

OBS. P. octandra *flaminibus VIII. differt.*

V. POLYGYNIA.

762. ARISTOLOCHIA. * *Tournef.* 71.

CAL. nullus.

COR. monopetala, tubulosa, irregularis: *basis* ventricosa, subglobosa, torulosa: *Tubus* oblongus, hexagono-cylindræus. *Limbus* dilatatus, inferne extensus in linguam longam.

STAM. *Filamenta* nulla. *Anthera* sex, subtus stigmatibus adnatæ, quadriloculares.

PIST. *Germen* oblongum, inferum, angulatum. *Stylus* vix ullus. *Stigma* subglobosum, sexpartitum, concavam.

PER. *Capsula magna, sexangularis, sexlocularis.*

SEM. *plura, depressa, incumbentia.*

OBS. *Fructus figura variat, aliis subrotundus; aliis longus.*

763. ALISMA. * *Damasonium Tournef. 132.*
Vaill. A. G. 1716.

CAL. *Perianthium triphyllum: foliolis ovatis, concavis, persistentibus.*

COR. *Petala tria, subrotunda, magna, plana, patentissima.*

STAM. *Filamenta sex, subulata, corolla breviora. Antheræ subrotundæ.*

PIST. *Germina plura quam quinque. Styli simplices. Stigmata obtusa.*

PER. *Capsula compressa.*

SEM. *solitaria, parva.*

OBS. *Damasonium (3) Tournef. capsulis sex, acuminatis, magnis, distinctum fuit.*

Alisma Dill. vero capsulis numerosis, obtusis, parvis.

A. parnassifolia semina aristata habet.

764. MAURITIA. *Suppl. p. 70.*

* *Masculi flores in amento oblongo, sessili, undique testis floribus arcte approximatis, squamis obtusis inter singulos flores.*

CAL. *Perianthium monophyllum, cyathiforme, truncatum, integrum, triquetrum, breve.*

COR. *monopetala.*

Tubus brevis, longitudine calycis, futuris tribus, per quas laciniae limbi facile ad basin dividuntur.

Limbus tripartitus.

Laciniae æquales, patentiusculæ, lanceolatæ, canaliculatæ, rigidæ, quasi lignæ, obtusæ.

STAM. *Filamenta sex, faucibus inserta, brevissima, crassa.*

Antheræ lineares, angulatæ, longitudine petalorum.

Alteræ inter lacinias limbi extensæ, horizontales.

Alteræ tres erectæ, canaliculo laciniarum adpressæ.

OBS. *Palma incerti ordinis, quam ideo ob defectum characterum in sine subnecto.*

Classis VII.

HEPTANDRIA.

I. MONOGYNIA

765. Guettarda.
 766. Trientalis.
 777. Disandra.

768. Aesculus.
 769. Petrocarya.

II. DIGYNIA.

770. Limeum.

III. TETRAGYNIA.

771. Saururus.

IV. HEPTAGYNIA.

772. Septas.

HEPTANDRIA.

I. MONOGYNIA.

765. GUETTARDA. † Halefia. Brown.

CAL. *Perianthium* monophyllum, cylindraceum, brevissimum, integerrimum, margine exteriori magis prominulo, deciduum.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* cylindricus, longus. *Limbus* septemfidus: lobis rotundatis, tubo brevioribus.

STAM. *Filamenta* septem, in fauce corollæ. *Anthera* lineares.

PIST. *Stylus* filiformis.

* *Feminei* flores in eadem planta.

CAL. *ut in Masculo.*

COR. *ut in Masculo.*

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis, staminibus longior. *Stigma* subovatum.

PER. *Drupa* sicca, subrotunda, depressa, torosa.

SEM. unicum.

766. TRIENTALIS. *

CAL. *Perianthium* heptaphyllum: *foliolis* lanceolatis, acuminatis, patentibus, persistentibus.

COR. stellata, plana, monopetala, æqualis, septem-partita, basi lævissime cohærens: *laciniis* ovato-lanceolatis.

STAM. *Filamenta* septem, capillaria, unguibus corollæ inserta, patula, longitudine calycis. *Anthera* simplices.

PIST. *Germen* globosum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* capitatum.

PER. *Bacca* capsularis, exsucca, globosa, unilocularis, crusta tenuissima, futuris variis dehiscens.

SEM. nonnulla, angulata. *Receptaculum* maximum, excavatum pro feminibus.

Obs. *Numerus vulgarissimus est septenarius in hac planta, licet interdum variet.*

Fruc-

Fructus est Bacca sicca, non dehiscens per valvulas, uti Capsula.

767. **DISANDRA.** *Suppl. p. 32.*

CAL. *Perianthium heptaphyllum, campanulatum, superne patens, corolla longe minus, persistens.*

COR. *monopetala, rotata. Tubus brevissimus. Limbus septempartitus. Laciniae ovatae.*

STAM. *Filamenta septem, capillaria, erecta, corolla breviora. Antherae cordatae.*

PIST. *Germen ovatum, superum. Stylus filiformis, longitudine staminum. Stigma simplex.*

PER. *Capsula ovata, bilocularis, longitudine calycis.*

SEM. *plurima, subrotunda.*

OBS. *Magnam cum Sibthorpia habet affinitatem. Flos numero maxime variat.*

768. **ÆSCULUS.** * *Hippocastanum Tournef. 382. Pavia Boerh. 260.*

CAL. *Perianthium monophyllum, ventricosum, parvum, quinquedentatum.*

COR. *Petala quinque, subrotunda, margine plicato undulata, plana, patentia, unguibus angustis calyci insertis, inæqualiter colorata.*

STAM. *Filamenta septem, subulata, longitudine corollae, declinata. Antherae assurgentes.*

PIST. *Germen subrotundum, desinens in Stylum subulatum. Stigma acuminatum.*

PER. *Capsula coriacea, subrotunda, trilocularis, trivalvis.*

SEM. *bina, subglobosa.*

OBS. *Semen communiter in capsula unicum occurrit; inspectis autem embryonibus, numerum naturalem binarium esse constat.*

In hoc genere Flores hermaphroditos & masculos observant van Royen & Millerus.

In Æ. Pavia corolla tetrapetala est & clausa.

769. **PETROCARYA.** *Schreb. Parinari Aublet. 204.*

CAL. *Perianthium monophyllum, turbinatum, quinquefidum: laciniae ovatis, acutis, rigidis, patentibus,*

(duabus superioribus erectioribus?) Foliola duo, oblonga, concava, ad basin perianthii.

COR. *Petala* quinque, ovata, acuta, inæqualia, calyce minora, eique inter lacinias inserta.

STAM. *Filamenta* quatuordecim, capillaria, calyce longiora, ejusque ori infra petala inserta; quorum septem antherifera, septem in opposita (superiore?) calycis parte, sterilia. *Anthera* subrotundæ, introrsum dehiscentes.

PIST. *Germen* ovatum, villosum. *Stylus* cylindraceus, incurvus, villosus, staminibus longior. *Stigma* capitatum.

PER. *Drupa* magna, ovata, compressa, carnosio-fibrosa, unilocularis.

SEM. *Nux* ovata, compressa, longitudinaliter sinuoso-rugosa, tuberculata, putamine crasso, durissimo quasi lapideo, biloculari. Nuclei oblongi.

II. DIGYNIA.

770 LIMEUM. †

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: *foliolis* ovatis, acuminatis, carinatis, margine membranaceis: exterioribus duobus; persistens.

COR. *Petala* quinque, æqualia, ovata, subunguiculata, obtusa, calyce breviora.

Nectarium: margo cingens germen, proferens stamina.

STAM. *Filamenta* septem, subulata, corolla breviora. *Anthera* ovata.

PIST. *Germen* globosum. *Stylus* bipartitus, cylindricus, staminibus brevior. *Stigmata* obtusiuscula.

PER. *Capsula* bilocularis, globosa.

SEM. plura.

III. TETRAGYNIA.

771. SAURURUS. *

CAL. *Amentum* oblongum, tectum flosculis.

Perianthium proprium monophyllum, oblongum, laterale, coloratum, persistens.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* septem, capillaria, longa. *Antheræ* oblongæ, erectæ.

PIST. *Germina* quatuor, ovata, acuminata. *Stylus* nullus. *Stigmata* oblonga, apici interiori germinis adnata.

PIST. *Baccæ* quatuor, ovatæ, uniloculares.

SEM. unicum, ovatum.

IV. HEPTAGYNIA.

772. SEPTAS. †

CAL. *Perianthium* septempartitum, patens, acutum, persistens.


COR. *Petala* septem, oblonga, æqualia, calyce duplo longiora.

STAM. *Filamenta* septem, subulata, longitudine calycis. *Antheræ* subovata, erectæ.

PIST. *Germina* septem, oblonga, desinentia in *Stylis* subulatis, longitudine staminum. *Stigmata* obtusiuscula.

PER. *Capsulæ* septem, oblongæ, acutæ, parallelæ, univalves.

SEM. plurima.



Classis VIII.

OCTANDRIA.

I. MONOGYNIA.

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 773. <i>Mimusops.</i> | 796. <i>Hypelate.</i> |
| 774. <i>Michauxia.</i> | 797. <i>Melicocca.</i> |
| 775. <i>Acer.</i> | 798. <i>Melicope.</i> |
| 776. <i>Tropæolum.</i> | 799. <i>Amyris.</i> |
| 777. <i>Bæckea.</i> | 800. <i>Trigonis.</i> |
| 778. <i>Memecylon.</i> | 801. <i>Diospyrös.</i> |
| 779. <i>Combretum.</i> | 802. <i>Fuchsia.</i> |
| 780. <i>Ophira.</i> | 803. <i>Chlora.</i> |
| 781. <i>Epilobium.</i> | 804. <i>Vaccinium.</i> |
| 782. <i>Gaura.</i> | 805. <i>Erica.</i> |
| 783. <i>Oenothera.</i> | 806. <i>Cedrota.</i> |
| 784. <i>Rhexia.</i> | 807. <i>Athenæa.</i> |
| 785. <i>Osbeckia.</i> | 808. <i>Gnidia.</i> |
| 786. <i>Grislea.</i> | 809. <i>Lachnæa.</i> |
| 787. <i>Hedwigia.</i> | 810. <i>Dirca.</i> |
| 788. <i>Elaphrium.</i> | 811. <i>Daphne.</i> |
| 789. <i>Antichorus.</i> | 812. <i>Passerina.</i> |
| 790. <i>Cupania.</i> | 813. <i>Stellera.</i> |
| 791. <i>Allophylus.</i> | 814. <i>Skinnera.</i> |
| 792. <i>Ephielis.</i> | 815. <i>Dodonæa.</i> |
| 793. <i>Sambolifera.</i> | 816. <i>Valentinia.</i> |
| 794. <i>Lawsonia.</i> | 817. <i>Scopolia.</i> |
| 795. <i>Ximenia.</i> | 818. <i>Populus.</i> |

II. DIGYNIA.

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 819. <i>Weinmannia.</i> | 822. <i>Schmidelia.</i> |
| 820. <i>Mæhringia.</i> | 823. <i>Galenia.</i> |
| 821. <i>Codia.</i> | 824. <i>Corylus.</i> |

III. TRIGYNIA.

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 825. <i>Paullinia.</i> | 828. <i>Ponæa.</i> |
| 826. <i>Cardiospermum.</i> | 829. <i>Coccoloba.</i> |
| 827. <i>Sapindus.</i> | 830. <i>Polygonum.</i> |

IV. TETRAGYNIA.

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 831. <i>Adoxa.</i> | 835. <i>Margaritaria.</i> |
| 832. <i>Elatine.</i> | 836. <i>Rhodiola.</i> |
| 833. <i>Paris.</i> | 837. <i>Myriophyllum.</i> |
| 834. <i>Haloragis.</i> | |

OCTANDRIA.

I. MONOGYNIA.

773. MIMUSOPS. †.

CAL. *Perianthium* octophyllum, coriaceum: *foliis* duplici serie, ovatis, acutis, persistentibus.

COR. *Petala* octo, lanceolata, patentia, longitudine calycis.

STAM. *Filamenta* octo, subulata, pilosa, brevissima. *Antheræ* oblongæ, erectæ, longitudine calycis.

PIST. *Germen* superum, rotundum, hispidum. *Stylus* cylindræus, longitudine corollæ. *Stigma* simplex.

PER. *Drupa* ovalis, acuminata.

SEM. unum s. duo, ovalia.

OBS. *Petala sedecim adesse in Mant. 1. p. 140. docet Autor: at in Syst. veget. p. 360. ita definit genus, ut ei calycem tribuat tetraphyllum, petala quatuor, & Nectarium 16phyllum.*

774. MICHAUXIA. L. Heritier.

CAL. *Perianthium* monophyllum, sexdecimpartitum: *laciniis* inæqualibus, lanceolatis, alternis retroverfis.

COR. monopetala, rotata, octopartita, calyce major: *laciniis* lineari lanceolatis, patentissimis apice revolutis.

Nectarium octovalve, staminiferum, receptaculo insertum.

STAM. *Filamenta* octo, subulata, persistentia. *Antheræ* lineares, longissimæ, biloculares, stylo adpressæ.

PISTILL. *Germen* inferum, turbinatum. *Stylus* columnaris, persistens. *Stigma* octopartitum: *laciniis* subulatis, revolutis.

PERICARP. *Capfala* turbinata, truncata, evalvis, octolocularis: *loculis* rhomboidibus.

SEM. numerosissima, parva, oblonga, receptaculis inserta.

775. ACER. * Tournef. 386.

* *Hermaphroditi.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquefidum, acutum, coloratum, basi plana & integra, persistens.

COR. *Petala* quinque, ovata, extrorsum latiora, obtusa, calyce vix majora, patentia.

STAM. *Filamenta* octo, subulata, brevia. *Antheræ* simplices. *Pollen* cruciforme.

PIST. *Germen* compressum, immersum *Receptaculo* convexo, perforato, magno. *Stylus* filiformis, per dies altior excrescens. *Stigmata* duo, acuminata, tenuia, reflexa.

PER. *Capsulæ* numero stigmatum (2. f. 3.), basi coalitæ, subrotundæ, compressæ, ala membranacea maxima singulæ terminatæ.

SEM. solitaria, subrotunda.

* *Masculi Flores.*

CAL. ut in Hermaphrodito.

COR. ut in Hermaphrodito.

STAM. ut in Hermaphrodito.

PIST. *Germen* nullum. *Stylus* nullus. *Stigma* bifidum.

OBS. *Ad primam explicationem floris Stigma modo apparet, deinde aliquot post dies Stylus.*

A. Pseudo-Platano Corolla vix a calyce distincta, & Stamina longa. A. rubrum dioicum est.

Flores, in eadem umbella Hermaphroditi, sæpe duplicis generis: inferiores Hermaphroditi feminei, quorum antheræ non debiscunt, sed pistillum mox in fructum excrescit; superiores Hermaphroditi masculi, quorum anthera pollen plerumque, pistilla vero non accrescunt, sed decidunt.

776. TROPÆOLUM. * Cardaminum. Tournef. 244.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquefidum, erectopatulum, acutum, coloratum, deciduum: *laciniis* duabus inferioribus angustioribus; postice cornutum *Nectario* subulato, recto, longiore.

COR. *Petala* quinque, subrotunda, calycis divisuris inserta: duo superiora sessilia; reliqua inferiora unguibus oblongis ciliatis.

STAM. *Filamenta* octo, subulata, brevia, declinata, inæqualia *Antheræ* erectæ, oblongæ, quadriloculares, assurgentes.

PIST. *Germen* subrotundum, trilobum, striatum. *Stylus* simplex, erectus, longitudine staminum. *Stigma* trifidum, acutum.

PER. *Bacca* solidiusculæ, tres, hinc convexæ fulcato-striatæ, inde angulatæ.

SEM. tria, hinc gibba, inde angulata, subrotunda, fulcato-striata.

777. BÆCKEA. †

CAL. *Perianthium* monophyllum, infundibuliforme, quinquedentatum, persistens.

COR. *Petala* quinque, subrotunda, patula, calyci inserta.

STAM. *Filamenta* octo; quorum sex paria, duo solitaria, brevissima, inflexa. *Antheræ* subovatae, parvæ.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis, corollæ brevior. *Stigma* capitatum.

PER. *Capsula* globosa, coronata, quadrilocularis, quadrivalvis.

SEM. nonnulla, subrotunda, altero latere angulata.

778. MEMECYLON.

CAL. *Perianthium* indivisum, superum, campanulatum, turbinatum, integerrimum: fundo urceolari striato; persistens.

COR. *Petala* quatuor, ovata, acuta, patentia.

STAM. *Filamenta* octo, erecta, apice dilatata truncata. *Antheræ* simplices, lateribus apicis filamenti insertæ.

PIST. *Germen* turbinatum, inferum. *Stylus* subulatus. *Stigma* simplex.

PER. *Bacca* coronata calyce cylindrico.

SEM. . . .

779. COMBRETUM. † *Læfl. it.* 308. 248.

CAL. *Perianthium* monophyllum, superum, campanulatum, quadridentatum, deciduum.

COR. *Petala* quatuor, ovata, acuta, calyci inserta, vix calyce longiora.

STAM. *Filamenta* octo, setacea, erecta, longissima. *Antheræ* suboblongæ.

PIST. *Germen* inferum, lineare. *Stylus* setaceus, longitudine staminum. *Stigma* acutum.

PER. nullam, nisi crusta feminis.

SEM. unicum, tetragonum: angulis membranaceis; acuminatum.

780. OPHIRA. a Jo. Burmanno.

CAL. Involucrum bivalve, triflorum: valvulis lateralibus, reniformibus, emarginatis, conduplicatis, persistentibus.

COR. tetrapetala, supera: Petala oblonga, conniventia.

STAM. Filamenta octo, longitudine corollæ. Anthera ovata.

PIST. Germen inferum, turbinatum, hispidum. Stylus filiformis, staminibus brevior. Stigma emarginatum.

PER. Bacca unilocularis.

SEM. duo.

781. EPILOBIUM. * Chamænerion Tournef.

157.

CAL. Perianthium tetraphyllum, superum: foliolis oblongis, acuminatis, deciduis.

COR. Petala quatuor, subrotunda, extrorsum latiora, emarginata, patentia.

STAM. Filamenta octo, subulata: alterna breviora. Antheræ ovales, compressæ, obtusæ.

PIST. Germen cylindraceum, longissimum, inferum. Stylus filiformis. Stigma quadrifidum, crassum, obtusum, revolutum.

PER. Capsula longissima, cylindracea, striata, quadrilocularis, quadrivalvis.

SEM. numerosa, oblonga, pappo coronata. Receptaculum longissimum, tetragonum, liberum, flexile, coloratum.

Obs. In aliis stamina ♂ pistillum erecta, in aliis declinata ad latus inferius.

782. GAURA. *

CAL. Perianthium monophyllum, superum, deciduum: Tubus cylindricus, longus, basi crassior, continens Glandulas quatuor, oblongas, adnatas; Limbus quadrifidus: laciniis oblongis, acutis, reflexis.

COR. *Petala* quatuor, oblonga, adscendentia versus latus superius, æqualia, unguibus angustis, calycis tubo imposita.

STAM. *Filamenta* octo, filiformia, superne latiora, recta, corolla breviora: *Glandula* nectarifera conica intra basin singuli. *Antheræ* oblongæ, versatiles.

PIST. *Germen* oblongum, inferum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigmata* quatuor, teretia, ovata, patentia.

PER. *Drupa* ovata, tetragona, angulis compressis.

SEM. *Nux* monosperma, oblonga, angulata.

783. OENOTHERA. * *Onagra* Tournef. 156.

CAL. *Perianthium* monophyllum, superum, deciduum; *Tubus* cylindraceus, erectus, longus, deciduus. *Limbus* quadrifidus: *laciniis* oblongis, acutis, deflexis.

COR. *Petala* quatuor, obcordata, plana, divisaris calycis inserta, longitudine laciniarum calycis.

STAM. *Filamenta* octo, subulata, incurva, calycis faucibus inserta, corolla breviora: *Antheræ* oblongæ, incumbentes.

PIST. *Germen* cylindraceum, inferum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* quadrifidum, crassum, obtusum, reflexum.

PER. *Capsula* cylindrica, tetragona, quadrilocularis, quadrivalvis.

SEM. plurima, angulata, nuda. *Receptaculum* columnare, liberum, tetragonum.

784. RHEXIA. † *Gronov.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, inferne ventricosum, oblongum. *Limbo* quadrifido, persistens.

COR. *Petala* quatuor, subrotunda, calyci inserta, patentia.

STAM. *Filamenta* octo, filiformia, calyce longiora, calyci inserta. *Antheræ* declinatæ, fulcatæ, lineares, obusæ, versatiles.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* simplex, longitudine staminum, declinatus. *Stigma* crassiusculum, oblongum.

PER. *Capsula* subrotunda, quadrilocularis, quadrivalvis, intra ventrem calycis.

SEM. numerosa, subrotunda.

785. OSBECKIA. †.

CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum, persistens: *Limbo* quadripartito, deciduo: *Lobis* oblongis, acutis; *Squamula* ciliata lobis singulis interjecta.

COR. *Petala* quatuor, subrotunda, sessilia, calyce longiora.

STAM. *Filamenta* octo, filiformia, brevissima. *Antheræ* oblongæ, erectæ, terminatæ rostro filiformi longitudine ipsius antheræ.

PIST. *Germen* ovatum, inferne calyci adnatum, superne terminatum squamis quatuor, ciliatis. *Stylus* subulatus, longitudine staminum. *Stigma* simplex.

PER. *Capsula* vestita calycis tubo truncato, subovata, quadrilocularis, loculis apice longitudinaliter dehiscentibus.

SEM. plurima, subrotunda. *Receptacula* lunata.

786. GRISLEA. †.

CAL. *Perianthium* monophyllum, subulatum, subcampanulatum, erectum, quadridentatum, coloratum, persistens.

COR. *Petala* quatuor, ovata, ex incisuris calycis, omnium minutissima.

STAM. *Filamenta* octo, subulata, erecta, longa, adscendentia. *Antheræ* simplices, erectæ, subrotundæ.

PIST. *Germen* superum, globosum, pedicellatum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* simplex.

PER. *Capsula* globosa, calyce brevior, unilocularis.

SEM. plurima, subrotunda, minima. *Receptaculum* magnum.

OBS. Interdum $\frac{1}{4}$ pars additur floribus partibus.

787. HEDWIGIA. Swartz. prodr.

Calyx 4-dentatus.

Corolla. 4-fida.

Stylus nullus.

Capsula tricoeca.

Sem. nux.

788. ELAPHRIUM. *Jacq. amer.* 105.

CAL. *Perianthium* quadripartitum, deciduum : *foliis lanceolatis, acutis, erectis.*

COR. *Petala* quatuor, ovata, plana, acuta, patula, calyce paulo longiora.

STAM. *Filamenta* octo, subulata, erecta, alterna longiora, calycem non superantia. *Antheræ* oblongæ, obtusæ.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* brevis, erectus. *Stigma* bifidum, acutum.

PER. *Capsula* subglobosa, sulco longitudinali notata, glabra, unilocularis, bivalvis : *valvulis* coriaceis, erassis, succo balsamico scatentibus.

SEM. unicum, subrotundum, compressum, osseum, margine superiori acuto, inferiori obtuso, basi & lateribus pulpa molli vestitum.

789. ANTICHORUS.

CAL. *Perianthium* tetraphyllum, patentissimum : *foliis lanceolatis, acuminatis, deciduis.*

COR. *Petala* quatuor, obovata, obtusa, longitudine calycis.

STAM. *Filamenta* octo, fetacea, erecta, corolla breviora. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* superum, ovatum. *Stylus* cylindricus, longitudine staminum. *Stigma* obtusum.

PER. *Capsula* subulata, quadrilocularis, quadrivalvis.

SEM. plurima, truncata, quadrifariam superimposita.

OBS. Affinitas *Corchori*.

790. CUPANIA. *Swartz prodr.*

Calyx 5 - phyllus.

COR. 5 - petala.

Petala apice cuculata.

Stylus trifidus.

Capsula 3 - locularis.

SEM. solitaria.

791. ALLOPHYLUS. †

CAL. *Perianthium* tetraphyllum ; *foliis* orbiculatis : *exterioribus* duobus oppositis duplo minoribus.

COR. *Petala* quatuor, orbiculata, æqualia, calyce minora: *unguibus* latis, longitudine foliorum minorum calycis.

STAM. *Filamenta* octo, filiformia, longitudine corollæ. *Anthera* subrotundæ.

PIST. *Germen* superum, subrotundum, didymum. *Stylus* filiformis, staminibus longior. *Stigma* bifidum: *laciniis* revolutis.

PER. - - -

SEM. - - -

OBS. *Stylus* bifidus, stigma quadrifidum esse. *Syst. Veg.* p. 360.

792. EPHIELIS Schreb. *Mataiba Aubl.* 123.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum, patens: *laciniis* subrotundis, acutis.

COR. *Petala* quinque, unguiculata, subrotunda, patentia, emarginata cum acumine, longitudine calycis. *Nectarium Squamulæ* decem, binæ singulo petalo ad basin adnatæ, subrotundæ, villosæ, petalis minores.

STAM. *Filamenta* octo, setacea, corolla longiora, glandulæ inserta. *Anthera* tetragono- subrotundæ.

PIST. *Germen* ovatum, glandula cinctum. *Stylus* nullus. *Stigma* obtusum.

PER. *Capsula* oblonga, compressa, utrinque sulcata, unilocularis, bivalvis.

SEM. duo, reniformia, alteri valvulæ in medio unum supra alterum adnata.

793. JAMBOLIFERA. †

CAL. *Perianthium* quadridentatum, brevissimum, persistens.

COR. *Petala* quatuor, lineari-lanceolata, medietate superiore extrorsum flexa.

STAM. *Filamenta* octo, planiuscula, subulata, a medio extrorsum flexa; longitudine corollæ. *Anthera* ovales, incumbentes.

PIST. *Germen* ovale, superne hirsutum. *Stylus* filiformis, staminibus brevior. *Stigma* simplex.

PER. - - - -

SEM. - - - -

OBS. *Myrto adfinis.*794. LAWSONIA. † Henna *Ludw.* 143.CAL. *Perianthium* quadrifidum, parvum, persistens.COR. *Petala* quatuor, ovato-lanceolata, plana, patentia.STAM. *Filamenta* octo, filiformia, longitudine corollæ, per paria binatim intra petala. *Antheræ* subrotundæ.PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* simplex, longitudine staminum, persistens. *Stigma* capitatum.PER. *Capsula* globosa cum acumine, quadrilocularis.

SEM. multa, angulata, acuminata.

795. XIMENIA. *Plum.* 21. *Jacq. amer.* 106.CAL. *Perianthium* monophyllum, quadrifidum, acuminatum, minimum, persistens.COR. *Petala* quatuor, oblonga, interne pilosa, inferne erecta in tubum, superne revoluta.STAM. *Filamenta* octo, erecta, brevissima. *Antheræ* lineares, erectæ, obtusæ, longitudine corollæ.PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* obtusum.PER. *Drupa* subovata.SEM. *Nux* subrotunda.796. HYPELATE *Swartz* prodr.

CALIX 5-phyllus.

COR. 5-petala.

Stigma deflexum, trigonum.*Drupa* monosperma.797. MELIHOCCA. *Brown.* *Jacq. amer.* 103.CAL. *Perianthium* quadripartitum: *foliolis* ovatis, concavis, obtusis, patentibus.COR. *Petala* quatuor, oblonga, æqualia, inter calycis foliola tota reflexa.STAM. *Filamenta* octo, subulata, erecta, brevissima. *Antheræ* oblongæ, erectæ.

PIST. *Germen* ovatum, longitudine fere corollæ. *Stylus* brevissimus. *Stigma* magnum, subpeltatum, utrinque in latus productum, obliquum.

PER. *Drupa* corticosa, subrotunda, obtuse acuminata.

SEM. *Nux* coriacea, subrotunda, glabra.

798. MELICOPE. *Forst. charact. gen.* 28.

CAL. *Perianthium* inferum, campanulatum, quadripartitum: *laciniis* rotundatis.

COR. *Petala* quatuor, ovata, acuminata, patentia.

Nectarium germinis basi adnatum, octofidum, laciniis crenatis.

STAM. *Filamenta* octo, subulata. *Antheræ* erectæ, subrotundæ.

PIST. *Germen* ovatum, apice quadrilobum. *stylus* subquadrangulus, brevis. *Stigma* crassiusculum.

PER. — *Germen* tetraspermum.

SEM. an *Bacca*?

799. AMYRIS. † *Brown. Jacq. amer.* 107.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quadridentatum, acutum, erectum, parvum, persistens.

COR. *Petala* quatuor, oblonga, concava, patentia

STAM. *Filamenta* octo, subulata, erecta. *Antheræ* oblongæ, erectæ, longitudine corollæ.

PIST. *Germen* superum, ovatum. *Stylus* crassiusculus, longitudine staminum. *Stigma* tetragonum.

PER. *Bacca* drupacea, subrotunda.

SEM. *Nux* globosa, nitida.

OBS. A. Protium in quibusdam fructificationis partibus a congeneribus differt.

800. TRIGONIS. *Jacq. amer.* 102.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: *foliolis* oblongis, concavis, obtusis, erectis.

COR. *Petala* quinque, triangularia, basi acuminata, plana, erecta, interne hirsuta, longitudine calycis, apice villosa.

STAM. *Filamenta* octo, subulata, erecta, basi hirsuta, petalis duplo longiora. *Anthera* oblonga, incumbentes.

PIST. *Germen* ovatum, hirsutum, superum. *Stylus* nullus. *Stigma* simplex, obtusum.

PER. — —

SEM. — —

801. DIOSPYROS.* *Guaiacana Tournef.* 371.

* *Hermaphroditus* femineus.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quadrifidum, magnum, obtusum, persistens.

COR. monopetala, urceolata, major, quadrifida: laciniis acutis, patentibus.

STAM. *Filamenta* octo, setacea, brevissima, receptaculo ferme inserta. *Anthera* oblonga, effœta.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* unicus, semiquadrifidus, persistens, staminibus longior. *Stigmata* obtusa, bifida.

PER. *Bacca* globosa, magna, octolocularis, calyci maximo patenti insidens.

SEM. solitaria, subrotunda, compressa, durissima.

* *Mar* in distincta planta.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quadrifidum, acutum, erectum, parvum.

COR. monopetala, urceolata, coriacea, tetragona, quadrifida: laciniis subrotundis, revolutis.

STAM. *Filamenta* octo, brevissima, receptaculo inserta. *Anthera* geminae, longae, acutae: interiores breviores.

PIST. *Germinis* rudimentum.

OBS. D. virginiana *Stamina* Maris 16, quorum 8 inferiora.

802. FUCHSIA. *Plum.* 14.

CAL. nullus. *Margo* integer, superus.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* clavatus. *Limbus* octofidus, planus: laciniis acuminatis, alternis inferioribus.

STAM. *Filamenta* octo, longitudine tubi. *Anthera* didyma, subrotunda.

PIST.

PIST. *Germen* ovatum, inferum. *Stylus* simplex, longitudine staminum. *Stigma* obtusum.

PER. *Bacca* subrotunda, quadrisulca, quadrilocularis.

SEM. plura, ovata, ordine duplici posita.

OBS. Plumier in *Genevibus* stamina 4, in *historia* vero saepius 8 pingit; numerum itaque determinant autoptæ.

803. CHLORA. *Adans.* *Blakstonia.* *Huds.*
angl. 146.

CAL. *Perianthium* octophyllum: *foliis* linearibus, patulis, persistentibus.

COR. monopetala, hypocrateriformis. *Tubus* calyce brevior, *germen* vestiens. *Limbus* octopartitus: *laciniis* lanceolatis, tubo longioribus

STAM. *Filamenta* octo, brevissima, fauci insidentia. *Antheræ* lineares, erectæ, laciniis breviores.

PIST. *Germen* ovato-oblongum. *Stylus* filiformis, longitudine tubi. *Stigmata* quatuor, oblonga, cylindrica.

PER. *Capsula* ovato-oblonga, unilocularis, compressuscula, bisulca, bivalvis: *valvulis* latere incurvatis.

SEM. numerosa, minuta.

OBS. Affinitas *Gentianæ*.

C. dodecandra floribus duodecimfidis, *dodecandris* differt.

C. imperfoliatæ corollæ sexfidæ.

804. VACCINIUM. * *Vitis idæa* *Tournef.*
377. *Oxycoccus* *Tournef.* 431.

CAL. *Perianthium* minimum, superum, persistens.

COR. monopetala, campanulata, quadrisida: *laciniis* revolutis.

STAM. *Filamenta* octo, simplicia, receptaculo inserta. *Antheræ* bicornes, dorso aristis duabus patentibus instructæ, apice dehiscentes

PIST. *Germen* inferum. *Stylus* simplex, staminibus longior. *Stigma* obtusum.

PER. *Bacca* globosa, umbilicata, quadrilocularis.

SEM. pauca, parva.

OBS. Numerus laepe addit unicam quartam partem in omni parte fructificationis.

*Calyx in pluribus quadrifidus, in Myrtillo integerrimus.
Corolla recens fere integra revolvitur ad basin in Oxy-
cocco.*

805. ERICA. * *Tournef. 373. a.*

CAL. *Perianthium tetraphyllum : foliolis ovatis, erectis, coloratis, persistentibus.*

COR. *monopetala, campanulata, quadrifida, saepe ventricosa.*

STAM. *Filamenta octo, capillaria, receptaculo inserta. Anthera apice bifida.*

PIST. *Germen subrotundum. Stylus filiformis, rectus, staminibus longior. Stigma coronulatum, tetragonum, quadrifidum.*

PER. *Capfula subrotunda, calyce minor, testâ, quadrilocularis, quadrivalvis.*

SEM. *numerosa, minima.*

OBS. *Perianthium omnibus tetraphyllum, licet ob bracteas quandoque coloratas videatur polyphyllum. Laciniæ autem persistentes sive corolla breviores, sive æquales, sive longiores : lanceolata vel ovata : obtusa vel acuta : adpressa vel patentes vel reflexa : integra vel ciliata : nuda vel pilosa, vel tomentosa : virides colorata.*

806. CEDROTA *Schreb. Aniba Aubl. 126.*

CAL. *Perianthium monophyllum, sexpartitum : laciniis ovatis, obtusis, concavis.*

COR. *nulla.*

STAM. *Filamenta octo, brevia. Anthera subrotunda.*

PIST. *Germen subrotundum, glandula cinctum. Stylus brevis. Stigma obtusum.*

PER. . . .

SEM. . . .

807. ATHENÆA *Schreb. Iroucana Aubl. 129.*

CAL. *Perianthium monophyllum, coloratum, quinquepartitum : laciniis oblongis, acutis, erectis, apice patulis.*

COR. *nulla.*

STAM. *Filamenta* octo, filiformia, erecta; quorum quinque longitudine calycis, tria alterna paulo breviora. *Anthere* sagittatæ. *Setæ* octo, plumosæ, filamentis breviores, unâ cum staminibus glandulæ, germen cingenti, adnatæ.

PIST. *Germen* ovatum, superum, basi glandulæ annulari cinctum. *Stylus* setaceus, staminibus longior. *Stigma* depressum, quinquepartitum.

PER. *Capsula* globosa, unilocularis, trivalvis: *valvulis* subcarnosis.

SEM. tria, ad quinque, rotundata, membrana pulposa colorata obvoluta, affixa *Receptaculo* in fundo capsulæ.

808. GNIDIA. † *Struthia* Roy.

CAL. *Perianthium* monophyllum, infundibuliforme, coloratum: *Tubo* filiformi, longissimo: *Limbo* quadripartito, plano.

COR. *Petala* quatuor, sessilia, plana, calyce breviora, eique inserta.

STAM. *Filamenta* octo, setacea, erecta, longitudine ferme floris. *Anthere* simplices.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, germinis lateri insertus, longitudine staminum. *Stigma* capitatum, hispidum.

PER. nullum. *Fructus* in fundo calycis.

SEM. unicum, ovatum, oblique acutum.

OBS. *Hinc differt sola Corolla a Passerina*

OBS. *Stamina quatuor in compluribus intra tubum latent, reliqua quatuor ultra eundem exseruntur.*

G. daphnæfoliæ flores quinquesidi, & stamina decem.

809. LACHNÆA. † *Roy.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, persistens: *Tubo* longo, tenui: *Limbo* quadripartito inæquali: *lacinia* summa erecta, minima; *Laciniis* reliquis tribus reflexis: intermedia majore.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* octo, setacea, erecta, longitudine ferme floris. *Anthere* simplices.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, germinis lateri insertus, longitudine staminum. *Stigma* capitatum, hispidum.

PER. nullum. *Fruſtus* in fundo calycis.

SEM. unicum, ovatum, oblique acutum.

OBS. *Differt a Paſſerina tantum calyce inæquali.*

810. DIRCA. †

CAL. nullus.

COR. monopetala, clavata. *Tubus* ſuperne ventricofior. *Limbus* obſoletus, margine inæquali.

STAM. *Filamenta* octo, capillaria, tubo medio inſerta, corolla longiora. *Anthera* ſubrotundæ, erectæ.

PIST. *Germen* ovatum: apice obliquo. *Stylus* filiformis, ſtaminibus longior, apice curvus. *Stigma* ſimplex.

PER. *Bacca* unilocularis.

SEM. unicum.

811. DAPHNE. * *Thymelæa Tournef.* 366.

CAL. nullus.

COR. monopetala, infundibuliformis, marceſcens, ſtamina includens. *Tubus* cylindraceus, imperforatus, limbo longior. *Limbus* quadrifidus; *laciniis* ovatis, acutis, planis, patentibus.

STAM. *Filamenta* octo, brevia, tubo inſerta: *alterna* inferiora. *Anthera* ſubrotundæ, erectæ, biloculares.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* breviffimus. *Stigma* capitatum, depreſſo-planum.

PER. *Bacca* ſubrotunda, unilocularis.

SEM. unicum, ſubrotundum, carnoſum.

812. PASSERINA. †

CAL. nullus.

COR. monopetala, marceſcens: *Tubus* cylindraceus, tenuis, infra medium ventricofus. *Limbus* quadrifidus, patens: *laciniis* concavis, ovatis, obtuſis.

STAM. *Filamenta* octo, ſetacea, longitudine limbi, apici tubi impoſita. *Anthera* ſubovata, erectæ.

PIST. *Germen* ovatum, intra tubum corollæ. *Stylus* filiformis, e latere apicis ipſius germinis enatus, longitudine tubi corollæ. *Stigma* capitatum, undique villis hiſpidum.

PER. coriaceum, ovatum, uniloculare.

SEM. unicum, ovatum, utrinque acuminatum, apicibus obliquis.

Obs. *P. capitata* floribus absque tubo staminibusque sedecim, quorum 8 interiora castrata sunt, differt.

P. uniflora octo habet stamina præter antherarum 8 rudimenta in fundo floris latentia.

P. Gnidia, *P. pilosa* & *P. prostrata* floribus gaudent diandris.

813. STELLERA. † Gmelin. Chamæjasme. Amm.

CAL. nullus.

COR. monopetala, infundibuliformis, persistens: *Tubus* filiformis, longus. *Limbus* quadri- (quinque)-fidus: lobis ovatis.

STAM. *Filamenta* octo (decem), brevissima. *Antheræ* oblongæ, alternæ in tubi medio, alternæ intra faucem.

PIST. *Germen* subovatum. *Stylus* brevissimus, persistens. *Stigma* capitatum.

PER. nullum.

SEM. unicum, nitidum, rostratum.

Obs. *S. Passerina octandra*, Chamæjasme decandra est.

814. SKINNERA. Forst. charact. gen. 29.

CAL. *Perianthium* monophyllum, infundibuliforme, coloratum. *Tubus* basi callosus, supra basin coarctatus, subincurvus, inde sensim ampliatus, patulus. *Limbus* quadripartitus: *laciniis* lanceolatis, horizontalibus, tubo dimidio brevioribus.

COR. nulla.

Nectaria quatuor, ovato-lanceolata, erecta, laciniis calycis interjecta, iis triplo minora.

PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis, erectus calyce longior. *Stigma* globosum, tuberculatum.

PER. *Capsula* oblonga, infera, quadrilocularis, polysperma.

SEM. plurima, ovata.

815. DODONÆA. † Gen. plant. 1. n. 855. Jacq. amer. 109.

CAL. *Perianthium* tetraphyllum, planum: foliolis ovatis, obtusis, concavis, deciduis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* octo, brevissima. *Antheræ* oblongæ, arcuatae, conniventes, longitudine calycis.

PIST. *Germen* triquetrum, longitudine calycis. *Stylus* cylindricus, trifidus, erectus. *Stigma* subtrifidum, acutiusculum.

PER. *Capsula* trifida, inflata, trilobata: angulis membranaceis, magnis.

SEM. bina, subrotunda.

OBS. Genus distinctum suadet *autoptæ* Jacquin, Browne, alii.

816. VALENTINIA. Swartz. prodr.

CAL. 5-partitus, coloratus, patens.

COR. nulla.

Capsula baccata, 1-locularis, 4-sperma.

817. SCOPOLIA. Suppl. p. 60.

CAL. *Perianthium commune* diphyllum, multiflorum. *Folia* æqualia, oblonga, obtusa, concava, nervosa, glabra.

Perianthium proprium nullum.

FLOR. plures, parvi, villosi, sessiles.

COR. infundibuliformis, quadrifida, villosa, infera. *Dentes* subæquales, obtusiusculi.

STAM. *Filamenta* quatuor, apice germinis in circulo insidentia, erecta, brevissima, filiformia.

Antheræ in his filamentis quatuor, conniventes in columnam, cui insidet alia columna quatuor antherarum filamentis destitutarum, angulata.

PIST. *Germen* superum, erectum, glabrum, terminatum setis filamentis intermixtis. *Stylus* nullus. *Stigma* breve, acutum.

PER. —

SEM. —

818. POPULUS. * Tournef. 365.

* *Mar.*

CAL. *Apertum commune* oblongum, laxè imbricatum, cylindraceum, constans.

Squamis unisporis, oblongis, planis, margine laceris.

COR. *Petala* nulla.

Nectarium monophyllum, inferne turbinatum, tubulatum, superne oblique in ovatum limbum terminatum.

STAM. Filamenta octo, omnium brevissima. *Anthere* tetragonæ, magnæ.

* *Femina*.

CAL. Amentum ut in mare.

Squama ut in mare.

COR. Petala nulla.

Nectaria ut in mare.

PIST. Germen ovato-acuminatum. *Stylus* vix manifestus. *Stigma* quadrisidum.

PER. Capsula ovata, bilocularis, bivalvis: valvulis reflexis.

SEM. numerosa, ovata, Pappo capillari volatilia.

Obs. Nectarium nunc pro Corolla sumit Ill. Autor Syst. Veg. p. 839.

II. DIGYNIA.

819. WEINMANNIA. *Windmannia Brown.*
p. 212.

CAL. Perianthium tetraphyllum: foliolis ovatis, patulis.

COR. Petala quatuor, æqualia, calyce majora.

STAM. Filamenta octo, erecta, brevia. *Anthere* subrotundæ

PIST. Germen subrotundum. *Styli* duo, longitudine staminum. *Stigmata* acuta.

PER. Capsula ovata, bilocularis, birostrata.

SEM. octo circiter, subrotunda.

820. MOEHRINGIA. *

CAL. Perianthium tetraphyllum: foliolis lanceolatis, patentibus, persistentibus.

COR. Petala quatuor, ovata, indivisa, patentia, calyce breviora.

STAM. Filamenta octo, capillaria. *Anthere* simplices.

PIST. Germen globosum. *Styli* duo, erecti, longitudine staminum. *Stigmata* simplices.

PER. Capsula subglobosa, bilocularis, quadrivalvis.

SEM. plurima, subrotunda, hinc convexa, inde angulata.

821. CODIA. *Forst. charact. gen. 30. Suppl. p. 33.*

CAL. *communis* capituli tetraphyllus, foliolis horizontalibus, oblongis.

Perianthium proprium, tetraphyllum, foliolis ellipticis, erectis.

COR. *Petala* quatuor, tenuissima, linearia, unguibus filiformibus.

STAM. *Filamenta* octo, calyce duplo longiora. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* parvum, villosum, superum, tetraspermum. *Styli* duo, subulati, longitudine staminum. *Stigmata* simplicia.

PER. —

SEM. —

822. SCHMIDELIA.

CAL. *Perianthium* diphyllum: *foliolis* subrotundis, coloratis, corolla majoribus.

COR. *Petala* quatuor, subrotunda, sessilia.

STAM. *Filamenta* octo, simplicia, longitudine floris. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germina* duo, pedicellata, compressa, flore longiora. *Styli* simplices, breves. *Stigmata* simplicia.

PER. duo, pedicellata. - - -

SEM. solitaria?

823. GALENIA. * *Sherardia Pont. epist. 14.*

CAL. *Perianthium* minimum, quadrifidum, concavum: *laciniis* oblongis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* octo, capillaria, longitudine vix calycis. *Antheræ* didymæ.

PIST. *Germen* subrotundum. *Styli* duo, simplices, reflexi. *Stigmata* simplicia.

PER. *Capula* subrotunda, bilocularis.

SEM. duo, oblonga, angulata.

824. CORYLUS. * *Tournef.* 347. *Malp.* 220.
221. 224.

* *Masculi Flores* in Amentum longum digesti.

CAL. *Amentum commune* undique imbricatum, cylindraceum, constans.

Squamis unifloris, basi angustioribus, apice latioribus, obtusioribus, inflexis, trifidis: *lacinula media* longitudine cum reliquis æquali, duplo vero latiore, reliquasque tegente.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* octo, brevissima, lateri interiori squamæ calycinæ adnexa. *Anthere* ovato-oblongæ, calyce breviores, erectæ.

* *Feminei Flores* remoti a masculis, in eadem planta sessiles, gemma inclusi.

CAL. *Perianthium* diphyllum, coriaceum, margine lacertatum, erectum, longitudine fructus, sub florescentia præ parvitate vix manifestum.

COR. nulla.

PIST. *Germen* subrotundum, minimum. *Styli* duo, fetacei, calyce multo longiores, colorati. *Stigmata* simplicia.

SEM. *Nux* ovata, basi derafa, apice parum compressa, parum acuminata.

QBS. *Affinitate summa* jungitur Carpino.

III. TRIGYNIA.

825. PAULLINIA. *Jacq. amer.* 110. *Seriana*
Plum. 35. *Cururu Plum.* 35.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: *foliolis* ovatis, concavis, patentibus, persistentibus: duobus exterioribus oppositis, interiorum unico majore.

COR. *Petala* quatuor, obovata, oblonga, calyce duplo majora, unguiculata: duobus magis distantibus.

Nestaria duo, altero tetrapetalo unguibus corollæ inserto: altero Glandulis quatuor adbases petalorum.

STAM. *Filamenta* octo, simplicia, brevia. *Anthere* parvæ.

PIST. *Germen* turbinatum, triquetrum, obtusum. *Styli* tres, filiformes, brevès. *Stigmata* simplicia, patentia.

PER. *Capsula magna, triquetra, trilocularis, trivalvis.*

SEM. *solitaria, subovata.*

Oss. *Seriana Pl. Capsula ad basin gerit semina.*

Cururu Pl. vero Capsula ad apicem fert semina.

826. CARDIOSPERMUM. * *Corindum Tournef. 246. Vesicaria Riv. IV. 144.*

CAL. *Perianthium tetraphyllum: foliis obtusis, concavis: alternis interioribus magnitudine corollæ, persistentibus.*

COR. *Petala quatuor, obtusa, cum calycis foliolis majoribus alterna.*

Nectarium tetrapetalum, coloratum, germen includens: foliolis petalo innatis obtusis, duobus in labium erectum, apice callosis, latere uncinatis; reliquis in L. clausum lateribus æqualibus.

STAM. *Filamenta octo, subulata, nectario æqualia. Anthera parva.*

PIST. *Germen triquetrum. Styli tres, breves. Stigmata simplicia.*

PER. *Capsula subrotunda, triloba, inflata, trilocularis, apice dehiscens.*

SEM. *solitaria, globosa, basi cicatrice cordata notata.*

827. SAPINDUS. † *Tournef. 440.*

CAL. *Perianthium tetraphyllum, patens: foliis subovatis, subæqualibus, planis, patentibus, coloratis, deciduis duobus horum exterioribus.*

COR. *Petala quatuor, ovata, unguiculata: duobus magis approximatis.*

Nectarium foliolis quatuor, oblongis, concavis, erectis, petalorum basi insertis. Glandulæ quatuor subrotundæ, basi petalorum insertæ.

STAM. *Filamenta octo, longitudine floris. Anthera cordatæ, erectæ.*

PIST. *Germen triangulare. Styli tres, breves. Stigmata simplicia, obtusa.*

PER. *Capsulæ tres, carnosæ, globosæ, connatæ, inflatæ.*

SEM. *Nux globosa.*

OBS. *Rare perveniunt omnes tres Capsulæ ad maturitatem: communi iter due abortiunt, utante Houstonio. Videtur affinis Paullinæ & Cardiospermo.*

828. *PONÆA*. Schreb. *Toulicia*. Aubl. *guian.*
140.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum: laciniis subrotundis, concavis, patentibus.

COR. *Petala* quatuor, lanceolata, acuta, apice glandulis aliquot piliferis, calyce majora, glandulæ germen cingenti adnata.

STAM. *Filamenta* octo, capillaria, glandulæ germen cingenti inserta: alterna (petalis opposita) majora, longitudine corollæ. *Anthera* ovata.

PIST. *Germen* pedicellatum? longum, triquetrum, glandulæ depressæ insidens. *Styli* tres, breves. *Stigmata* acuta.

PER. *Capsula* trilocularis, trialata, singulis alis bivalvibus.

SEM. solitaria.

829. *COCCOLOBA*. Brown. 14. f. 3. Jacq.
amer. III.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum: laciniis oblongis, obtusis, concavis, patentissimis, coloratis, persistentibus.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* octo, subulata, patula, calyce breviora. *Anthera* subrotundæ, didymæ.

PIST. *Germen* ovatum, trigonum. *Styli* tres, breves, filiformes, patentes. *Stigmata* simplicia.

PER. nullum. *Calyx* baccatus, incrassatus, connivens, semen involvens.

SEM. *Nux* ovata, acuta, unilocularis.

830. *POLYGONUM*. * *Tournef.* 290. *Bistorta*.
Tournef. 291. *Perficaria*. *Tournef.* 290.
Fagopyrum. *Tournef.* 290. *Helxine* edit.
prior.

CAL. *Perianthium* turbinatum, interne coloratum, quinquepartitum; laciniis ovatis, obtusis, persistentibus.

COR., nulla (nisi *Calycem* velis.)

STAM. *Filamenta* sæpius octo; subulata, brevissima. *Antheræ* subrotundæ, incumbentes.

PIST. *Germen* triquetrum. *Styli* sæpius tres, filiformes, brevissimi. *Stigmata* simplicia.

PER. nullum. *Calyx* semen involvens.

SEM. unicum, triquetrum, acutum.

OBS. *Stamina* in nonnullis sex, aliis septem, aliis quinque.

Pistillum in quibusdam bifidum.

P. frutescens calyce diphylo, petalis tribus gaudet.

IV. TETRAGYNIA.

831. ADOXA. * Moschatellina Tournef. 68.

CAL. *Perianthium* inferum, bifidum, planum, persistens.

COR. monopetala, plana, quadrifida: *laciniis* ovatis, acutis, calyce longioribus.

STAM. *Filamenta* octo, subulata, longitudine calycis. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* infra receptaculum corollæ. *Styli* quatuor, simplices, erecti, longitudine staminum, persistentes. *Stigmata* simplicia.

PER. *Bacca* globosa, inter calycem & corollam, calyce cum bacca inferne coalito, umbilicata, quadrilocularis.

SEM. solitaria, compressa.

OBS. *Talis est fructificatio terminalis*; laterales vero omnes addunt unicam quintam partem numeri.

832. ELATINE. * Potamopithys Buxb. A.

P. Alsinastrum Vaill. B. P. 1. f. 6.

CAL. *Perianthium* tetraphyllum: *foliis* subrotundis, planis, magnitudine corollæ, persistentibus.

COR. *Petala* quatuor, ovata, obtusa, sessilia, patentia.

STAM. *Filamenta* octo, longitudine corollæ. *Antheræ* simplices.

PIST. *Germen* orbiculatum, globoso-depressum, magnum.

Styli quatuor, erecti, paralleli, longitudine staminum.

Stigmata simplicia.

PER. *Capsula* orbiculata, globofo-depressa, magna, quadrilocularis, quadrivalvis.

SEM. plura, lunulata, erecta, rotatim receptaculum cingentia.

833. PARIS. * *Herba Paris Tournef.* 177.

CAL. *Perianthium* tetraphyllum, persistens: *foliis* lanceolatis, acutis, corollæ magnitudine, patentibus.

COR. *Petala* quatuor, patentia, subulata, calyci similia, persistentia.

STAM. *Filamenta* octo, subulata, infra antheras breviter. *Anthera* longæ, medio filamentorum utrinque adnatæ.

PIST. *Germen* rotundo-tetragonum. *Styli* quatuor, patentes, staminibus breviores. *Stigmata* simplicia, tetragona, quadrilocularis.

PER. *Bacca* globofo-tetragona, quadrilocularis.

SEM. plura, gemino ordine incumbentia.

834. Haloragis. *Suppl. p.* 34. *Forst. charact. gen. n.* 31.

CAL. *Perianthium* superum, quadrifidum, germiui adnatum, persistens.

COR. *Petala* quatuor, ovata, erecta, concava. *Ungues* acuti, parvi.

STAM. *Filamenta* octo, filiformia. *Anthera* longæ, quadrifidæ.

PIST. *Germen* inferum, glabrum. *Styli* quatuor, brevissimi. *Stigmata* subquadrangularia, truncata, papulosa.

PER. *Drupa*, sicca, globosa, calyce persistente coronata.

SEM. *Nux* ossea, quadrilocularis. *Nuclei* solitarii, minuti.

835. MARGARITARIA. *Suppl. p.* 66.

* *Masculi* copiosiores in distincto individuo.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quadridentatum, minutum persistens.

COR. *Petala* quatuor, subrotunda, calyci inserta.

STAM. *Filamenta* octo, setacea, patula, longiora receptaculo inserta. *Anthera* subrotundæ, parvæ.

PIST. *Germe*n superum, subrotundum. *Stylus* setaceus, longitudine staminum. *Stigma* obtusum.

* *Feminei* in distincto individuo.

CAL. ut in mare, persistens.

COR. ut in mare?

PIST. *Germe*n globosum, superum. *Styli* quatuor s. quinque, filiformes. *Stigmata* simplicia, persistentia.

PER. *Bacca* globosa: *Stylis* patulis, brevibus.

SEM. *Arillus* tetra- s. pentacoccus, quadri- s. quinquelocularis, cartilagineus, nitidissimus. *Coccae* globosae, bivalves.

Semina ovata, intus compressa.

OBS. *Calyx* semper quadrifidus. *Styli* & *Arilli* quatuor s. quinque.

836. RHODIOLA. *

* *Mas*.

CAL. *Perianthium* quadripartitum, concavum, erectum, obtusum, persistens.

COR. *Petala* quatuor, oblonga, obtusa, erecto-patentia, calyce duplo longiora, decidua.

Nectararia quatuor, erecta, emarginata, calyce breviora.

STAM. *Filamenta* octo, subulata, corolla longiora. *Antherae* simplices.

PIST. *Germina* quatuor, oblonga, acuminata. *Styli* & *Stigmata* obsoleta.

PER. abortiens.

SEM.

* *Femina*.

CAL. *Perianthium* ut in mare.

COR. *Petala* quatuor, rudia, erecta, obtusa, cum calyce aequalia, persistentia.

Nectararia ut in mare.

PIST. *Germina* quatuor, oblonga, acuminata, in *Stylis* simplices, rectos desinentia. *Stigmata* obtusa.

PER. *Capsula* quatuor, corniculata, introrsum dehiscens.

SEM. plurima, subrotunda.

OBS. *Plantis* femineis in *Syst. Veg.* 389. *petala* denegantur, licet quatuor obscura adsint.

837. MYRIOPHYLLUM. * *Vaill. A. G. 1719.*
t. 2. f. 3. Pentapterophyllum Dill. gen. 7.

* *Masculi Flores.*

CAL. *Perianthium* tetraphyllum: *folioli* oblongis, erectis: horum *extimum* maius, *intimum* minus.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* octo, capillaria, calyce longiora, flaccida. *Antheræ* oblongæ.

* *Feminei Flores* infra masculos.

CAL. *Perianthium* ut in mare.

COR. nulla.

PIST. *Germina* quatuor, oblonga. *Styli* nulli. *Stigmata* pubescentia.

PER. nullum.

SEM. quatuor, oblonga, nuda.

Obs. M. verticillatum sæpe floribus hermaphroditis est.

ENNEANDRIA.

I. MONOGYNIA.

838. *Tinus.*839. *Anacardium.*840. *Quercus.*841. *Laurus.*842. *Cassia.*

II. DIGYNIA.

443. *Mercurialis.*

III. TETRAGYNIA.

844. *Rheum.*

IV. HEPTAGYNIA.

845. *Butomus.*846. *Hydrocharis.*847. *Areca.*

ENNEANDRIA.

I. MONOGYNIA.

838. TINUS. Volkameria, *Brown. t. 21. f. 1.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquefidum, campanulatum, erectum.

COR. monopetala, quinquefida, obtusa.

Nectarium urceolatum, subovatum, concavum, ore perforatum, centrum receptaculi occupans.

STAM. *Filamenta* novem brevia. *Antheræ* cordatæ.

PIST. *Germen* globosum, infra nectarium. *Stylus* simplex, brevis. *Stigmata* tria, obtusa.

PER. *Bacca* subrotunda, trilocularis.

SEM. solitaria, oblonga.

OBS. *Nectarium* more *Winteranae*.

839. ANACARDIUM. Acejou. *Tournef. 435.*

CAL. quinquepartitus: laciniis ovatis, acuminatis, erectis, deciduis.

COR. *Petala* quinque, lanceolato-linearia, acuta, calyce duplo longiora, reflexa, inferne erecta.

STAM. *Filamenta* decem, capillaria, erecta, calyce breviora, horum unicum castratum, longius. *Anthera* parvæ, subrotundæ.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* subulatus, inflexus, longitudine corollæ. *Stigma* obliquum.

PER. nullum. *Receptaculum* carnosum, maximum, obovatum.

SEM. *Nux* reniformis, magna, ad apicem receptaculi posita.

CL. ROTTBOELL (*Coll. soc. med. Haun. 2. p. 252.*) characterem generis ex novis speciminibus sequenti modo illustratum sistit:

Planta polygama dioica.

* *Hermaphroditus* flos.

CAL. *Perianthium* 5-phyllum: foliolis ovatis, concavis, erectis, coloratis, subvillosis.

COR. *Petala* 5 lanceolata, acuta, &c. ut in charactere Linnæi.

STAM. *Filamenta* 8 ad 10, ad basin connexa; horum unum reliquis crassius, atque $\frac{1}{2}$ parte longius, lobo grandiori germinis respondens; cui *Anthera* triquetra, magna, fertilis, decidua; cæteris *antheræ* minores, effoetæ, persistentes, figura prioris.

PIST. *Germen* obliquum, reniforme, lobo altero majore superius posito. *Stylus* unicus e sinu germinis, subulatus, corollæ æqualis. *Stigma* parvum, subrotundum, depressum, concavum.

RECEPT. & FRUCTUS ut in Linnæo.

* *Masculis flos* in diversa planta.

CALYX, COROLLA, STAMINA, ut in hermaphroditis. PISTILLUM. *Germen* o vel abortiens. R.

840. QUERCUS. * Tournef. 394. Ilex Tournef. 350. Suber Tournef.

* *Masculi Flores* in Amentum laxum digesti.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquefidum s. quadrifidum; *laciniis* acutis, sæpe bifidis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* plura (5. 8. 10.), brevissima. *Anthera* magnæ, didymæ.

* *Feminei* in gemma sessiles, in eadem planta cum masculis.

CAL. *Perianthium* monophyllum, coriaceum, hemisphæricum, scabrum, integerrimum, in flore vix manifestum.

COR. nulla.

PIST. *Germen* ovatum, minimum. *Stylus* simplex, bi-quinquefidus, calyce longior. *Stigmata* simplicia, persistentia.

PER. nullum.

SEM. *Nux* ovalis, *Crusta* coriacea univalvi, basi detarsa, affixa brevi calyci, teres, glabra.

Obs. *Quercus* T. *folia sinuosa* habet.

Ilex T. *folia dentato-serrata*.

Suber. T. *cortice fungoso lavi vestitum*.

Variat. in diversis Filamentorum atque Pistillorum numerus. Classe hinc atque ordine incertis, nonnisi auctoritate Clar. Thunbergii Enneandriæ inserui.

841. LAURUS. * *Tournef.* 367. *Jacq. amer.*
 117. *Cinnamomum Herm. H. L. B.*
 656. *Burm. zeyl.* 28 : 1. *Camphora*
Gronov. Diff. Persea Plum. 20. *Borbo-*
nia Plum. 2. *Benzoë Boerh. Sassafras*
Off.

CAL. nullus (*nisi corollam calycem dicas.*)

COR. Petala sex, ovata, acuminata, concava, erecta :
alt-erna exteriora.

Nectarium constans tuberculis tribus, acuminatis, co-
 loratis, in duas setas desinentibus, germen circum-
 stantibus.

STAM. Filamenta novem, corolla breviora, compressa,
 obtusa, terna in singulo ordine. *Antheræ* margini
 filamentorum superne utrinque adnatæ

Glandulæ duæ, globosæ, petiolo brevissimo, singulo
 filamento intimi ordinis prope basin affixæ.

PIST. *Germen* subovatum. *Stylus simplex*, æqualis, lon-
 gitudine staminum. *Stigma* obtusum, obliquum.

PER. *Drupa* ovalis, acuminata, unilocularis, corolla
 comprehensa.

SEM. *Nux* ovato-acuminata. *Nucleus* ejusdem formæ.

Obs. *Maxima specierum pars una cum Cinnamomo & Cam-*
phora hermaphrodita est: in nonnullis tamen Mares seor-
sim in dioecia prodeunt, ut in L. nobili, ubi etiam sæ-
pius stamina octo ad quatuordecim, cui Corollæ quadripar-
tita, nudæ.

Corpuscula filamentis quibusdam adnexa, essentialem præ-
 bent characterem.

L. *Borboniæ* calyx triphyllus, petala tria, stamina, qui-
 dem novem sed cum decimi rudimento.

In L. *Sassafras*. *Mares* pentapetali, *oëandri: herm-*
aphrodita hexandra.

842. CASSYTA. † *Osbeck. Jacq. amer.* 115

CAL. *Perianthium* triphyllum, minimum, persistens : fo-
 liolis semiovatis, acutis, concavis, erectis.

COR. Petala tria, subrotunda, acuta, concava, persi-
 stentia.

Nectarium Glandulis tribus, oblongis, truncatis, coloratis, longitudine germinis, germi circumstantibus.

STAM. *Filamenta* novem, erecta, compressa. *Glandulae* binæ, globosæ, filamentis singulis tribus interioribus lateribus baseos insidentes. *Antherae* adnatæ filamentis infra apicem.

PIST. *Germen* ovatum, intra corollam calycemque. *Stylus* crassiusculus, longitudine staminum. *Stigma* obsolete trifidum, obtusum.

PER. *Receptaculum* excretum in Drupam depresso-globosam, calyce corollaque conniventibus coronatam, umbilico perforatam.

SEM. *Nux* globosa, staminibus conniventibus acuminata.

OBS. *Calyce* neglecto corolla evadit sexpartita, calycina. *Syst. veget.* pag. 384.

II. DIGYNIA.

843. MERCURIALIS. * *Tournef.* 308.

CAL. *Perianthium* tripartitum: laciniis ovato-lanceolatis, concavis, patentibus.

COR. nulla: nisi Calycem velis.

STAM. *Filamenta* novem vel duodecim, capillaria, recta, longitudine calycis. *Antherae* globosæ, didymæ.

* *Femina.*

CAL. *Perianthium* ut in mare.

COR. nulla.

Nectaria: Acumina duo, subulata, ad singulum latus germinis singula, sulco germinis impressa.

PIST. *Germen* subrotundum, compressum, latere utrinque sulco exaratum, hispidam. *Styli* duo, reflexi, cornuti, hispidi. *Stigmata* acuta, reflexa.

PER. *Capula* subrotunda, scrotiformis, didyma, bilocularis.

SEM. solitaria, subrotunda.

OBS. *M.* ambigua *monoica* est.

III. TRIGYNIA.

844. RHEUM. * *Rhabarbarum.* *Tournef.* 18.

CAL. nullus.

COR. monopetala, basi angustata, impervia, limbo sex-
fida; laciniis obtusis, *alternis* minoribus, marcescens.
STAM. *Filamenta* novem, capillaria, corolla inserta,
ejusdemque longitudinis. *Antheræ* didymæ, oblongæ,
obusæ.

PIST. *Germen* breve, triquetrum. *Styli* vix ulli. *Stig-
mata* tria, reflexa, plumosa.

PER. nullum.

SEM. unicum, magnum, triquetrum, acutum, *marginibus* membranaceis.

IV. HEXAGYNIA.

845. BUTOMUS. * *Tournef.* 143.

CAL. *Involucrum* simplex, triphyllum, breve.

COR. *Petalæ* sex, subrotunda, concava, marcescentia:
alternis exterioribus minoribus, acutioribus.

STAM. *Filamenta* novem, subulata, quorum sex exte-
riora. *Antheræ* bilamellatæ.

PIST. *Germina* sex, oblonga, acuminata, in *Stylos* defi-
nientia. *Stigmata* simplicia.

PER. *Capfulæ* sex, oblongæ, sensim attenuatæ, erectæ,
univalves, introrsum dehiscentes.

SEM. plurima, oblongo-cylindracea, utrinque obtusa.

846. HYDROCHARIS. * *Stratiotes Dill. gen.*

9. *Morsus Ranae Tournef. A. G.* 1705.

t. 4. *Microleuconymphæa Bærh.* 232.

* *Mas.*

CAL. *Spatha* triflora, diphylla, oblonga.

Perianthium proprium, triphyllum: *foliolis* ovato-ob-
longis, concavis, margine membranaceis.

COR. *Petalæ* tria, subrotunda, plana, magna.

STAM. *Filamenta* novem, subulata, erecta, in tres or-
dines disposita, quorum intermedius ordo stipitem
subulatum e basi sua interiore, styli ad instar, exse-
rit, & in centro collocat. Duo reliqui ordines basi
connectuntur, ut internum & externum cohæreat fi-
lamentum, *Antheræ* simplices.

PIST. *Germinis* rudimentum in centro.

* *Femina.*

CAL. *Spatha* nulla, flores solitarii.

Peyanthium ut in mare, superum.

COR. ut in mare.

PIST. *Germen* subrotundum, inferum. *Styli* sex, longitudine calucis, compressi, bifido-canaliculati. *Stigmata* bifida, acuminata.

PER. *Capsula* coriacea, subrotunda, sexlocularis.

SEM. numerosa, minima, subrotunda.

847. ARECA.

* *Masculi Flores.*

CAL. *Spatha* bivalvis. *Spadix* ramosus.

COR. *Petala* tria, acuminata, rigida.

STAM. *Filamenta* novem, quorum tria exteriora longiora.

* *Feminei Flores* in eodem spadice.

CAL. *Spatha* communis cum masculis.

COR. *Petala* tria, acuminata, rigida.

PIST.

PER. *Drupa* subovata, fibrosa, calyce imbricato basi cincta.

SEM. ovatum.

Classis X.

DECANDRIA.

I. MONOGYNIA.

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 848. <i>Sophora.</i> | 877. <i>Zygophyllum.</i> |
| 849. <i>Anagyris.</i> | 878. <i>Quassia.</i> |
| 850. <i>Cercis.</i> | 879. <i>Thryallis.</i> |
| 851. <i>Myrospermum.</i> | 880. <i>Limonia.</i> |
| 852. <i>Bauhinia.</i> | 881. <i>Heisteria.</i> |
| 853. <i>Hymenæa.</i> | 882. <i>Quisqualis.</i> |
| 854. <i>Poinciana.</i> | 883. <i>Monotropa.</i> |
| 855. <i>Myroxylon.</i> | 884. <i>Clethra.</i> |
| 856. <i>Parkinsonia.</i> | 885. <i>Pyrola.</i> |
| 857. <i>Cæsalpina.</i> | 886. <i>Ledum.</i> |
| 858. <i>Toluisera.</i> | 887. <i>Dionæa.</i> |
| 859. <i>Nicandra.</i> | 888. <i>Murraya.</i> |
| 860. <i>Cassia.</i> | 889. <i>Petaloma.</i> |
| 861. <i>Guilandina.</i> | 890. <i>Chalcas.</i> |
| 862. <i>Distamnus.</i> | 891. <i>Melastoma.</i> |
| 863. <i>Rhodora.</i> | 892. <i>Jussieua.</i> |
| 864. <i>Cynometra.</i> | 893. <i>Codon.</i> |
| 865. <i>Crudia.</i> | 894. <i>Andromeda.</i> |
| 866. <i>Cyclas.</i> | 895. <i>Rhododendron.</i> |
| 867. <i>Schotia.</i> | 996. <i>Kalmia.</i> |
| 868. <i>Protopis.</i> | 897. <i>Epigæa.</i> |
| 869. <i>Adenantha.</i> | 998. <i>Gaultheria.</i> |
| 870. <i>Hæmatoxylum.</i> | 899. <i>Arbutus.</i> |
| 871. <i>Trichilia.</i> | 900. <i>Inocarpus.</i> |
| 872. <i>Ekebergia.</i> | 901. <i>Dais.</i> |
| 873. <i>Guajacum.</i> | 902. <i>Casearia.</i> |
| 874. <i>Ruta.</i> | 903. <i>Terminalia.</i> |
| 875. <i>Tribulus.</i> | 904. <i>Bucida.</i> |
| 876. <i>Fagonia.</i> | 905. <i>Copaifera.</i> |

II. DIGYNIA.

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 906. <i>Carpinus.</i> | 913. <i>Tiarella.</i> |
| 907. <i>Scleranthus.</i> | 914. <i>Mitella.</i> |
| 908. <i>Trianthema.</i> | 915. <i>Cunonia.</i> |
| 909. <i>Chrysosplenium.</i> | 916. <i>Gypsophila.</i> |
| 910. <i>Royena.</i> | 917. <i>Saponaria.</i> |
| 911. <i>Hydrangea.</i> | 918. <i>Dianthus.</i> |
| 912. <i>Saxifraga.</i> | |

III. TRIGYNIA.

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 919. <i>Arenaria.</i> | 924. <i>Deutzia.</i> |
| 920. <i>Stellaria.</i> | 925. <i>Garidella.</i> |
| 921. <i>Cucubalus.</i> | 926. <i>Schinus.</i> |
| 922. <i>Silene.</i> | 927. <i>Hiræa.</i> |
| 923. <i>Cherleria.</i> | |

IV. PENTAGYNIA.

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 928. <i>Cotyledon.</i> | 937. <i>Lychnis.</i> |
| 929. <i>Sedum.</i> | 938. <i>Oxalis.</i> |
| 930. <i>Penthorum.</i> | 939. <i>Joncquetia.</i> |
| 931. <i>Bergia.</i> | 940. <i>Spondias.</i> |
| 932. <i>Spergula.</i> | 941. <i>Robergia.</i> |
| 933. <i>Cerastium.</i> | 942. <i>Suriana.</i> |
| 934. <i>Agrostemma.</i> | 943. <i>Forskoehlea.</i> |
| 935. <i>Kiggelaria.</i> | 944. <i>Coriaria.</i> |
| 936. <i>Carica.</i> | |

V. DECAGYNIA.

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 945. <i>Neurada.</i> | 946. <i>Phytolacca.</i> |
|----------------------|-------------------------|

DECANDRIA.

I. MONOGYNIA.

848. SOPHORA. *

CAL. *Perianthium* monophyllum, breve, campanulatum, basi superne gibbum: ore quinquedentato, obliquo, obtuso.

COR. papilionacea, pentapetala.

Vexillum oblongum, sensim latius, rectum, lateribus reflexis.

Ala duæ, oblongæ, basi appendiculatæ, longitudine vexilli.

Carina dipetala: petalis alis conformibus, marginibus inferioribus approximatis, navicularibus.

STAM. *Filamenta* decem, distincta, parallela, subulata, longitudine corollæ, intra carinam recondita. *Anthera* minimæ, assurgentes.

PIST. *Germen* oblongum, teres. *Stylus* magnitudine & situ staminum. *Stigma* obtusum.

PER. *Legumen* longissimum, tenue, uniloculare, ad femina nodosum.

SEM. plurima, subrotunda.

OBS. *In omnibus cum Papilionaceis & Diadelphis convenit, præterquam quod Filamentis distinctis & separatis gaudeat.*

849. ANAGYRIS. Tournef. 647.

CAL. *Perianthium* campanulatum: ore quinquedentato; supremo pale profundius diviso.

COR. papilionacea.

Vexillum obcordatum, rectum, emarginatum, reliquis latius, calyce duplo longius.

Ala ovato-oblongæ, planæ, vexillo longiores.

Carina tecta, longissima.

STAM. *Filamenta* decem, parallela, distincta, assurgentia. *Anthera* simplices.

PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* simplex, assurgens. *Stigma* villosum.

PER. *Legumen* oblongum, magnum, teretiusculum, parum reflexum, obtusum.

SEM. sex vel plura, reniformia.

ORS. *Essentia* consistit in *Vexillo* brevissimo, recto; *Carinz* longissima.

850. CERCIS. * *Siliquastrum* Tournef. 414.

CAL. *Perianthium* monophyllum, brevissimum, campanulatum, inferne gibbum, melliferum: ore quinque-dentato, erecto, obtuso.

COR. pentapetala, calyci inserta, corollam papilionaceam mentiens.

Alæ: Petala duo, sursum flexa, unguibus longis affixa.

Vexillum: Petalum unicam, subrotundum, unguiculatum sub alis, quibus brevius.

Carina: Petala duo, conniventia in cordatam figuram, includentia genitalia, unguibus affixa.

Nectarium glandula styliformis, sub germine.

STAM. *Filamenta* decem, distincta, subulata, declinata, quorum quatuor longiora, testata. *Antherae* oblongae, incumbentes, assurgentes.

PIST. *Germen* lineari-lanceolatum, pedicellatum. *Stylus* longitudine & situ staminum. *Sigma* obtusum, assurgens.

PER. *Legumen* oblongum, oblique acuminatum, uniloculare.

SEM. nonnulla, subrotunda, futurae superiori annexa.

851. MYROSPERMUM. Jacq. amer. 120.

CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum, patens, marcescens: limbo levissime quinque-dentato, superne introsum protruso.

COR. papilionacea, pentapetala, caduca.

Vexillum subrotundum, obtuse emarginatum, superne concavum, patentissimum, ungue brevissimo, latoque.

Alæ duæ, oblongæ, planæ, obtusæ cum exiguo acumine, patentibus, longitudine vexilli, unguibus brevibus, appendiculo nullo.

Carinz dipetala, concava, erecta, lateribus posticis

conniventibus, anticis incumbentibus, hinc clausa, cæterum alis conformis.

STAM. *Filamenta* decem, distincta, subulata, declinata, in carina recondita; longitudine corollæ, persistentia, marcescentia. *Antheræ* subovales, incumbentes.

PIST. *Germen* oblongum, pedicellatum, planum, situ staminum: desineus in stylum subulatum, adscendentem, longitudine staminum. *Stigma* simplex, acutum.

PER. *Capsula* membranacea, oblonga, plana, obtusa cum acumine abrupto laterali, basi attenuata, apice unilocularis, non dehiscens.

SEM. pauca, reniformi-oblonga, compressa.

852. BAUHINIA. * *Plum.* 13.

CAL. *Perianthium* oblongum, longitudinaliter latere inferiore dehiscens, hinc reclinatum, basi quinquefariam quoque dehiscens, superne coherentibus quinque foliolis, deciduum.

COR. *Petala* quinque, oblonga, undulata, apicibus attenuatis reflexis; patentia; inferiora paulo majora, superiore magis distante, omnia unguibus calyci infidentia.

STAM. *Filamenta* decem, declinata, corolla breviora; decimum longissimum. *Antheræ* ovatae, in decimo semper, rarius in reliquis.

PIST. *Germen* oblongum, pedicello infidens. *Stylus* filiformis, declinatus. *Stigma* obtusum, assurgens.

PER. *Legumen* longum, subteres, uniloculare.

SEM. multa, subrotunda, compressa, secundum longitudinem leguminis posita.

OBS. B. divaricata & acuminata habet *Filamenta* diadelphica, situ contrario quam in *Papilionaceis*, stamine solitario inferiorem locum occupante.

853. HYMENÆA. Courbaril. *Plum.* 36.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum, inaequale.

COR. papilionacea.

Vexillum magnum, reflexum.

Ala lanceolata, parva.

Carina subulata, alis longior, adscendens.

STAM. *Filamenta* decem. - - -

PIST. *Germen* oblongum.

PER. *Legumen* maximum, ovato-oblongum, obtusum, uniloculare, pulpa farinosa repletum.

SEM. plura, ovata, polline & fibris obvoluta.

OBS. *Petala quinque subæqualia vocat autor. S. V. p. 392.*

854. POINCIANA. † Tournef. 391.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum, laxum, oblongum, concavum, deciduum: *foliolo* infimo longiore, declinato, fornicato.

COR. pentapetala, inæqualis. *Petala* quatuor, subrotunda, subæqualia; *quintum* supremum, majus, difforme, crenatum.

STAM. *Filamenta* decem, setacea, omnium longissima, declinata: supremo pedicellato. *Antheræ* oblongæ, incumbentes.

PIST. *Germen* subulatum, declinatum, longius, desinens in *Stylum* longitudine staminum. *Stigma* obtusum.

PER. *Legumen* compressum, oblongum, dissepimentis quasi transversalibus.

SEM. plura, compresso plana, subovata.

855. MYROXYLON. *Suppl. p. 34.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum, quinque-dentatum, persistens. *Dentes* minimi, obsoletiores.

COR. *Petala* quinque, receptaculo inserta, inæqualia, irregularia, unguiculata. *Ungues* angusti, lineares, longitudine calycis. *Lamina petali superioris* lata, reflexa, ovata, obcordata. *Lamina petalorum reliquorum* angusto-lanceolata, recta, vix patentia.

STAM. *Filamenta* decem, germini adpressa, longitudine calycis, filiformia, glabra. *Antheræ* extra calycem denudatæ, erectæ, lanceolatæ, sulco exarata, acumine brevi terminatæ.

PIST. *Germen* superum, flore longius, extra florem pro-pendens, acinaciforme, compressum. *Stylus* adscendens, brevis, filiformis. *Stigma* obtusum, simplex.

PER. *Legumen* ensiforme, basi angustatum, apicem versus dilatatum, rotundatum, tamen ubique anceps, glabrum, monospermum.

SEM. unicum, rotundatum, compressum, in apice leguminis.

856. PARKINSONIA. † *Plum.* 3. *Jacq.* *amer.* 121.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum, receptaculo campanulato insidens, patens: *foliis* ovatis, acutis, coloratis, deciduis.

COR. *Petala* quinque, unguiculata, subæqualia, patentissima, ovata; infimo reniformi.

STAM. *Filamenta* decem, declinata. *Anthera* oblongæ, incumbentes.

PIST. *Germen* teres, longum, declinatum. *Stylus* filiformis, adfurgens, longitudine staminum. *Stigma* obtusum.

PER. *Legumen* longissimum, teres, torosum ad femina, unde moniliforme, acuminatum.

SEM. plura, intra singulum articulum leguminis singula, oblonga, subteretia, obtusa.

857. CÆSALPINA. † *Plum.* 9.

CAL. *Perianthium* quinquefidum, urceolatum: lobo inferiore maximo.

COR. *Petala* quinque, subæqualia: infimo pulchrius colorato.

STAM. *Filamenta* filiformia, incurva, versus laciniam majorem decumbentia. *Anthera* simplices.

PIST. *Germen* tenue, oblongum. *Stylus* simplex, longitudine staminum. *Stigma* capitatum.

PER. *Legumen* oblongum, rhombeum, acuminatum, uniloculare.

SEM. plurima, rhombea.

OBS. C. *Cristæ flores pentandri.*

858. TOLVIFERA. † *Roy.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum, quinqueidentatum, subæquale: angulo unico remotiore.

COR. *Petala* quinque, receptaculo inserta: quorum quatuor æqualia, linearia, calyce paulo longiora; Quintum duplo majus, obcordatum, ungue longitudine calycis.

STAM. *Filamenta* decem, brevissima. *Anthera* calyce longiores.

PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* nullus. *Stigma* acutum.

PER. : : : :

SEM. : : : :

859. NICANDRA Schreb. *Potalia* Aubl. 151.

CAL. *Perianthium* monophyllum, turbinatum, crassum, coloratum, quadripartitum: laciniis latis, concavis, obtusis: duabus oppositis externis majoribus, duabusque internis minoribus.

COR. monopetala. *Tubus* brevissimus. *Limbus* profunde decemfidus: laciniis oblongis, imbricatis, apice incurvis, rigidis.

Nectarium: annulus membranaceus, brevis, basin germinis cingens.

STAM. *Filamenta* decem, brevissima, nectario connexa, receptaculo inserta. *Anthera* lineares, tetragonæ, acutæ, erectæ, approximatae.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* brevis. *Stigma* peltatum, orbiculare, sexradiatum.

PER. *Bacca* subrotunda, sexsulcata, trilocularis.

SEM. plurima, minima, angulata.

860. CASSIA. * *Tournef.* 392. *Senna* *Tournef.* 390.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum, laxum, concavum, coloratum, deciduum.

COR. *Petala* quinque, subrotunda, concava: inferiora magis distantia, patentiora, majora.

STAM. *Filamenta* decem, declinata: tria inferiora longiora; tria superiora breviora. *Anthera* inferiores tres, maximæ, arcuatæ, rostratæ, apice dehiscentes; laterales quatuor absque rostro, dehiscentes: supremæ tres minimæ, steriles.

PIST. *Germen* teretiusculum, longum, pedunculatum. *Stylus* brevissimus. *Stigma* obtusum, assurgens.

PER. *Legumen* oblongum, dissepimentis transversis.

SEM. plura, subrotunda, futuræ superiori affixa.

OBS. In *Cassia* T. *Legumen* oblongum dissepimentis integris.

Senna T. *Legumen* gibbum, inflexum.

C. serpens flores pentandros habet: ita quoque *C. nictitans*.

C. glandulosa hexandra est, antheris duabus longissimis.

861. GUILANDINA. † *Bonduc. Plum.* 19.

CAL. *Perianthium* monophyllum, hypocrateriforme:
Limbo quinquepartito, æquali, patente.

COR. *Petala* quinque, lanceolata, concava, sessilia,
subæqualia, collo calycis inserta, calyce paulo ma-
jora.

STAM. *Filamenta* decem, subulata, erecta, calyci in-
serta, eoque breviora: alterna minora. *Anthera* ob-
tusæ, incumbentes.

PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis, longitudine
staminum. *Stigma* simplex.

PER. *Legumen* rhomboidem, futura superiori convexa,
ventricoso-compressum, uniloculare, dissepimentis
transversalibus distinctum.

SEM. *Ossea*, globoso-compressa, inter dissepimenta so-
litaria.

OBS. *Species* generis nonnullæ dioicæ sunt? an plures?

G. Moringa polygama & fructus a *Guilandina* genere
alienus, ut novum genus indicare videatur. *Linn.*

862. DICTAMNUS. * *Fraxinella Tournef.*

243.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum, minimum, deciduum:
folioli oblongis, acuminatis.

COR. *Petala* quinque, ovato-lanceolata, acuminata,
unguiculata, inæqualia: quorum duo sursum flexa:
duo oblique ad latera posita; unicum deflexum.

STAM. *Filamenta* decem, subulata, longitudine corollæ,
inter duo petala lateralia declinata, inæqualia. *Glan-
dula* punctiformes filamentis adspersæ. *Anthera* tetra-
gonæ, assurgentes.

PIST. *Germen* quinquangulare, receptaculo elevatum.

Stylus simplex, brevis, declinatus, incurvus. Stigma acutum, assurgens.

PER. *Capsulae* quinque, margine introrsum coalitæ, compressæ, acuminatæ, apicibus distantibus, bivalves.

SEM. bina, ovata, glaberrima, intra *Arillum* communem, bivalvem, excisum,

863. RHODORA. *du Hamel. gen. edit. b. p. 218.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquedentatum, persistens.]

COR. *Petala* tria, inæqualia : duobus superioribus lanceolatis, æqualibus, infimo concavo, oblongo, subtrilobo : *intermedia* minore concava.

STAM. *Filamenta* decem, filiformia, declinata, longitudine corollæ: *Anthera* subrotundæ, didymæ.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, declinatus, staminibus longior. *Stigma* quinquefidum, crassiusculum.

PER. *Capsula* ovata, quinquelocularis.

SEM. plurima, minuta.

OBS. *Retzii auctoritate genus in præcedentibus editionibus omissum iterum loco suo naturali restituo.*

864. CYNOMETRA. *Cynamorium. Garc.*

CAL. *Perianthium* tetraphyllum, oblongum, reflexum, longitudine corollæ.

COR. *Petala* quinque, lanceolata, æqualia, acuta.

STAM. *Filamenta* decem, corolla duplo longiora. *Anthera* ovales, apice bifidæ.

PIST. *Germen* cymbiforme. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* simplex.

PER. *Legumen* lunatum, compressum, carnosum, tuberculatum.

SEM. unicum, reniforme, magnum.

865. CRUDIA. *Schreb.*

CAL. *Perianthium* monophyllum. *Tubus* brevis, compresso-turbinatus, basi antice gibbus, persistens : ore

ore obliquo. *Limbus* quadripartitus, inæqualis, patens, deciduus: *lacinia* superiore subrotunda, concava; reliquis ovatis, obtusissimis, minus excavatis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* decem, filiformia, basi paullo latiora, medio inflexa, calycis collo inserta, ejusque laciniiis duplo longiora. *Anthera* subrotundæ, dorso adnata.

PIST. *Germen* acinaciforme, hispidum, erectum, pedicello longitudine tubi, fundo calycis adfixum, ad laciniam superiorem inclinatam. *Stylus* capillaris, inflexus longitudine staminum, e dorso germinis prodiens. *Stigma* incrassatum, obtusum.

PER. *Legumen*? maximum, ovatum, uniloculare, e-valve.

SEM. duo, subrotunda, depressa.

866. CYCLAS Schreb. *Apalatoa* Aubl. 147.
Touchiroa. Aubl. 148.

CAL. *Perianthium* monophyllum. *Tubus* brevis, turbinatus. *Limbus* quadripartitus, patulus: *laciniiis* ovato-oblongis, acutis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* decem, capillaria, calycis collo inserta, eoque longiora. *Anthera* ovata.

PIST. *Germen* ovato-oblongum, villosum, pedicellatum, *Stylus* capillaris, flexuosus. *Stigma* obtusum.

PER. *Lepumen*? subrotundum, depressum, rugosum, *ala* orbiculari membranacea, lata, undulata, cinctum, uniloculare, non dehiscens.

SEM. unicum, reniforme.

OBS. *Præcedenti maxime affine*. S.

867. SCHOTIA. Jacq. collect. v. i. p. 93.
Theodora. Medic.

CAL. *Perianthium* monophyllum, semiquinquesidum, coloratum, inferum. *Tubus* turbinatus, compressulus, carnosus, persistens. *Lacinia* ovata, concava, obtusa, erecta, decidua, longitudine æquales, lateribus mutuo parumper incumbentes.

COR. *Petala* quinque, tubo calycis imposita, oblonga, concava, obtusa, erecta, æqualia, lateribus mutuo incumbentia, unguibus vix ullis donata: laciniis calycinis duplo longiora.

STAM. *Filamenta* decem, subulata, erecta, petalis paulo longiora, tubo calycis in orbem inserta. *Anthera* oblonga, incumbentes.

PIST. *Germen* oblongum, compressum, longo & filiformi pedicello ex fundo calycis ortum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* simplex, obtusum.

PER. *Legumen*? pedicellatum — —

SEM. — — —

868. PROSOPIS.

CAL. *Perianthium* monophyllum, hemisphæricum, subquadridentatum.

COR. *Petala* quinque, lanceolata, sessilia, æqualia.

STAM. *Filamenta* decem, filiformia, æqualia. *Anthera* didyma, obtusa.

PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis, longitudine petalorum. *Stigma* simplex.

PER. *Legumen* longum, inflatum, uniloculare.

SEM. plura, rotundato-oblonga, colorata.

869. ADENANTHERA. * Roy. lugdb. p. 462.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquedentatum, minimum.

COR. pentapetala, campanulata: *Petala* lanceolata, sessilia, introrsum convexa, subtus concava.

STAM. *Filamenta* decem, subulata, erecta, corolla paulo breviora. *Anthera* subrotunda, incumbentes, apice exteriori glandulam globosam ferentes.

PIST. *Germen* oblongum, deorsum gibbum. *Stylus* subulatus, longitudine staminum. *Stigma* simplex.

PER. *Legumen* longum, compressum, membranaceum.

SEM. plurima, subrotunda, remota.

870. HÆMATOXYLUM. †

CAL. *Perianthium* quinquepartitum: laciniis ovatis, persistentibus.

COR. *Petala* quinque, ovata, æqualia, calyce paulo majora.

STAM. *Filamenta* decem, subulata, corolla fere longiora. *Anthera* parvæ.

PIST. *Germen* ovato-oblongum. *Stylus* simplex, longitudine staminum. *Stigma* crassiusculum, emarginatum.

PER. *Capsula* lanceolata, obtusa, unilocularis, bivalvis; valvis navicularibus.

SEM. nonnulla, oblonga, compressa.

OBS. *Characterem generis juxta perfectissimos flores ita exhibuit cl. Rottboell in Collect. Societ. med. Haum. 2. p. 254.*

Perianthium monophyllum, compressum, coloratum. *Tubus* brevissimus, urceolatus, carnosus, persistens. *Limbus* 5 partitus: laciniis concavis, obovatis, deciduis.

Petala 5, lineari-lanceolata, venosa, calyce $\frac{1}{3}$ parte longiora.

Stamina. *Filamenta* 10, plana, subulata, medietate inferiore interius barbata, corolla longiora. *Anthera* parvæ, lunulata.

Germen oblongo-lanceolatum, compressum. *Stylus* capillaris, flexuosus, staminibus longior. *Stigma* capitatum, emarginatum.

Pericarpium (Fraxini) lineari-oblongum, compressum, tubo calycis insitens.

871. TRICHILIA. †. *Brown. p. 279. Læfl.* 188.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulosum, subquinquedentatum, breve.

COR. *Petala* quinque, lanceolata, patentia.

Nectarium cylindricum, tubulosum: ore quinquedentato, petalis brevius, connatum ex filamentis decem.

STAM. *Filamenta* nulla. *Anthera* decem, erectæ, assurgentes, e margine tubi nectarii, deciduæ.

PIST. *Germen* obovatum, subtrilobum. *Stylus* brevis. *Stigma* capitatum, tridentatum.

PER. *Capsula* subrotunda, subtrigona, trilocularis, tri-valvis.

SEM. solitaria, arillato-baccata.

872. EKEBERGIA. *Thunb. diff. nov. gen. p. 43.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum, tomentosum, quadripartitum: *laciniæ* ovatæ, obtusæ.

COR. tetrapetala, calyce paulo longior. *Petala* oblonga, obtusa, alba, extus tomentosa.

Nectarium: annulus basin germinis cingens.

STAM. *Filamenta* decem, brevissima, pubescentia. *Antheræ* ovatæ, acutæ, erectæ, flavæ, lineis duabus nigris.

PIST. *Germen* superum. *Stylus* cylindricus, brevissimus. *Stigma* capitatum.

PER. *Bacca* globosa, pentasperma, magnitudine nucis avellanae.

SEM. oblonga.

OBS. *Bacca* variat seminibus a duobus ad quinque.

873. GUALACUM. † *Plum. 9.*

CAL. *Perianthium* pentaphyllum, concavum: *foliolis* ovato-oblongis: duobus exterioribus minoribus.

COR. *Petala* quinque, ovato-oblonga, concava, patentia, calyci inserta, unguibus linearibus.

STAM. *Filamenta* decem, erecta. *Antheræ* oblongæ.

PIST. *Germen* cuneiforme, angulatum, subpedicellatum. *Stylus* brevis. *Stigma* simplex, acutum.

PER. *Fructus* angulatus: angulis compressis; tri- f. quinquelocularis.

SEM. *Nuces* solitariae, duræ.

874. RUTA. * *Tournef. 133. Pseudo-Ruta Mich. 19.*

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, breve, persistens.

COR. *Petala* patentia, quinque, subovata, concava, unguibus angustis.

STAM. *Filamenta* decem, subulata, patentia, longitudine corollæ, basi latiuscula. *Antheræ* erectæ, brevissimæ.

PIST. *Germen* gibbum, cruce insculptum, punctis melliferis decem ad basin cinctum, elevatum receptaculo poris decem melliferis pertuso. *Stylus* erectus, subulatus. *Stigma* simplex.

PER. *Capsula* gibba, quinqueloba, semi-quinquefida, quinquelocularis, quinquefariam inter apices dehiscens.

SEM. plurima, scabra, reniformi-angulata.

OBS. R. graveolens in floribus, excepto primo, demit $\frac{1}{2}$ partem numeri in omni fructificationis parte, & petalis basi ciliatis est.

Petalis planis gaudet R. patavina, & R. linifolia.

875. TRIBULUS. Tournef. 141.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, acutum, corolla paulo brevius.

COR. *Petala* quinque, oblonga, obtusa, patentia.

STAM. *Filamenta* decem, subulata, minima. *Antherae* simplices.

PIST. *Germen* oblongum, longitudine staminum. *Stylus* nullus. *Stigma* capitatum.

PER. subrotundum, aculeatum, ex *Capsulis* quinque, vel decem, hinc gibbis, saepe mucronibus tribus quaternisve armatis; inde angulatis, conniventibus, loculis transversis.

SEM. plura, turbinata, oblonga.

T. *Cistoides* *Fractibus* decem rugosis absque spinis lateralibus.

876. FAGONIA. * Tournef. 141.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: *foliis* lanceolatis, erectis, patulis, minimis, deciduis.

COR. *Petala* quinque, cordata, patentia: *unguibus* longis, tenuibus, calyci insertis.

STAM. *Filamenta* decem, subulata, erecta, calyce longiora. *Antherae* subrotundæ

PIST. *Germen* quinquangulare. *Stylus* subulatus. *Stigma* simplex.

PER. *Capsula* rotundo-acuminata, quinquelocularis, quinquelobata, decemvalvis, loculis compressis.

SEM. solitaria, subrotunda.

877. ZYGOPHYLLUM. * Fabago Tournef. 135.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: *foliis* ovatis, obtusis, concavis, erectis.

COR. *Petala* quinque, sensim latiora, obtusa, emarginata, calyce paulo longiora.

Nectarium decaphyllum, connivens, germen includens: foliolo ceu squama singulo filamento juxta basin adnato, acuminato, connivente.

STAM. *Filamenta* decem, subulata, corolla breviora. *Anthera* oblonga, incumbentes.

PIST. *Germen* oblongum, basi attenuatum. *Stylus* subulatus, longitudine staminum. *Stigma* simplex.

PER. *Capsula* ovata, pentagona, quinquelocularis, quinquevalvis, dissepimentis ipsis valvulis adherentibus.

SEM. plura, subrotunda, compressa.

OBS. *Pericarpium* figura in diversis diversa occurrit.

Species datur, quæ quintam numeri partem excludit.

Z. album quinque stigmatibus instruitur.

878. QUASSIA. † *Amæn. acad. VI. monographia.*

CAL. *Perianthium* pentaphyllum, brevissimum: *foliolis* ovatis, persistentibus.

COR. *Petala* quinque, lanceolata, elongata, sessilia, æqualia.

Nectarium Squamis quinque, ovatis, villosis, basi filamentorum interiori insertis.

STAM. *Filamenta* decem, filiformia, æqualia, longitudine corollæ. *Anthera* oblonga, incumbentes.

PIST. *Receptaculum* carnosum, orbiculatum, elevatum, germine latius. *Germen* ovatum, ex quinque compositum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* simplex.

PER. quinque, lateralia, distantia, receptaculo carnosissimo orbiculato inserta, ovata, obtusa, bivalvis.

SEM. solitaria, globosa.

OBS. *Q.* amaræ flores hermaphroditi.

Q. *Simaruba* in *Monacia* flores mares & feminas seorsim producit.

879. THRYALLIS. †

CAL. *Perianthium* quinquepartitum: *laciniis* lanceolatis, erectis, persistentibus.

- COR. *Petala* quinque, subrotunda, patentia.
 STAM. *Filamenta* decem, subulata, calyce longiora. *Anthera* subrotunda.
 PIST. *Germen* obtusum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* simplex.
 PER. *Capsula* triquetra, triangularis, obtusa, bipartibilis: loculis exteriori angulo dehiscentibus.
 SEM. solitaria, glaberrima, obovata, basi obtusa, mucronato - incurva.

880. LIMONIA.

- CAL. *Perianthium* quinquepartitum, minimum.
 COR. *Petala* quinque, æqualia, patentia.
 STAM. *Filamenta* decem. *Anthera* crassæ.
 PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* cylindricus, brevis. *Stigma* crassiusculum.
 PER. *Bacca* subglobosa, trilocularis.
 SEM. solitaria.

881. HEISTERIA. Jacq. amer. 126.

- CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum, quinquefidum, acutum, parvum, persistens.
 COR. *Petala* quinque, ovata, acuta, concava, patentia.
 STAM. *Filamenta* decem, ovata, acuta, plana, erecta: alterna breviora. *Anthera* subrotunda.
 PIST. *Germen* subrotundum, depressum. *Stylus* erectus, brevis. *Stigma* quadrifidum, obtusum.
 PER. *Drupa* oblonga, apice depresso, insidens *Calyci* colorato, maximo.
 SEM. *Nux* ovalis, obtusa.
 OBS. *Lauvo* affinis.

882. QUISQUALIS. †

- CAL. *Perianthium* filiforme, longissimum, tubulosum, ore quinquefido, patulo, decidua.
 COR. *Petala* quinque, calycis fauce inserta, sessilia, oblonga, obtusa, patentia, calycis limbo majora.
 STAM. *Filamenta* decem, setacea, calycis fauci inserta, quorum quinque inferiora. *Anthera* in fauce calycis.
 PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, staminibus longior. *Stigma* obtusum, latius.

PER. *Drupa* sicca, quinquangularis.

SEM. *Nux* subrotunda.

883. *MONOTROPA*. * *Orobanchoides* Tournef. *A. G.* 170. *Hypopitys* Dill. gen. 7.

CAL. nullus (nisi *petala* quinque exteriora pro calyce colorata habeas).

COR. *Petala* decem, oblonga, parallelo-erecta, apicibus serrata, decidua, quorum *alterna exteriora* basifunt gibba, introrsum concava mellifera.

STAM. *Filamenta* decem, subulata, erecta, simplicia. *antheræ* simplices.

PIST. *Germen* subrotundum, acuminatum. *Stylus* cylindraceus, longitudine staminum. *Stigma* obtuso-capitatum.

PER. *Capsula* ovata, pentagona, obtusa, quinquevalvis.

SEM. numerosa, paleacea.

OBS *Talis est flos terminalis; si vero flores laterales adsint, excludant unicam quintam partem numeri, in omni fructificationis parte.*

884. *CLETHRA*. † *Gronov. virg.* 43.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum: *foliis* ovatis, concavis, erectis, persistentibus.

COR. *Petala* quinque, oblonga, extrorsum latiora, erecto-patentia, calyce paulo longiora: superiore latiore.

STAM. *Filamenta* decem, subulata, longitudine corollæ. *Antheræ* oblongo-erectæ, apice dehiscentes.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis, erectus, persistens, increescens. *Stigma* trifidum.

PER. *Capsula* subrotunda, calyce obvoluta, trilocularis, trivalvis.

SEM. plurima, angulata.

885. *PYROLA*. * *Tournef.* 134.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, minimum, persistens.

COR. *Petala* quinque, subrotunda, concava, patentia.

STAM. *Filamenta* decem, subulata, corolla breviora. *Antheræ* nutantes, magnæ, sursum bicornes.

PIST. *Germen subrotundum, angulatum. Stylus filiformis, staminibus longior, persistens. Stigma crassiusculum.*

PER. *Capsula subrotunda, depressa, pentagona, quinquelocularis, angulis dehiscens.*

SEM. *numerosa, paleacea.*

OBS. *Stamina & Stylus in aliis erecta, in aliis ad latus declinata, in aliis patentia.*

Stigmatis figura in diversis speciebus diversa est.

886. LEDUM. *

CAL. *Perianthium monophyllum, minimum, quinque-dentatum.*

COR. *Petala quinque, ovata, concava, patentia.*

STAM. *Filamenta decem, filiformia, patentia, longitudine corollæ. Anthera oblonga.*

PIST. *Germen subrotundum. Stylus filiformis, longitudine staminum. Stigma obtusum.*

PER. *Capsula subrotunda, quinquelocularis, quinque-fariam basi dehiscens.*

SEM. *numerosa, oblonga, angusta, utrinque acuta, tenuissima.*

887. DIONÆA. † *Autore Ellisio.*

CAL. *Perianthium pentaphyllum, erectum: foliolis oblongis, acutis, persistentibus.*

COR. *Petala quinque, fessilia, oblonga, obtusa, concava.*

STAM. *Filamenta decem, subulata, breviora. Anthera subrotunda, polline tricocco.*

PIST. *Germen subrotundum, depressum, crenatum. Stylus filiformis, filamentis brevior. Stigma patens, margine fimbriatum.*

PER. *Capsula unilocularis, gibba.*

SEM. *plurima, subovata, minima, basi capsulæ affixa.*

888. MURRAYA. *Authore D. Kenigio.*

CAL. *Perianthium monophyllum, quinquepartitum, minimum: laciniis linearibus, erectis, teretiusculis, remotis, persistentibus.*

COR. *pentapetala, campanulata: petalis lanceolatis, apice patulis.*

- Nectarium* campanulatum, breve, germen cingens.
 STAM. *Filamenta* decem, subulata, longitudine floris.
Antheræ oblongiusculæ
 PIST. *Germen* subrotundum, superum. *Stylus* filiformis,
 subangulatus, *staminibus* longior. *Stigma* planiusculum,
 verrucosum, angulatum.
 PER. *Bacca* subpulposa, unilocularis.
 SEM. unicum, magnum, obovatum, acutum, hinc sul-
 catum.

889. PETALOMA. Swartz. prodr.

- CAL. cyathiformis 5 - dentatus.
Petala 5 calyci inter dentes inserta.
Bacca 1 - locularis, 1 - 4 - sperma.

890. CHALCAS.

- CAL. *Perianthium* quinquepartitum, minimum: *foliolis*
 subulatis, erectis, persistentibus.
 COR. pentapetala, campanulata. *Petala* oblongiusculæ,
 majusculæ, unguibus insidentia.
 STAM. *Filamenta* decem, subulata, erecta, corolla bre-
 viora. *Antheræ* subrotundæ.
 PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis, longitu-
 dine staminum. *Stigma* capitato - verrucosum.
 PER. *Bacca* oblonga. Rumph.
 SEM. duo, tomentosa.
 OBS. An affinis *Trichogamila* Brown?

891. MELASTOMA. † Burm. Acinodendron
edit. prior. 363.

- CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum, quin-
 quefidum, obtusum, persistens.
 COR. *Petala* quinque, subrotunda, fauci calycis inserta.
Nectarium squamis quinque, sub singulo filamento sin-
 gulis.
 STAM. *Filamenta* decem, calyci inserta, brevia: horum
 aliqua in medio instructa processu, quasi retrofracta.
Antheræ longæ, subcurvæ, erectæ.
 PIST. *Germen* subrotundum, calyce obvolutum. *Stylus*
 filiformis, rectus. *Stigma* obtusum.
 PER. *Bacca* quinquelocularis, calyce obvoluta, subro-
 tunda, coronata margine cylindraceo.

SEM. plurima, nidulantia.

OBS. M. discolor demit $\frac{1}{2}$ e fructificatione.

M. octandæ etiam quinta pars in fructificatione exempta est.

892. JUSSIEUA. *

CAL. Perianthium quadri- f. quinquepartitum, superum, parvum: foliolis ovatis, acutis, persistentibus.

COR. Petala quatuor vel quinque, subrotunda, patentia, sessilia.

STAM. Filamenta octo f. decem, filiformia, brevissima. Antheræ subrotundæ.

PIST. Germen oblongum, inferum. Stylus filiformis. Stigma capitatum, planum, striis quinque notatum.

PER. Capsula oblonga, coronata, quadri- f. quinquelocularis, angulis dehiscens.

SEM. plurima, minuta, per series deposita.

893. CODON. Auctore Cl. Dau. Royeno.

CAL. Perianthium monophyllum, decempartitum: foliolis subulatis, persistentibus, erectiusculis; alternis brevioribus.

COR. monopetala, campanulata, basi torulosa: Limbo decempartito, æquali.

Nectarium decemloculare, ex squamis 10, unguibus staminum insertis, conniventibus, receptaculum tegentibus.

STAM. Filamenta decem, longitudine corollæ. Antheræ crassæ.

PIST. Germen superum, conicum. Stylus simplex, longitudine staminum. Stigmata duo, longa, setacea, divergentia.

PER. biloculare.

SEM. plura, subrotunda, hirta, in pulpa exsucca colorata.

894. ANDROMEDA. * Ledum Mich. 106.

Chamædaphne Buxh. A. R. Poliifolia

Buxb. A. R. Ericæ species Tournef.

373. B.

CAL. Perianthium quinquepartitum, acutum, minimum, coloratum, persistens.

COR. monopetala; campanulata, quinquefida: *laciniis reflexis.*

STAM. *Filamenta* decem, subulata, corolla breviora, vix corollæ affixa. *Antheræ* bicornes, nutantes.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* cylindraceus, staminibus longior, persistens. *Stigma* obtusum.

PER. *Capſula* subrotunda, pentagona, quinquelocularis, quinquevalvis, angulis dehiscens.

SEM. plurima, subrotunda, nitida.

ORS. *Numero ab Erica differt.*

Corolla aliis ovata, aliis perfecte campanulata est.

Antheræ aut muticæ, aut aristatæ.

A. *Daboecia* (olim *Erica Daboecii*) quintam partem numeri fructificationis exiit.

895. RHODODENDRON. † Chamærhododendros Tournef. 373.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, persistens.

COR. monopetala, rotato-infundibuliformis: *Limbo* patente: *laciniis* rotundatis.

STAM. *Filamenta* decem, filiformia, longitudine fere corollæ, declinata. *Anthe* ovales.

PIST. *Germen* pentagonum, retusum. *Stylus* filiformis, longitudine corollæ. *Stigma* obtusum.

PER. *Capſula* ovata, subangulata, quinquelocularis.

SEM. numerosa, minima.

896. KALMIA. †

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, parvum, persistens: segmentis subovatis, acutis, teretiusculis.

COR. monopetala, hypocratero-infundibuliformis. *Tubus* cylindricus, calyce longior. *Limbus* disco plano, ambitu erecto, semiquinquefido; *Cornicula* nectarifera decem, extus e corolla prominentia, & ambientia corollam, ubi *Limbi* ambitus erigitur.

STAM. *Filamenta* decem, subulata, erecto-patentia, corolla paulo breviora, basi corollæ inserta. *Antheræ* simplices.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis, corolla longior, declinatus. *Stigma* obtusum.

PER. *Capsula* subglobosa, depressa, quinquelocularis, quinquevalvis.

SEM. numerosa.

OBS. *Nectaria cornuta e Petalo extus prominentia, corollam ambientia distinguunt genus abunde a Bicornibus.*

897. EPIGÆA † *Memecylum Mitch.* 13.

CAL. *Perianthium* duplex, approximatum, persistens.

P. exterius triphyllum: *foliis* ovato-lanceolatis, acuminatis: *exteriore* majore.

P. interius quinquepartitum, erectum, *exteriore* paulo longius: *foliis* lanceolatis, acuminatis.

COR. monopetala, hypocrateriformis. *Tubus* cylindricus, calyce fere longior, intus hirsutus. *Limbus* patens, quinquepartitus: *Lobis* ovato-oblongis.

STAM. *Filamenta* decem, filiformia, longitudine tubi, basi corollæ affixa. *Antheræ* oblongæ, acutæ.

PIST. *Germen* globosum, villosum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* obtusum, subquinquefidum.

PER. *Capsula* subglobosa, depressa, pentagona, quinquelocularis, quinquevalvis.

SEM. plurima, subrotunda. *Rec.* magnum, quinquepartitum.

898. GAULTHERIA. † *Kaln.*

CAL. *Perianthium* duplex, approximatum, persistens.

P. exterius diphyllum, brevius: *foliis* semiovatis, concavis, obtusis.

P. interius monophyllum, quinquefidum, campanulatum: *segmentis* semi-ovatis.

COR. monopetala, ovata, semiquinquefida: *Limbo* parvo, revoluta.

Nectarium corpusculis decem, subulatis, erectis, brevissimis, cingentibus *germen* intra stamina.

STAM. *Filamenta* decem, subulata; incurva, corolla breviora, receptaculo inserta. *Antheræ* bicornes: *corniculis* bifidis.

PIST. *Germen* subrotundum, depressum. *Stylus* cylindricus, longitudine corollæ. *Stigma* obtusum.

PER. *Capsula* subrotunda, obtuse pentagona, depresso, quinquelocularis, quinquevalvis, undique tecta *Perianthio* interiore transformato & enato in *Baccam* subrotundam, coloratam, apice perviam.

SEM. plurima, subovata, angulata, ossæa.

899. ARBUTUS. * *Tournef.* 368. Uva Ursi
Tournef. 370.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, obtusum, minimum, persistens.

COR. monopetala, ovata, basi planiuscula, diaphana, ore quinquesido: *lacinis* obtusis, revolutis, parvis.

STAM. *Filamenta* decem, subulato-ventricosa, basi tenuissima, margine baseos corollæ affixa, corolla dimidio breviora. *Anthera* leviter bifida, nutantes.

PIST. *Germen* subglobosum, receptaculo decem punctis notato insidens. *Stylus* cylindraceus, longitudine corollæ. *Stigma* crassiusculum, obtusum.

PER. *Bacca* subrotunda, quinquelocularis.

SEM. parva, ossæa.

OBS. Ad *Vaccinium* proxime accedit, a quo fructu supero distinguitur.

Arbutus T. *loculis polyspermis.*

Uva ursi T. *loculis monospermis.*

900. INOCARPUS. *Suppl. p.* 35. *Forst. charact. gen. n.* 33.

CAL. *Perianthium* monophyllum, bifidum. *Lacinia* oblongæ, obtusæ, æquales.

COR. monopetala, tubulosa. *Tubus* cylindricus, calyce longior. *Limbus* quinquepartitus, tubo longior. *Lacinia* reflexæ, undulatæ, lineares.

STAM. *Filamenta* decem, brevissima, tubo inserta, duplici serie versus faucem. *Anthera* ovata.

PIST. *Germen* superum, oblongum, villosum. *Stylus* nullus. *Stigma* simplex.

PER. *Drupa* ovata, magna, compressa, incurvata, monosperma.

SEM. *Nux* fibris lignosis intertextis constans. *Nucleus* ovalis, compressus.

901. DAIS. † *Authore* Dau. *Royeno.*

CAL. *Involucrum* tetraphyllum, sessili - multiflorum : *foliis* scariosis, erectis.

Perianthium nullum.

COR. monopetala, infundibuliformis, involucrio longior. *Tubus* filiformis, rudis. *Limbus* quinquetidus : *laciniis* lanceolatis, obtusis

STAM. *Filamenta* decem, fauci inserta, limbo breviora : alternis brevioribus. *Anthere* simplices.

PIST. *Germen* oblongiusculum, basi corollæ innatum. *Stylus* filiformis, longitudine tubi. *Stigma* globosum, adscendens.

PER. *Bacca.* - - -

SEM. unicum.

OBS. *Est species, cui quinta pars numeri deficit.*

902. CASEARIA. *Jacq. amer. p. 132.*

CAL. *Perianthium* pentaphyllum, deciduum : *foliis* oblongis, planis, coloratis, patentissimis.

COR. nulla

Nectarium e foliolis oblongis, obtusis, hirsutis, suberectis, staminibus duplo brevioribus, alternoque cum iis situ.

STAM. *Filamenta* octo vel decem, subulata, suberecta, calycem non superantia. *Anthere* oblongæ, incurbentes.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis, erectus, longitudine staminum. *Stigma* capitatum, obtusum.

PER. *Capsula* subrotunda, obtusa cum exiguo acumine e styli parte residua, obtuse trigona, unilocularis, coriacea, crassa, trivalvis.

SEM. plura ab invicem compressa, hinc angulata, valvulis adfixa, in pulpa molli. *Receptaculum* nullum.

903. TERMINALIA.

* *Masculi* flores superiores racemi.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum, stellatum, acutum, fundo hispido.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* decem, subulata, longitudine calycis.
Antheræ subrotundæ, interiores bifidæ.

* *Hermaphroditus* flos unus alterve inferior racemi.

CAL. ut in masculis.

COR. nulla.

STAM. ut in masculis.

PIST. *Germen* inferum, conico-subulatum. *Stylus* simplex, subulatus. *Stigma* acutiusculum.

PER. *Drupa* ovalis, cymbiformis: latere superiore depresso, bifurcato.

SEM. *Nux* ovali-oblonga, lævis, basi obtusa.

904. EUCIDA. Buceras. *Brown. t. 23. f. I.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum, obsolete quinquedentatum, superum, persistens.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* decem, capillaria, basi calycis inserta, calyce longiora. *Antheræ* cordatæ, erectæ.

PIST. *Germen* inferum, ovatum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* obtusum.

PER. *Bacca* sicca, ovata, unilocularis, calyce coronata.

SEM. unicum, ovatum.

905. COPAIFERA. Copaiva *Jacq. amer. 133.*

CAL. nullus.

COR. *Petala* quatuor, oblonga, acuta, concava, patentissima.

STAM. *Filamenta* decem, filiformia, incurva, corolla paulo longiora. *Antheræ* oblongæ, incumbentes.

PIST. *Germen* rotundum, compresso-planum, pedicellatum. *Stylus* filiformis, incurvatus, longitudine staminum. *Stigma* obtusum.

PER. *Legumen* ovatum, bivalve, styli parte mucronatum.

SEM. unicum, ovatum, arillo baccato involutum.

II. DIGYNIA.

906. CARPINUS. * *Tournef.* 348. *Ostrya Mich.* 104.

* *Masculi Flores* in Amentum cylindraceum digesti.

CAL. *Amentum Commune* undique laxè imbricatum; constans *Squamis* unifloris, ovatis, concavis, acutis, ciliatis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* sæpius decem, minima. *Antheræ* didymæ, compressæ, apice villosæ, bivalves.

* *Feminei Flores* in Amentum oblongum digesti, in eadem planta.

CAL. *Amentum Commune* laxè imbricatum; constans *Squamis* lanceolatis, villosis, apice reflexis, unifloris.

COR. calyciformis, monophylla, sexfida: *laciniis* duabus majoribus.

PIST. *Germina* duo, brevissima, singulis *Styli* duo, capillares, colorati, longi. *Stigmata* simplicia.

PER. nullum. *Amentum maximum* evadens, ad basin singulæ squamulæ semen condens.

SEM. *Nux* ovata, angulosa.

OBS. *Carpinus T.* semen intra basin squamæ calycinae concavæ gerit.

Ostrya M. semen intra squamam calycinam inflatum.

907. SCLERANTHUS. * *Knawel Dill.gen.* 3.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, femiquinquesidum, acutum, persistens, collo coarctatum.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* decem; subulata, erecta, minima, calyci insidentia. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* subrotundum. *Styli* duo, erecti, capillares, longitudine staminum. *Stigmata* simplicia.

PER. *Capsula* ovata, tenuissima, in fundo calycis collo clauso.

SEM. duo, hinc convexa, inde plana.

908. TRIANTHEMA. * *Sauv.* 127. *Portulacastrum Jussevi.*

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: *foliolis* oblongis, intus coloratis, sub apice mucronatis, persistentibus.

COR. nulla, nisi *Calysem* dicas quasi ex corolla & calyce connatum.

STAM. *Filamenta* decem (quibusdam 5-12) capillaria, longitudine calycis. *Anthera* subrotundæ.

PIST. *Germen* subsuperum, oblongiusculum, retusum. *Stylus* 1. f. 2. filiformes, longitudine staminum, hinc hispidi. *Stigmata* simplicia.

PER. *Capsula* oblonga, truncato-retusa, circumscissa; *Loculis* duobus superioribus, duobusque inferioribus.

SEM. solitaria f. bina, subovata.

OBS. Numerus staminum stylorumque in distinctis speciebus numero diversus.

909. CHRYSOSPLENIUM. * Tournef. 60.

CAL. *Perianthium* quadripartitum f. quinquepartitum, patens, coloratum, persistens: *laciniis* ovatis: oppositis angustioribus.

COR. nulla: nisi *calycem* coloratum dicas.

STAM. *Filamenta* octo f. decem, subulata, erecta, brevissima, in receptaculo angulato posita. *Anthera* simplices.

PIST. *Germen* inferum, desinens in *Stylos* duos, subulatos, longitudine staminum. *Stigmata* obtusa.

PER. *Capsula* birostris, bipartita, unilocularis, bivalvis, calyce viridi cincta.

SEM. plurima, minima.

OBS. Flos terminalis quinquefidus est, reliqui seriores quadridi.

910. ROYENA. *

CAL. *Perianthium* monophyllum, arceolatum, quinquefidum, persistens.

COR. monopetala. *Tubus* longitudine calycis. *Limbus* patens, revolutus, quinquepartitus: *laciniis* ovatis.

STAM. *Filamenta* decem, brevissima, corollæ adnata. *Anthera* oblongæ, acutæ, didymæ, erectæ, longitudine tubi.

PIST. *Germen* ovatum, desinens in *Stylos* duos, staminibus paulo longiores. *Stigmata* simplicia

PER. *Capsula* ovata, quadrifurca, unilocularis, quadrivalvis.

SEM. *Nuces* quatuor, oblongæ, triangulares, Arillo obvolutæ.

OBS. R. *polyandra floribus polygamis, polyandris est.*

911. HYDRANGEA. † Gronov.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquedentatum, persistens, parvum.

COR. *Petala* quinque, æqualia, subrotunda, calyce majora.

STAM. *Filamenta* decem, corolla longiora, horum alterna longiora. *Antheræ* subrotundæ, didymæ.

PIST. *Germen* subrotundum, inferum. *Styli* duo, breves, distantes. *Stigmata* obtusa, persistentia.

PER. *Capsula* subrotunda, didyma, stylo duplici birostris, nervis plurimis angulata, calyce coronata, dissepimento transverso bilocularis, foramine inter cornua dehiscens.

SEM. numerosa, angulata, acuminata, minima.

OBS. *Capsulam circumscissam nunc tribuit Syst. veget. p. 410.*

912. SAXIFRAGA. Tournef. 129. Geum Tournef. 129.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum, breve, acutum, persistens.

COR. *Petala* quinque, patentia, basi angusta.

STAM. *Filamenta* decem, subulata. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* subrotundo-acuminatum, desinens in *Stylos* duos, breves. *Stigmata* obtusa.

PER. *Capsula* subovata, birostris, unilocularis, inter apices dehiscens.

SEM. numerosa, minuta.

OBS. *Saxifragiæ Tournef. Capsula & Germen receptaculo floris cinctum, s. inferum.*

Gei Tournef. Capsula & Germen receptaculo floris indens s. superum.

S. *sarmentosæ corolla irregularis.*

Calyx in nonnullis reflexus.

913. TIARELLA.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum: *foliolis* ovatis, actis, persistentibus.

COR. *Petala* quinque, oblonga, integra, calyci inserta.
 STAM. *Filamenta* decem, filiformia, corolla longiora, calyci inserta. *Anthera* subrotundæ.

PIST. *Germen* bifidum, desinens in *Stylos* duos, brevissimos. *Stigmata* simplicia.

PER. *Capsula* oblonga, unilocularis, bivalvis: valvulis planiusculis, altera duplo longiore.

SEM. plurima, ovata, nitida.

914. MITELLA. * *Tournef.* 126.

CAL. *Perianthium* monophyllum, semiquinquefidum, campanulatum, persistens.

COR. *Petala* quinque, multifido-capillaria, calyce duplo majora, calyci inserta.

STAM. *Filamenta* decem, subulata, calyci inserta, corolla breviora. *Anthera* subrotundæ.

PIST. *Germen* subrotundum, bifidum. *Styli* vix ulli. *Stigmata* obtusa.

PER. *Capsula* ovata, unilocularis, bivalvis: valvulis planis, æqualibus.

SEM. plurima.

915. CUNONIA. *Oosterdykia*. *Burm. af. t.* 96.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum, minimum: *foliis* ovatis, concavis, acutis.

COR. *Petala* quinque, obovata, patentia, sessilia.

STAM. *Filamenta* decem, subulata, longitudine corollæ. *Anthera* subrotundæ, didymæ.

PIST. *Germen* conicum. *Styli* duo, subulati, corolla longiores. *Stigmata* obtusa.

PER. *Capsula* oblonga, acuminata, bilocularis.

SEM. plurima, subrotunda.

916. GYPSOPHILA. *

CAL. *Perianthium* campanulatum; angulatum, quinquepartitum: *foliis* ovatis, persistentibus.

COR. *Petala* quinque, ovata, obtusa, patentia, subsessilia.

STAM. *Filamenta* decem, subulata, patentia. *Anthera* subrotundæ.

PIST. *Germen* subglobosum. *Styli* duo, filiformes, desiccantes. *Stigmata* simplicia.

PER. *Capfula* globosa, unilocularis, quinquevalvis.

SEM. plurima, subrotunda

OBS. *G. paniculata dioica est.*

917. SAPONARIA. *

CAL. *Perianthium* monophyllum, nudum, tubulosum, quinquedentatum, persistens.

COR. *Petala* quinque. *Ungues* angusti, angulati, longitudine calycis. *Limbus* planus: Laminis extrorsum latioribus, obtusis.

STAM. *Filamenta* decem, subulata, longitudine tubi corollæ: alterna unguibus petalorum inserta; quinque feriora. *Antheræ* oblongæ, obtusæ, incumbentes.

PIST. *Germen* teretiusculum. *Styli* duo, recti, paralleli, longitudine staminum. *Stigmata* acuta.

PER. *Capfula* longitudine calycis, testæ, unilocularis, oblonga.

SEM. plurima, parva. *Receptaculum* liberum.

OBS. *Calycis figura in variis varia.*

818. DIANTHUS. * *Caryophyllus Tournef.*

174. *Tunica Dill. elth.* 298.

CAL. *Perianthium* cylindricum, tubulosum, striatum, persistens: ore quinquedentatum, cinctum basi squamulis quatuor, quarum duæ oppositæ inferiores.

COR. *Petala* quinque. *Ungues* longitudine calycis, angusti, receptaculo inserti. *Limbus* planus: Laminis extrorsum latioribus, obtusis, crenatis

STAM. *Filamenta* decem, subulata, longitudine calycis, apicibus patulis. *Antheræ* ovali-oblongæ, compressæ, incumbentes

PIST. *Germen* ovale. *Styli* duo, subulati, staminibus longiores. *Stigmata* recurva, acuminata.

PER. *Capfula* cylindrica, testæ, unilocularis, quadrifariam apice dehiscens.

SEM. plurima, compressa, subrotunda. *Receptaculum* liberum, tetragonum, pericarpio dimidio brevius.

OBS. *In aliis Styli longitudinem staminum vix excedunt, in aliis vero longissimi sunt, sed adeo revoluti, ut floris inflexio necessarii non sit.*

III. TRIGYNIA.

919. ARENARIA. *

CAL. *Perianthium* pentaphyllum : *foliis* oblongis , acuminatis , patentibus , persistentibus.

COR. *Petala* quinque , ovata integra.

STAM. *Filamenta* decem ; subulata : *alterna* interiora. *Anthera* subrotundæ.

PIST. *Germen* ovatum. *Styli* tres , erecto-reflexi, *Stigmata* crassiuscula.

PER. *Capsula* ovata , testæ , unilocularis , apice quinquefariam dehiscens.

SEM. plurima , reniformia.

OBS. A tetraquetra capsula gaudet quinquevalvi.

920. STELLARIA. * *Alpine Tournef.* 126.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum : *foliis* ovato-lanceolatis , concavis , acutis , patentibus , persistentibus.

COR. *Petala* quinque , bipartita , plana , oblonga , marcescentia.

STAM. *Filamenta* decem , filiformia , corolla breviora : *alterna* breviora. *Anthera* subrotundæ.

PIST. *Germen* subrotundum. *Styli* tres , capillares , patentes. *Stigmata* obtusa.

PER. *Capsula* ovata , testæ , unilocularis , sexvalvis.

SEM. plurima , subrotunda , compressa.

OBS. St. radians petala quinquepartita habet.

921. CUCUBALUS. *Tournef.* 179.

CAL. *Perianthium* monophyllum , tubulosum , quinque-dentatum , persistens.

COR. *Petala* quinque. *Ungues* longitudine calycis. *Limbus* planus : *Laminis* sæpe bifidis.

Nectarium nullum coronans corollam.

STAM. *Filamenta* decem , subulata ; *alterna* seriora , *alterna* unguibus petali inserta. *Anthera* oblongæ.

PIST. *Germen* oblongiusculum. *Styli* tres , staminibus longiores , subulati. *Stigmata* pubescentia , oblonga , contra solem flexa.

PER. *Capsula* testæ , acuminata , trilocularis , apice quinquefariam dehiscens.

SEM. plurima, subrotunda.

OBS. *Distinguitur a Silene Corolla absque corona nectarea.*

C. *Otites dioicus* est.

Figura calycis in diversis varia.

C. *bacciferus* Corolla coronata est, ideoque ad *Silene* amandandus. Hall.

922. *SILENE*. * *Viscago* Dill. *elth.* 309. &c.

CAL. *Perianthium* monophyllum, ventricosum, quinque-dentatum, persistens.

COR. *Petala* quinque. *Ungues* angusti, longitudine calycis, marginati. *Limbus* planus, obtusus, sæpe bifidus.

Nectarium componitur e duobus denticulis, in collo cujusvis petali, coronam faucis constituens.

STAM. *Filamenta* decem, subulata: alterna unguibus petalorum inserta, seriora. *Anthera* oblonga.

PIST. *Germen* cylindraceum. *Styli* tres, simplices, staminibus longiores. *Stigmata* contra solem flexa.

PIST. *Capsula* cylindracea, testâ, trilocularis, apice quinquefariam dehiscens.

SEM. plurima, reniformia.

OBS. *Diversa a CUCUBALO Corolla corona nectarea.*

923. *CHERLERIA*. Hall. *it. helv.* I.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: *foliolis* lanceolatis, concavis aequalibus.

COR. *Petala* nulla (nisi calycem vel nectaria velis).

Nectaria quinque, emarginata s. bifida, in orbem posita, minima petaloidea.

STAM. *Filamenta* decem, subulata, quorum alterna nectariorum dorso affixa. *Anthera* simplices, alternæ steriles.

PIST. *Germen* ovatum. *Styli* tres, repandi. *Stigmata* simplicia.

PER. *Capsula* ovata, unilocularis, trivalvis.

SEM. duo s. tria, reniformia.

925. *DEUTZIA*. Thunb. *diff. nov. gen.* p. 19.

Flor. jap. p. 10.

CAL. *Perianthium* monophyllum, subcampanulatum, co-

rolla triplo brevius, tomentosum, quinquefidum, rarius sexfidum: *lacinia* ovata, obtusa, erecta.

COR. pentapetala, raro hexapetala. *Petala* extra marginem germinis inserta, oblonga, semiunguicularia.

STAM. *Filamenta* decem, extra marginem germinis inserta, linearia, apice filiformia, sub apice emarginata, trifida, alba, longitudine corollae, alternis paulo brevioribus. *Anthera* globosa, didyma.

PIST. *Germen* superum, fertiforme, medio concavum. *Styli* tres, rarius quatuor, filiformes, corolla paulo longiores. *Stigmata* simplicia, clavata.

PER. *Capsula* globosa, truncata, perforata, subtrigona, callosa, scabra, pistillorum basibus persistentibus triaristata, trivalvis, trilocularis, rarius quadrilocularis, magnitudine piperis, cinerea, basi dehiscens.

SEM. plura in singulo loculamento.

925. GARIDELLA. * *Tournef.* 430.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum, parvum; *foliis* ovatis, acutis, deciduis.

COR. *Petala* nulla, (nisi *Calyx* sumatur).

Nectaria quinque, longa, aequalia, bilabiata: *Labio* exteriori bifido, plano: *lacinis* longis, linearibus, obtusis. *L. interiore* brevior, simplici.

STAM. *Filamenta* decem saepius, subulata, corolla breviora. *Anthera* erecta, obtusa.

PER. *Germina* tria, ovata, erecta, acuminata, connexa. *Styli* vix ulli. *Stigmata* simplicia.

PER. *Capsulae* tres, connexae, oblongae, acuminatae, compressae, bivalves: futura interiore convexiore.

SEM. plura, brevia.

OBS *Garidella* ad *Nigellam* proxime accedit.

926. SCHINUS. * *Molle Tournef.*

* *Mas.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum, patens, acutum.

COR. *Petala* quinque, ovalia, patentia, petiolata.

STAM. *Filamenta* decem, filiformia, longitudine corollae, patentia. *Anthera* subrotunda.

PIST. Rudimentum absque stigmate.

* *Femina.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum, acutum, persistens.

COR. *Petala* quinque, oblonga, patentia, petiolata.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* nullus. *Stigmata* tria, ovata.

PER. *Bacca* globosa, trilocularis.

SEM. solitaria, globosa.

627. HIRÆA. *Jacq. amer.* 137. t. 176. f. 42.

COR. *Petala* quinque, subrotunda; concava, unguibus longis.

STAM. *Filamenta* decem, capillaria, quorum exteriora breviora. *Anthera* subrotunda, erecta.

PIST. *Germen* subrotundum. *Styli* tres, simplices, erecti. *Stigmata* bifida, obtusa, patentia.

PER. nullum.

SEM. tria, erecta, dorso carinata: singula aucta externe basi unica, & apice duplici ala patente.

OBS. *Capsulam* tripartitam, trilocularem & dispermam esse, habet *Syst. Veg.* p. 356. *Capsulas* autem tres, dorso auctas duabus alis membranaceis, uniloculares, monospermas in hoc genere adesse perhibet *Jacq. l. c.*

IV. PENTAGYNIA.

928. COTYLEDON. * *Dill. elth.* 95. *Tournef.* 19.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquesidum, acutum, minimum.

COR. *Petalum* campanulatum, quinquesidum.

Nectarium e squama concava, ad basin exteriorem singuli germinis singula.

STAM. *Filamenta* decem, subulata, recta, longitudine corollæ. *Anthera* erecta, quadrifurca.

PIST. *Germina* quinque, oblonga, crassiuscula, deficiente in *Stylis* subulatos, staminibus longiores. *Stigmata* simplicia.

PER. *Capsula* quinque, oblonga, ventricosa, acuminata, univalves, longitudinaliter introrsum dehiscentes.

SEM. plurima parva.

OBS. C. laciniata & nudicauli, unica quinta pars numeri, in singulis fructificationis partibus excluditur.

929. SEDUM. * *Tournef.* 140. A. B. G. H.
K. M. *Anacampteros Tournef.*

CAL. *Perianthium* quinquesidum, acutum, erectum, persistens.

COR. *Petala* quinque, lanceolata, acuminata, plana, patentia.

Nectaria quinque: *singulum* Squamula minima emarginata, singulo germi ad basin extrorsum inferta.

STAM. *Filamenta* decem, subulata, longitudine corollæ. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germina* quinque, oblonga, desinentia in *Stylos* tenuiores. *Stigmata* obtusa.

PER. *Capsulæ* quinque, patentes, acuminatæ, compressæ, versus basin emarginatæ, longitudinaliter futura introrsum dehiscentes.

SEM. plurima, minima.

930. PENTHORUM. * *Gronov. virg.* 51.

CAL. *Perianthium* monophyllum, 5-10-fidum, acutum, persistens.

COR. *Petala* sæpe quinque (rarius nulla), linearia, minima, inter calycis laciniæ.

STAM. *Filamenta* decem, setacea, æqualia, calyce duplo longiora, persistentia. *Antheræ* subrotundæ, deciduæ.

PIST. *Germen* coloratam, desinens in *Stylos* quinque, conicos, erectos, longitudine staminum, distantes. *Stigmata* obtusa.

PER. *Capsula* simplex, quinquesida, angulis conicis distantibus, quinquelocularis.

SEM. numerosa, minima, parum compressa.

OBS. Differt absentia *Nectariorum* a Sedo.

931. BERGIA. †

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, patens; *foliis* lanceolatis, persistentibus.

COR. *Petala* quinque, oblonga, patula, longitudine calycis.

STAM. *Filamenta* decem, setacea, mediocria. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* subrotundum, superum. *Styli* quinque, brevissimi, approximati. *Stigmata* simplicia, persistentia.

PER. *Capsula* simplex, subglobosa, mucronata, quinquetorulosa, quinquelocularis, quinquevalvis: *valvulis* ovatis, planis, secundum sulcos dehiscentibus, persistentibus, patentissimis.

SEM. numerosa, minuta.

932. SPERGULA. * *Dill. gen. 7.*

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: *foliolis* ovatis, obtusis, concavis, patentibus, persistentibus.

COR. *Petala* quinque, ovata, concava, patentia, calyce majora, indivisa.

STAM. *Filamenta* decem, subulata, corolla breviora. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* ovatum. *Styli* quinque, erecto-reflexi, filiformes. *Stigmata* crassiuscula.

PER. *Capsula* ovata, testâ, unilocularis, quinquevalvis.

SEM. plurima, depresso-globosa, margine emarginato cincta.

OBS. *Petalis* integris a *Cerastio* distinguitur.

S. pentandra stamina tantum 5. habet.

933. CERASTIUM. * *Myosotis Tournef. 126.*

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: *foliolis* ovato-lanceolatis, acutis, patentibus, persistentibus.

COR. *Petala* quinque, bifida, obtusa, erecto patentia, longitudine calycis.

STAM. *Filamenta* decem, filiformia, corolla breviora: alterna breviora. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* ovatum. *Styli* quinque, capillares, erecti longitudine staminum. *Stigmata* obtusa.

PER. *Capsula* ovato-cylindracea s. globosa, obtusa, unilocularis, dehiscens apice quinquedentato.

SEM. plurima, subrotunda.

OBS. *Species* 5. 4. *staminibus* quinque tantum instruuntur. *Primaria* diviso *specierum* ex *Capsula* oblonga & globosa petenda. *C. repens* *petalis* 4-f. 5-fidis est.

934. AGROSTEMMA. *

CAL. *Perianthium* monophyllum, coriaceum, tubulosum, quinquedentatum, persistens.

COR. *Petala* quinque. *Ungues* longitudine tubi calycis.
Limbus Laminis patentibus, obtusis.

STAM. *Filamenta* decem, subulata: *alte* na seriora, singulo ungui petalorum inserta. *Anthera* simplices.

PIST. *Germen* ovatum. *Styli* quinque, filiformes, erecti, longitudine staminum. *Stigmata* simplicia.

PER. *Capsula* oblongo-ovata, testâ, unilocularis, quinquevalvis.

SEM. plurima, reniformia, punctata. *Receptacula* libera, tot, quot semina, interiora gradatim longiora.

OBS. A. *Githago* *Corolla* non coronata est, ut in reliquis.

935. KIGGELARIA. *

* *Mas.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum, concavum: *laciniis* lanceolatis, concavis.

COR. *Petala* quinque, lanceolata, concava, calyce paulo longiora, cumque eo figuram urceolatam formantia.

Nectarium: Glandulæ obtuse trilobæ lobo medio majore, depressæ, coloratæ, ungui singuli petali adnatæ singulæ.

STAM. *Filamenta* decem, minima. *Anthera* oblongæ, calyce breviores, apicibus dehiscentes duobus foraminibus.

* *Femina.*

CAL. ut in mare.

COR. ut in mare.

PIST. *Germen* subrotundum. *Styli* quinque, simplices. *Stigmata* obtusa.

PER. *Capsula* coriacea, globosa, scabra, unilocularis, quinquevalvis.

SEM. plurima, subrotunda, inde angulata, tunica propria vestita.

936. CARICA. Papaya Tournef. 441.

* *Mas.*

CAL. vix manifestus.

COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* tenuis, longissimus, inferne sensim angustior. *Limbus* quinquepartitus: *laciniis* lanceolato-linearibus, obtusis, revolutis oblique in spiram.

STAM. *Filamenta* decem, in summo tubo corollæ, quorum quinque alterna inferiora. *Antheræ* oblongæ.

* *Femina*.

CAL. *Perianthium* minimum, quinquedentatum, persistens.

COR. pentapetala. *Petala* lanceolato linearia, utrinque obtusa, longissima, infra medium erecta, supra medietatem extrorsum deorsumque retro flexa.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* vix ullus. *Stigmata* quinque, oblonga, plano-potentia, extrorsum latiora, apice truncata, crenata.

PER. *Bacca* maxima, sulcis quinque angulata, unilocularis.

SEM. numerosa, ovata, sulcis exarata, tunicata.

937. LYCHNIS. * *Tournef.* 175. A. B. K. L. M.

CAL. *Perianthium* monophyllum, oblongum, membranaceum, quinquedentatum, persistens.

COR. *Petala* quinque: *Ungues* longitudine calycis, plani, marginati. *Limbus* Laminis sæpe fissis, planis.

STAM. *Filamenta* decem, calyce longiora; alterna feriora, singulo ungui petalorum affixa. *Antheræ* incumbentes.

PIST. *Germen* subovatum. *Styli* quinque, subulati, staminibus longiores. *Stigmata* reflexa contra solem, pubescentia.

PER. *Capsula* ad ovatam figuram accedens, testa, trilocularis, quinquevalvis.

SEM. plurima, rotundiuscula.

OBS. L. dioica sexu distincta est.

L. *Viscaria* petalis indivisis, capsula quinqueloculari est.

L. quadridentata pistillis 3, 4, 5. variat.

L. alpinae styli sunt quatuor.

938. OXALIS. * *Oxys. Tournef.* 13. *Oxyoides. Garc. A. A.* 1730. n. 415. t. 2. *Thunb. diff. de Oxalide.* p. 4.

CAL. *Perianthium* monophyllum, profunde quinquepartitum, breve, persistens: *laciniae* erectæ.

COR. monopetala, tubulosa, subcampanulata, calyce longior. *Tubus* sensim ampliatus, basi quinqueden-

tatus, dentibus acutis. *Limbus* quinquepartitus, patens: *laciniae* æquales, obovatæ, ante explicationem & sub somno contortæ.

STAM. *Filamenta* decem, lateribus germinis inserta, capillaria, sæpius libera, rarius in cylindrum connata, erecta, inæqualia: *quinque* breviora, simplicia, *quinque* longiora, externe dente erecto armata. *Antherae* incumbentes, didymæ.

PIST. *Germen* superum, quinquangulare, glabrum. *Styli* quinque, filiformes. *Stigmata* obtusa, villosa.

PER. *Capsula* oblonga, quinquangularis, glabra, quinquevalvis, quinquelocularis.

SEM. plura, globosa, glabra.

939. JONCOQUETIA Schreb. Tapirira Aubl.
188.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: *foliis* subrotundis, deciduis.

COR. *Petala* quinque, subrotunda, concava, patentia; calyce longiora.

STAM. *Filamenta* decem, corolla breviora, glandulæ adnata. *Antherae* subrotundæ.

PIST. *Germen* pentagonum, glandula cinctum. *Styli* nulli. *Stigmata* quinque.

PER. *Capsula* subglobosa, subrotundo-pentacocca, unilocularis, quinquevalvis.

SEM. quinque, ovata, arillata, singula valvulis affixa.

940. SPONDIAS. † Jacq. amer. 138. Mon-
bin Plum. 22.

CAL. *Perianthium* monophyllum, subcampanulatum, parvum, quinquesidum, coloratum, deciduum.

COR. *Petala* quinque, oblonga, plana, patentia.

STAM. *Filamenta* decem, subulata, erecta, corolla breviora: alterna longiora. *Antherae* oblongæ.

PIST. *Germen* ovatum. *Styli* quinque, breves, distantes, erecti. *Stigmata* obtusa.

FER. *Drupa* oblonga, magna, notata punctis quinque a casu stylorum.

SEM. Nux ovata, lignosa, subquinquangularis, quinquelocularis.

941. ROBERGIA Schreb. Rourea Aubl. 187.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum, persistens: *laciniis* subrotundis concavis.

COR. *Petala* quinque, subrotunda, longitudine calycis.

STAM. *Filamenta* decem, receptaculo inserta, longitudine corollæ. *Anthera* subrotundæ.

PIST. *Germe* subrotundum, villosum, superum. *Styli* quinque, capillares. *Stigmata* crassiuscula, sulcata.

PER. *Drupa* ovata, hinc convexior, inde levissime excavata.

SEM. *Nux* figura *drupæ*, unilocularis: *putamine* bivalvi.

942. SURIANA. † Plum. 40. Jacq. amer. 140.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: *foliis* lanceolatis, acuminatis, persistentibus.

COR. *Petala* quinque, obovata, longitudine calycis, patentia.

STAM. *Filamenta* decem, filiformia, corolla breviora. *Anthera* simplices.

PIST. *Germina* quinque, subrotunda. *Styli* solitarii, filiformes, erecti, longitudine staminum, inserti lateri medio & interiori germinis. *Stigmata* obtusa.

PER. nulla.

SEM. quinque, subrotunda.

OBS. *Styli* non ex apice prodeunt, sed e latere germinis.

943. FORSKOEHLA.

CAL. *Perianthium* subpentaphyllum, erectum: *foliis* lineari-lanceolatis, erectis, parallelis, acutis, persistentibus.

COR. *Petala* decem, rudia, spatulata, concava, erecta, marcescentia, calyce dimidio breviora, unguibus longitudine limbi.

STAM. *Filamenta* decem, filiformia, intra singula petala singula, longitudine petali. *Anthera* didymæ, subrotundæ, elasticæ.

PIST. *Germina* quinque, distantia, oblonga, lanata. *styli* setacei, corolla longiores. *stigmata* simplicia.

PER. nullum.

SEM. quinque, oblonga, subcompressa, utrinque attenuata, laea intertexta.

OBS. Numerus in quibusdam floribus minuitur, aut augetur.
Flos extricatu difficilissimus.

Octo tantum stamina observarunt Cl. Jacquin ac Medicus.

944. CORIARIA. * *Nissol. A. G. 1711. t. 12.*
Dill. gen. 12.

* *Mas.*

CAL. Perianthium pentaphyllum, brevissimum: foliolis subovatis, concavis.

COR. Petala quinque, simillima calyci, connexa.

STAM. Filamenta decem, longitudine corollæ. Antheræ oblongæ, bipartitæ.

* *Femina.*

CAL. Perianthium pentaphyllum, brevissimum: foliolis subovatis, concavis.

COR. Petala quinque, cuspidata, calyciformia, conniventia.

STAM. Filamenta decem (5 intra calycem; 5 intra petala), brevissima. Antheræ steriles.

PIST. Germina quinque, compressa, introrsum coalita. Styli totidem, setacei, longi. Stigmata simplicia.

PER. nullum. Petala quinque, carnea, ovato lanceolata, triquetra altero angulo introrsum spectante, regentia semina

SEM. quinque, reniformia.

OBS. Flores hermaphroditi aliis visi sunt.

V. DECAGYNIA.

945. NEURADA * *B. Jussieu.*

CAL. Perianthium quinquepartitum, superum, minimum.

COR. Petala quinque, æqualia, calce majora.

STAM. Filamenta decem, longitudine calycis. Antheræ simplices.

PIST. Germen gibbum, inferum. Styli decem, longitudine staminum. Stigmata simplicia.

PER. Capsula orbiculata, depressa, subtus convexa, undique aculeis adscendentibus munita, decemlocularis.

SEM. solitaria.

946. PHYTOLACCA. *Tournef.* 154.

CAL. nullus (*nisi corollam calycem coloratum dicas*).

COR. *Petala* quinque, subrotunda, concava, patentia, apice inflexa, persistentia.

STAM. *Filamenta* 10 f. 8. f. 20. fubulata, longitudine corollæ. *Anthera* subrotundæ, laterales.

PIST. *Germen* orbiculatum, depressum, torulis externe divisum, desinens in *Stylos* 8. f. 10. brevissimos, patienti-reflexos: *Stigmata* simplicia, persistentia.

PER. *Bacca* orbiculata, depressa, sulcis decem longitudinalibus exarata, pistillis umbilicata, totidem locularis.

SEM. solitaria, reniformia, glabra.

OBS. Ph. dioica sexu distincta est. Datur & species octandra ac icofandra.

Classis XI.

DODECANDRIA.

I. MONOGYNIA.

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 947. <i>Bocconia.</i> | 960. <i>Triumfetta.</i> |
| 948. <i>Hudsonia.</i> | 961. <i>Evrya.</i> |
| 949. <i>Theligonum.</i> | 962. <i>Peganum.</i> |
| 950. <i>Asarum.</i> | 963. <i>Dodecas.</i> |
| 951. <i>Cytinus.</i> | 964. <i>Nitraria.</i> |
| 952. <i>Tomex.</i> | 965. <i>Vatica.</i> |
| 953. <i>Ceratophyllum.</i> | 966. <i>Portulaca.</i> |
| 954. <i>Rhizophora.</i> | 967. <i>Lythrum.</i> |
| 955. <i>Crenoa.</i> | 968. <i>Ginora.</i> |
| 956. <i>Apastis.</i> | 969. <i>Blakea.</i> |
| 957. <i>Banara.</i> | 970. <i>Befaria.</i> |
| 958. <i>Garcinia.</i> | 971. <i>Bassia.</i> |
| 959. <i>Crataeva.</i> | 972. <i>Decumaria.</i> |

II. DIGYNIA.

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 973. <i>Heliocarpus.</i> | 976. <i>Juglans.</i> |
| 974. <i>Euclea.</i> | 977. <i>Menispermum.</i> |
| 975. <i>Agrimonia.</i> | |

III. TRIGYNIA.

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 978. <i>Fagus.</i> | 982. <i>Visnea.</i> |
| 979. <i>Datisca.</i> | 983. <i>Tacea.</i> |
| 980. <i>Reseda.</i> | 984. <i>Pallasia.</i> |
| 981. <i>Euphorbia.</i> | |

IV. TETRAGYNIA.

985. *Aponogeton*.

V. PENTAGYNIA.

986. *Glinus*.

VI. POLYGYNIA.

987. *Sempervivum*.

DODECANDRIA.

Stamina a II ad 19 inclusive.

I. MONOGYNIA.

947. BOCCONIA. † *Plum.* 25. *Jacq. amer.*
146.*CAL.* *Perianthium* diphyllum, ovatum, obtusum, concavum, caducum.*COR.* nulla.*STAM.* *Filamenta* duodecim, brevissima. *Anthera* lineares, maximæ, longitudine calycis.*PIST.* *Germen* subrotundum, utrinque contractum, magnum, pedicellatum. *Stylus* unicus, bifidus. *Stigmata* simplicia, reflexa.*PER.* subovatum, utrinque attenuatum, productumque, compressum, uniloculare, pulpa repletum.*SEM.* unicum, globosum.

948. HUDSONIA.

CAL. *Perianthium* triphyllum, tubulosum, cylindricum: ore patulo: *foliis* lanceolato-linearibus, obtusis.*COR.* nulla.*STAM.* *Filamenta* quindecim, capillaria, calyce breviora. *Anthera* subrotundæ.*PIST.* *Germen* superum, ovatum. *Stylus* filiformis, longitudine calycis. *Stigma* obtusum.*PER.* *Capsula* cylindrica, calyce dimidio brevior, unilocularis, trivalvis.*SEM.* tria, hinc rotundata, inde angulata.949. THELIGONUM. * *Cynocrambe Tournef.* 485.* *Masculus flos.**CAL.* *Perianthium* monophyllum, turbinatum, semibifidum: *laciniis* revolutis.*COR.* nulla.*STAM.* *Filamenta* plurima (duodecim & supra), erecta, longitudine corollæ. *Anthera* simplices.

* *Femineus flos* in eadem planta.

CAL. *Perianthium* monophyllum, minimum, erectum, bifidum, persistens ad latus germinis.

COR. nulla.

PIST. *Germen* globosum. *Stylus* filiformis, longus. *Stigma simplex*.

PER. *Capsula* coriacea, globosa, unilocularis.

SEM. unicum, globosum, appendiculo calloso.

950. ASARUM. * *Tournef.* 286.

CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum, trif. quadrifidum, coriaceum, coloratum, persistens: laciniis erectis, apice inflexis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* duodecim, subulata, calyce dimidio breviora. *Anthera* oblonga, filamentorum parieti medio adnata.

PIST. *Germen* inferum f. intra substantiam calycis reconditum. *Stylus* cylindraceus, longitudine staminum. *Stigma* stellatum, sexpartitum, laciniis reflexis.

PER. *Capsula* coriacea, intra substantiam calycis, subsexlocularis.

SEM. plura, ovata.

951. CYTINUS. † *Hypocistis. Tournef. inst.*
477. *Thyr sine. Gleditsch. verm. Abhandl.*
T. 1. 226. Tab. 2.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulato-campanulatum, persistens. *Tubo* cylindrico; *Limbo* patulo, quadripartito, obtusiusculo, colorato.

COR. nulla.

STAM. sedecim. *Filamenta* nulla. *Anthera* oblonga, adnata apici styli sub stigmatate, oblonga, bivalves.

PIST. *Germen* inferum, rotundatum. *Stylus* cylindricus, longitudine fere calycis. *Stigma* octofidum, gibbum, obtusum.

PER. *Bacca* coronata, subrotunda, coriacea, octolocularis.

SEM. numerosa, minata, subrotunda.

952. TOMEX. *Thunb. diff. nov. gen. p. 65.*
Flor. jap. p. 10.

CAL. *Involucrum* universale, quinquephyllum, raro sexphyllum, quinqueflorum, rarius sexflorum, persistens. *Foliola* ovata, extus tomentosa, obtusissima, inæqualia, imbricata, valde concava, exterioribus minoribus.

Perianthium proprium (vix corolla) quinquephyllum, persistens: *Foliola* lanceolata, extus villosa, erecto-patula.

COR. nulla, nisi *Perianthium* proprium.

STAM. *Filamenta* duodecim, filiformia, inæqualia, exteriora quinque longitudine involucelli: interiora septem, alba, breviora. *Antheræ* ovatae, didymæ, flavæ.

Nectarium: Squamæ quinque, inter stamina interiora sitæ, plicatæ, crenatæ, virides, glabræ, longitudine filamentorum.

PIST. *Germen* superum, triquetrum, viride, glabrum inter nectarii squamas medium. *Stylus* nullus. *Stigma* subulatum, virescens, abortiens.

PERIC. —

953. CERATOPHYLLUM. * *Hydroceratophyllum* Vaill. *A. G. 1719. t. 2. f. 2.*
Dichotophyllum Dill. *gen. 3.*

* *Masculi Flores.*

CAL. *Perianthium* multipartitum: *laciniis* subulatis, æqualibus.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* duplo plura quam segmenta calycis (sedecim ad viginti), vix conspicua. *Antheræ* oblongæ, erectæ, calyce longiores.

* *Feminei* in eadem planta cum masculis.

CAL. *Perianthium* multipartitum: *laciniis* subulatis, æqualibus.

COR. nulla.

PIST. *Germen* ovatum, compressum. *Stylus* nullus. *Stigma* obtusum, obliquum.

PER. nullum.

SEM. *Nux* ovata, unilocularis, acuminata.

954. RHIZOPHORA. † Mangles Plum. 15.

CAL. *Perianthium* quadripartitum, patulum : laciniis oblongis, acuminatis, persistentibus.

COR. *Petala* quatuor, oblonga, calyce ferme breviora.

STAM. *Filamenta* vix ulla : alterna breviora. *Antheræ* (4-12), parvæ, acuminatæ.

PIST. *Germen* superum, subrotundum. *Stylus* subulatus, semibifidus, utrinque fulco exaratus. *Stigmata* acuta.

PER. carnosum, subovatum, basin tantum seminis includens.

SEM. unicum, clavato-oblongum, acuminatum, basi carnosum.

OBS. *Stamina* numero differunt uti *Calyx* & *Corolla*.

955. CRENÆA. Aubl. 209.

CAL. *Perianthium* monophyllum, turbatum, persistens, semiquadrifidum : laciniis ovatis, acutis, æqualibus, patentibus.

COR. *Petala* quatuor, subrotunda, sessilia, calyci inserta, eoque longiora.

STAM. *Filamenta* quatuordecim, capillaria, demum ad unum latus flexa, sub petalis calyci inserta. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* globosum, calycis fundo innatum. *Stylus* longus, incurvus. *Stigma* oblongum, crassiusculum.

PER. *Capsula* globosa, quinquelocularis, calyce obvoluta, intra quem apex denudatus prominet.

SEM. plurima, minutissima.

956. APACTIS. Thunb. diff. nov. gen. p. 66.

Flor. jap. p. 11.

CAL. nullus.

COR. tetrapetala. *Petala* subrotunda, crenata, concava, inæqualia, oppositis latioribus.

STAM. *Filamenta* circiter sedecim, usque ad viginti.

PIST. *Germen* superum. *Stylus* unicus.

PER. —

957. BANARA. Aubl. 217.

CAL. *Perianthium* monophyllum, sexpartitum, persistens : laciniis ovatis.

424 DODECANDRIA MONGGYNIA.

COR. *Petala* sex, subrotunda, concava, patentia, calyce triplo majora, receptaculo inserta.

STAM. *Filamenta* quindecim & plura, capillaria, longitudinae corollae, glandulae, germen cingenti, inserta. *Anthera* subrotunda.

PIST. *Germen* subglobosum, glandulae insidens. *Stylus* filiformis, altitudine staminum. *Stigma* capitatum.

PER. *Bacca* globosa, parum succulenta, unilocularis, stylo persistente coronata.

SEM. plurima, minima, angulata, striata.

958. GARCINIA. † Mangostans *Garc. A.*

A. 431. t. I.

CAL. *Perianthium* tetraphyllum: *foliis* subrotundis, concavis, obtusis, patentibus, persistentibus.

COR. *Petala* quatuor, subrotunda, concava, patentia, calyce paulo majora.

STAM. *Filamenta* sedecim, erecta, in cylindrum posita, simplicia, calyce breviora. *Anthera* subrotunda.

PIST. *Germen* superum, subovale. *Stylus* vix ullus. *Stigma* planum, patens, peltatum, octididum, obtusum, persistens.

PER. *Bacca* coriacea, globosa, magna, unilocularis, coronata stigmatate.

SEM. octo, hinc convexa, inde angulosa, villosa, carnosa.

959. CRATÆVA. † *Tapia Plum.* 21.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quadrifidum, deciduum, basi plenum: *laciniis* patentibus, ovatis, inaequalibus.

COR. *Petala* quatuor, oblonga, ad idem latus deflexa, unguibus tenuibus, longitudine calycis, divisuris inserta.

STAM. *Filamenta* sedecim vel plura, setacea, ad latus petalis oppositum declinata, corolla breviora. *Anthera* erecta, oblonga.

PIST. *Germen*, Pedicello filiformi longissimo, ovatum. *Stylus* nullus. *Stigma* sessile, capitatum.

PER. *Bacca* carnosa, globosa, maxima, bilocularis, pedicellata, unilocularis.

SEM. plura, subrotunda, emarginata, nidulantia.

OBS. *Datur species* 1. *floribus gynandris.*

C. Marmelos *calyce quinquesido, petalis nullis, staminibus 60. insinuitur. An distincti generis? Lin.*

960. TRIUMFETTA. * Plum. 8.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum; *foliis lanceolatis, sub apice aristatis, deciduis.*

COR. *Petala* quinque, linearia, erecta, obtusa, concava, retroflexa, sub apice aristata.

STAM. *Filamenta* sedecim, æqualia, adscendentia, longitudine corollæ, subulata, erecta. *Antheræ simplices.*

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* longitudine staminum. *Stigma* bifidum, acutum.

PER. *Capsula* globosa, aculeis uncinatis undique obvallata, quadrilocularis.

SEM. bina, hinc convexa, inde angulata.

OBS. T. Lappulæ *Calyx nullus, mihi in uno viso flore & pluribus Jacquinio, at T. semitrilobæ Jacq. Calyx perfectus uti Plumierio, Brownio; utrasque simillimas distinguere an specie liceat?*

961. EURYA. Thurb. diff. nov. gen. p. 68.

Flor. japp. p. 11.

CAL. *Perianthium* quinquephyllum, calyculatum: *calyculus* diphyllus, calyci similis, triplo minor: *Foliola* calycis ovata, concava, obtusa, extus fusca vel viridia, glabra, intus viridia, semilineam longa.

COR. pentapetala. *Petala* subrotundo-ovata, concava, alba, magnitudine calycis.

Nectarium: puncta, vel margo purpureus ad basin filamentorum.

STAM. *Filamenta* tredecim, brevissima, ut fere nulla, alba. *Antheræ* erectæ, tetragonæ, albidæ, longitudine fere corollæ.

PIST. *Germen* superum, convexum, glabrum. *Stylus* subulatus, viridis, antheris brevior. *Stigmata* tria reflexa.

PER. *Capsula* globosa, stylo persistente acuta, glabra, quinquevalvis, quinquelocularis, magnitudine vix piperis.

SEM. subtriquetra, punctata, brunnea, glabra.

962. PEGANUM. * *Harmala Tournef.* 133.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: *foliis* linearibus, sæpe dentatis, erectis, longitudine corollæ, acutis, persistentibus.

COR. *Petala* quinque, oblongo-ovata, erecto-patentia.

STAM. *Filamenta* quidecim, subulata, corolla dimidio breviora, basi dilatata in *Nectarium* sub germine. *Anthera* oblongæ, erectæ.

PIST. *Germen* trigono-subrotundum, receptaculo e basi floris elevatum. *Stylus* filiformis, teres, longitudine antherarum. *Stigma* oblongum, triquetrum.

PER. *Capsula* trigono-subrotunda, trilocularis, trivalvis.

SEM. plurima, ovata, acuminata.

OBS. *Peganum differt a Ruta, uti Celastrus ab Euonymo; quidquid enim Pisilli numero demitur, flaminibus additur, & vice versa.*

963. DODECAS. *Suppl. p. 36.*

CAL. *Perianthium* superum, monophyllum, turbinatum, semiquadrifidum. *Lacinie* ovatæ, patentes.

COR. *Petala* quatuor, sessilia, calyci inserta, subrotunda.

STAM. *Filamenta* duodecim, capillaria, calyce breviora, receptaculo inserta. *Anthera* oblongæ.

PIST. *Germen* semisuperum. *Stylus* filiformis, flaminibus longior. *Stigma* simplex.

PER. inferum, ovatum, uniloculare, calyce patulo coronatum, intra quem apex capsulæ denudatus, quadrivalvis.

SEM. numerosa, oblonga, minuta.

OBS. *Fortè Jussieva species.*

964. NITRARIA. * *Act. petrop. VII. p. 315. t. 10.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquefidum, erectum, brevissimum, persistens.

COR. *Petala* quinque, oblonga, patentia, canaliculata, apice fornicata mucrone inflexo.

STAM. *Filamenta* quindecim, subulata, erectiuscula, longitudine corollæ. *Anthera* subrotundæ.

PIST. *Germen* ovatum, desinens in *Stylum* crassiusculum, staminibus longiorem. *Stigma* simplex.

PER. *Drupa* unilocularis, ovato-oblonga, acuminata.

SEM. unicum, triloculare, ovatum, acuminatum.

665. VATICA.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum, basi obtusum, erectum: *laciniis* lanceolatis, corolla brevioribus.

COR. *Petala* quinque, sessilia, elliptica, magna.

STAM. *Filamenta* nulla. *Anthera* quindecim sessiles, brevissimæ, quadriloculares: loculis 2 exterioribus terminatis spina interjecta; loculis 2 interioribus dimidio brevioribus, muticis.

PIST. *Germen* conicum, subpentagonum. *Stylus* cylindricus, quinaestriatus. *Stigma* obtusum.

PER.

SEM.

OBS. *Distinctum genus, fructu licet ignoto.*

966. PORTULACA. * Tournef. 118. Anacampteros edit. prim. Telephiastrum Dill. elth. 280.

CAL. *Perianthium* bifidum, parvum, superum, apice compressum, persistens.

COR. *Petala* quinque, plana, erecta, obtusa, calyce majora.

STAM. *Filamenta* multa, capillaria, corolla dimidio breviora. *Anthera* simplices.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* simplex, brevis. *Stigmata* quinque, oblonga, longitudine styli.

PER. *Capsula* testæ, ovata, unilocularis. *Receptaculum* liberum.

SEM. plurima, parva.

OBS. *Dantur species capsula circumscissa; aliæ capsula trivalvi, sic & P. fruticosa calyce pentaphyllo est & capsula trivalvi.*

967. LYTHRUM. * *Salicaria Tournesf.* 129.

CAL. *Perianthium* monophyllum, cylindraceum, striatum, denticulis duodecim: alternis minoribus.

COR. *Petala* sex, oblonga, obtusiuscula, patentia, unguibus calycis incisuris inserta.

STAM. *Filamenta* duodecim, filiformia, longitudine calycis: superiora inferioribus breviora. *Antheræ* simplices, assurgentes.

PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* subulatus, longitudine staminum, declinatus. *Stigma* orbiculatum, assurgens.

PER. *Capsula* oblonga, acuminata, testâ, bilocularis.

SEM. numerosa, parva.

OBS. In quibusdam speciebus una sexta pars numeri e flore eximitur, L. fruticoso, Melanio: aliæ sex tantum gaudent staminibus, L. lineare, Parsonsia & Hyssopifolia.

L. Thymifolium floribus est tetrapetalis.

L. dipetalo corolla dipetala.

968. GINORA. *Jacq. amer.* 148.

CAL. *Perianthium* monophyllum: *Tubo* campanulato, *Limbo* sexfido: laciniis lanceolatis, patentibus; coloratis, persistentibus.

COR. *Petala* sex, subrotunda, patentia, calyce longiora, unguibus longis collo calycis inserta.

STAM. *Filamenta* duodecim, subulata, patula, longitudine calycis, calyci inserta. *Antheræ* reniformes.

PIST. *Germen* subrotundum, depressum. *Stylus* subulatus, longitudine corollæ, persistens. *Stigma* obtusum.

PER. *Capsula* depresso-subrotunda, nitida, colorata, subquadrifurcata, quadrivalvis, unilocularis, apice dehiscens.

SEM. plurima, minuta. *Receptaculum* subrotundum, magnum.

969. BLAKEA. † *Brown. t.* 35.

CAL. *Fructus* *Perianthium* inferum, hexaphyllum: foliolis ovalibus, concavis, patentibus, magnitudine floris.

Floris *perianthium* superum: margo integerrimus, sexangularis, membranaceus.

COR. *Petala* sex, ovata, patentia, æqualia.

STAM. *Filamenta* duodecim, subulata, erecta. *Antheræ* triangulares, depressæ, concatenatæ in annulum.

PIST. *Germen* inferum, obovatum, margine calycino coronatum. *Stylus* subulatus, longitudine floris. *Stigma* acutum.

PER. *Capsula* obovata, sexlocularis.

SEM. plurima.

OBS. *Stamina* B. *triplinerviæ* desinunt in *antheras*, nec *Antheræ* filamentis impositæ.

B. *triplinervia* simplici calyce gaudet.

970. BEFARIA. *Aut. D. Mutis.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, deorsum gibbum, sub-ventricosum, septemfidum: laciniis subæqualibus, ovatis, acutis, conniventibus, parvis: exterioribus latioribus; persistens.

COR. *Petala* septem, oblonga, superne latiora, obtusa, patula, receptaculo inserta.

STAM. *Filamenta* quatuordecim, subulata, corolla fere breviora: alternis minoribus. *Antheræ* oblongæ, incumbentes.

PIST. *Germen* superum. *Stylus* teres, mediocris, persistens. *Stigma* crassiusculum, septemstriatum.

PER. *Bacca* exsucca, heptagona, depressa, umbilicata, septemlocularis.

SEM. numerosa, oblongo-teretia, imbricata.

971. BASSIA. *Auth. D. Kænigio.*

CAL. *Perianthium* tetraphyllum: foliolis coriaceis, ovatis, persistentibus.

COR. monopetala, campanulata: *Tubus* inflatus, ovatus, cornosus. *Limbus* tubo brevior: octopartitus: laciniis ovatis, erectiusculis.

STAM. *Filamenta* sedecim: 8 supra faucem; 8 intra tubum. *Antheræ* lineares, sagittatæ, acutæ, introrsum villosæ, corolla breviores.

PIST. *Germen* superum, ovatum. *Stylus* subulatus, corolla duplo longior. *Stigma* acutum.

PER. *Drupe* carnosæ, lactescens.

SEM. *Nucæ* 5, oblongæ, trigonæ.

972. DECUMARIA. † *Fabric. Willich.*

CAL. *Perianthium* superum, subdecaphyllum, minimum: *foliolis* ovatis, coloratis, acutis, reflexis.

COR. *Petala* decem, lanceolata, obtusa, æqualia, simplici orbe digesta, patentia.

STAM. *Filamenta* 16-25, filiformia, longitudine corollæ. *Anthera* didymæ, depressæ.

PIST. *Germea* turbinatum, inferum. *Stylus* cylindricus, corolla brevior. *Stigma* gibbum, torulis circiter decemlobatum.

PER. - - - decemloculare.

SEM. solitaria.

OBS. *Genus* obscurum latente in hunc diem Frustrum. *An* dioica?

II. DIGYNIA.

973. HELIOCARPUS. * *Montia Houst. A. A.*

CAL. *Perianthium* tetraphyllum, coloratum: *foliolis* linearibus, longis, latiusculis, patentibus, deciduis.

COR. *Petala* quatuor, linearia, calyce multo breviora, angustiora.

STAM. *Filamenta* sedecim, subulata, longitudine fere calycis. *Anthera* didymæ, lineares, incumbentes.

PIST. *Germea* subrotundum. *Styli* duo, simplices, erecti, longitudine staminum. *Stigmata* acuta, distantia.

PER. *Capsula* turbinato ovata, pedunculata, compressa, perpendiculariter utrinque cincta radiis pinnatim ramosis, bilocularis.

SEM. solitaria, subovata.

974. EUCLEA. *Thunb. diff. nov. gen. p. 84. Suppl. p. 67.*

* *Flores Masculi.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, corolla multoties brevius, subangulatum, glabrum, viride, quinquedentatum: *Dentibus* brevissimis, erectis.

COR. monopetala, patula, alba, quinquepartita: lacinia ovata, obtusa, concava, nivea, femilineam longa.

Calyx & Corolla saepe quadrifidi, saepius vero quinquefidi, rarissime sexfidi.

STAM. Filamenta tredecim: octo in circumferentia, quinque in centro, basi corollae inserta, brevissima, longitudine calycis, albida. Raro Filamenta quindecim. *Anthera* tetragono-subulata, sulcata, erecta, albidæ, apice latere utroque perforata.

** Flores Feminei.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, raro quinquedentatum, saepius quadridentatum, persistens: *laciniae* erectae, corolla triplo breviores.

COR. raro quinquefida, saepius quadrifida: *laciniae* ovatae, obtusae, concavae, erectae, albæ.

PIST. *Germen* superum, ovatum, subvillosum. *Styli* duo, longitudine corollae, virides, crassiusculi. *Stigmata* emarginata seu bifida, obtusa.

PER. *Bacca* globosa, puncto umbilicali, glabra, viridis, matura rubra, carnosa, magnitudine pisi.

SEM. unicum, globosum, glabrum, brunneum.

975. AGRIMONIA. * *Tournef.* 155. *Agrimonoides Tournef.* 155.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquefidum, acutum, parvum, superum, persistens, altero calyce obvalatum.

COR. *Petala* quinque, plana, emarginata: *unguibus* angustis, calyci insertis.

STAM. Filamenta capillaria, corolla breviora, calyci inserta. *Anthera* parva, didyma, compressa.

PIST. *Germen* inferum. *Styli* duo, simplices, longitudine staminum. *Stigmata* obtusa.

PER. nullum. *Calyx* collo coarctatus, induratus.

SEM. duo, subrotunda.

OBS. *Stamina* valde numero incerta, aliis duodecim, rarius decem, aliis septem.

Agrimoniae T. Calyx exterior adnatus interiori. Semina duo, stamina duodecim ad viginti; fructus setis obvalatus.

Agrimonoïdes T. *Calyx exterior liber ab interiori. Stamen unicum. Stamina septem circiter.*

976. IUGLANS. * *Nux Tournef.* 346. *Boerh.*
II. p. 175.

* *Masculi Flores* in Amentum oblongum digesti.

CAL. *Amentum commune* undique imbricato - sparsum, cylindraceum, constans squamis unifloris, singulis singulæ corollæ affixis in centro exteriori, extrorsum versis.

COR. sexpartita, elliptica, æqualis, plana: laciniis erecto - concavis, pedicellatis, centro corollæ interiori & rachi insertis

STAM. *Filamenta* plura (octodecim) brevissima. *Antheræ* erectæ, acuminatæ, longitudine calycis.

* *Feminei Flores* absque Amento, altero vel tertio sociati, sessiles in eadem planta.

CAL. *Perianthium* quadrifidum, erectum, brevissimum, germen coronans, evanescens.

COR. quadripartita, acuta, erecta, calyce paulo major.

PIST. *Germen* ovale, magnum, inferum. *Styli* duo, brevissimi. *Stigmata* maxima, clavata, reflexa, superne lacerata.

PER. *Drupa* sicca, ovalis, magna, unilocularis.

SEM. *Nux* maxima, subrotunda, sulcis reticulata, semiquadrilocularis. *Nucleo* quadrilobo, varie sulcato.

977. MENISPERMUM. * *Tournef.* A. G.
1705.

* *Mas.*

CAL. *Perianthium* diphyllum: *foliolis* linearibus, brevibus.

COR. *Petala exteriora* quatuor, ovata, patula, æqualia
Petala interiora octo, ovata, concava, exterioribus minora, horum quatuor in serie interiore.

STAM. *Filamenta* sedecim, cylindrica, corolla paulo longiora. *Antheræ* terminales, brevissimæ, obtuse quadrilobæ.

* *Femina.*

CAL. ut in mas.

COR.

COR. ut in mare.

STAM. *Filamenta* octo, maris similia. *Antheræ* pellucidæ, steriles.

PIST. *Germina* duo, ovata, incurva, conniventia, pedicellata. *Styli* solitarii, brevissimi, recurvati. *Stigmata* bifida, obtusa.

PER. *Baccæ* duæ, subrotundo-reniformes, uniloculares.

SEM. solitaria, reniformia, magna.

Character e M. canadensi; conferantur fructificationes reliquarum, cum Calyx hexaphyllus, Corolla hexapetala, Stamina sex, Pistilli tria Willichio, Millero aliisque.

III. TRIGYNIA.

978. FAGUS.* *Tournef.* 351. Castanea *Tournef.* 352.

* *Masculi Flores* receptaculo Amentaceo communi affixi.

CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum, quinquefidum.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* plura (duodecim circiter), longitudine calycis, setacea. *Antheræ* oblongæ.

* *Feminei Flores* in gemma ejusdem plantæ.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quadridentatum, erectum, acutum.

COR. nulla.

PIST. *Germen* a calyce testum. *Styli* tres, subulati. *Stigmata* simplicia, reflexa.

PER. *Capſula* subrotunda (quæ calyx fuit) maxima, spinis mollibus obsita, unilocularis, quadrivalvis.

SEM. *Nuces* duæ, ovatæ, triquetra, trivalves, acuminatæ.

OBS. *Fagi T. Flores masculi in globum digessi.*

Castaneæ T. Flores masculi in cylindrum dispositi.

979. DATISCA* *Cannabina Tournef. cor.* 52.

* *Mas.*

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: *foliis* linearibus, acutis, æqualibus.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* vix ulla. *Antheræ* circiter quindecim, oblongæ, calyce multoties longiores, obtusæ.

* *Femina*.

CAL. *Perianthium* bidentatum deficiente tertio dente, erectum, minimum, superum, persistens.

COR. nulla.

PIST. *Germen* oblongum, inferum, calyce longius. *Styli* tres, bipartiti, breves. *Stigmata* simplicia, oblonga, villosa, longitudine germinis.

PER. *Capsula* oblonga, triangularis, trivalvis, tricornis, unilocularis.

SEM. numerosa, parva, trifariam capsulæ longitudinaliter adhaerentia.

980. RESEDA. * *Tournef.* 238. Luteola
Tournef. 238. Sesamoides *Tournef.* 238.

CAL. *Perianthium* monophyllum, partitum: *laciniis* angustis, acutis, erectis, persistentibus, quarum duæ magis dehiscunt, in usum petali melliferi.

COR. *Petala* nonnulla, inæqualia, semper aliqua semitrifida, supremo ad basin gibbo, mellifero, longitudine calycis.

Nectarium: Glandula plana, erecta, e receptaculo producta, a latere superiore inter stamina & supremum petalum locata, connivens cum basi petalorum ab eodem latere dilatata.

STAM. *Filamenta* undecim s. quindecim, brevia. *Antheræ* erectæ, obtusæ, longitudine corollæ.

PIST. *Germen* gibbum, in *stylos* nonnullos brevissimos desinens. *Stigmata* simplicia.

PER. *Capsula* gibba, angulata, *stylis* acuminata, inter *stylos* hians, unilocularis.

SEM. plurima, reniformia, angulis capsulæ adnata.

OBS. Vix datur ullum genus, determinando characteri, difficius. Ludit enim numero & figura in diversis speciebus.

Essentialis character consistit in petalis trifidis, unico ad basin mellifero & capsula non clausa, sed hiante semper. Luteola; *Perianthium* quadripartitum. *Petala* tria: supremum melliferum semisexidum; lateralia opposita trifida;

adduntur lusu vel natura saepe duo infima minima integra.
 Styli tres. Stamina plurima.

Alba. Perianthium *separtitum*. Petala sex, *subequalia*,
 omnia *semitrifida*. Styli quatuor. Capsula *quadrangu-*
lavis. Stamina *undecim semper*.

Alæ spec. Perianthium *quinquepartitum*. Petala *quinque*,
diffimilia, *trifida*. Styli tres. Stamina plurima.

981. EUPHORBIA. * Euphorbium *Isnard*.
 A. G. 1720. Tithymalus *Tournef.* 18.
 Tithymaloides *Tournef.*

CAL. Perianthium *monophyllum*, *ventricosum*, *subcolo-*
ratum, *ore quadridentatum* (*quinquedentatum paucio-*
ribus), *persistens*.

COR. Petala quatuor, (*quinque paucis*), *turbinata*, *gib-*
ba, *crassa*, *truncata*, *situ inæqualia*, *cum dentibus*
calycis alterna, *unguibus margini calycis imposita*,
persistentia.

STAM. Filamenta *plura* (*duodecim vel supra*), *filiformia*,
articulata, *receptaculo inserta*, *corolla longiora*, *di-*
verso tempore erumpentia. Antheræ *didymæ*, *sub-*
rotundæ.

PIST. Germen *subrotundum*, *triquetrum*, *pedicellatum*.
 styli tres, *bifidi*. Stigmata *obtusæ*.

PER. Capsula *subrotunda*, *tricocca*, *trilocularis*, *elasti-*
ce diffiliens.

SEM. *solitaria*, *subrotunda*.

OBS. Euphorbium *Is.* caule *angulato*, *vel carnosio gaudet*,
petalisque in quibusdam trifidis.

Tithymalus *T.* caule *folioso*.

Tithymaloides *T.* calyx *ad latus inferum gibbum*, *cal-*
ceiforme. In quibusdam speciebus flores *masculi primo-*
res sunt.

Petala *sæpius 4*, quibusdam *5*, *sæpe in eadem planta*,
sexu diversis floribus; hæc in *plerisque glandulosa*, in
aliis lunata vel dentata, in paucis *membrana instar te-*
nuia, *communiter quasi extra calycem posita*.

Capsula *lavis s. hirsuta*, *s. verrucosa est*.

Stamina *non eodem tempore erumpunt*.

982. VISNEA. *Suppl. p. 36.*

CAL. *Perianthium* inferum, pentaphyllum, persistens.

Foliola lanceolata, recurvata: *tria* exteriora pilosa.

COR. pentapetala. *Petala* elliptica, æqualia, patentia, calyce vix longiora, integra.

STAM. *Filamenta* duodecim, erecta, receptaculo inserta, filiformia, petalis breviora. *Antheræ* quadrangulæ, erectæ, arista terminatæ.

PIST. *Germen* superum, hirtum, attenuatum quasi in stylum hirtum, brevissimum. *Styli* tres, filiformes, glabri. *Stigmata* simplicia.

PER. *Nux* ovata, glabra, acuminata, bi- f. trilocularis, seminifera, calycis foliolis conniventibus inclusa & per maximam partem monophylla calycis parte testâ, quæ cum nuce connata: at superior tertia pars nucis intra calycem nuda.

SEM. singulo loculamento unicum.

983. TACCA. *Suppl. p. 37. Forst. charact. gen. n. 35.*

CAL. *Perianthium* superum, hexaphyllum. *Foliola* ovata, conniventia, persistentia.

COR. *Petala* sex, fornicata, æqualia.

STAM. *Filamenta* vix ulla. *Antheræ* oblongæ, binæ singulorum petalorum cavo innatæ.

PIST. *Germen* inferum. *Styli* tres, breves. *Stigmata* obcordata.

PER. *Bacca* ficca, ovata, angulata, trilocularis.

SEM. plura, ovata, striata.

984. PALLASIA. *Suppl. p. 37. Pterococcus. Pallas.*

CAL. nullus.

COR. *Petala* quinque, subrotunda, subinæqualia, persistentia.

STAM. *Filamenta* quindecim, setacea, longitudine corollæ, basi crassiuscula, persistentia. *Antheræ* subglobosæ, didymæ.

PIST. *Germen* superum, conicum, plicatum. *Styli* tres f. quatuor, reflexi *Stigmata* capitata.

PER. nullum, nisi crusta feminis.

SEM. *Nux* oblonga, angulata: anguli quatuor, bifidi, membranacei.

IV. TETRAGYNIA.

985. APONOGETON. *Thunb. diff. nov. gen.*
p. 72. Suppl. p. 32.

CALYX & COROLLA nulla, nisi squama spathacea, externum floris latus cingens, simplex, sessilis, ovata, obtusa, integra, erecta, glabra, alba.

STAM. *Filamenta* undecim ad novemdecim, superioribus floribus pauciora, inter capsulas & Spatham inserta, subulata, glabra, alba, spatha multoties breviora. *Anthera* fusca.

PIST. *Germina* plerumque quatuor, raro tria, quinque. *Styllus* nullus. *Stigmata* subulata, incurvata.

PER. *Capsulae* quatuor, rarius tres, quinque, ovatae, subulato-acutae, exteriori latere, gibbae, interiori planae, glabrae, uniloculares.

SEM. in qualibet capsula tria, basi capsulae affixa, sessilia, obovata, obtusissima, subcompressa, glabra, rubra.

IV. PENTAGYNIA.

986. GLINUS. * *Læfling.*

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: *foliis* ovatis, concavis, intus cbloratis, persistentibus.

COR. nulla. *Nectararia* saepe quinque, plana, mentientia petala, angusta, calyce breviora, inaequaliter bifida s. trifida.

STAM. *Filamenta* quindecim circiter, subulata, plana, longitudine calycis. *Antherae* erectae, oblongae, compressae, didymae.

PIST. *Germen* pentagonum. *Styli* quinque, breves. *Stigmata* simplicia

PER. *Capsula* ovata, quinquelocularis, quinquangularis, quinquevalvis.

SEM. plurima, subrotunda, simplici serie sub valvulis, tuberculata, basi affixa membranulae tumidae.

VI. POLYGYNIA.

987. SEMPERVIVUM. * Sedi species Tour-
nef. 140. C. E. I.

CAL. *Perianthium* sex ad duodecim-partitum, concavum, acutum, persistens.

COR. *Petala* sex ad duodecim, oblonga, lanceolata, acuta, concava, calyce paulo majora.

STAM. *Filamenta* sex ad duodecim, subulato-tenuia. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germina* sex ad duodecim, in orbem posita, erecta, desinentia in *Stylos* totidem, patentes. *Stigmata* acuta.

PER. *Capsulæ* sex ad duodecim, oblongæ, compressæ, breves, in orbem posita, extrorsum acuminatæ, introrsum dehiscentes.

SEM. plura, subrotunda, parva.

OBS. Numerus sæpius luxurians major evadit, præsertim in partibus femininis.

Sedo affine, sed *Petalis* pluribus quam quinque diversum.

New York Botanical Garden Library

QK91 .G4 1791 v.1

Linne, Carl von/Caroli a Linne ... Gener

gen



3 5185 00089 7924

